



1. *Elephas primigenius* 8^{me} Sup. 22 lames dans le même échantillon 18 de
l'indien. Lame plus mince et non frotée. plus
restant de la section visible autre part. enrou-
plus large. corne de 30 cm. Lame de 10 cm. restant
de 30 cm. L. haut. 2. 30 cm. L. bas.

2. *El. indicus* — 7^{me} Sup. 18 lames
Mastodon — 3^{me} 2. lat 8 lames 1^{re} m. 12^{te} 8^{me} m. 16^{te} 5^{me} m. 20 à 80

3. *El. namadicus*

4. *El.* Lame peu connue d'Europe.

5. *El. hypsindicus* 7^{me} Sup. 13 lames presque le même type que 2
1^{re} lames d'Asie.

6. *El. africanus* — 7^{me} Sup. 9 lames et un talon. l'abandon. plus haute et
large.

7. *El. primus*

longueur { 1^{re} l. lat 7 lames 1^{re} m. 7 à 8 2^{me} 7 à 8 3^{me} m. 9 à 10
8. *El. planifrons* 7^{me} Sup. 9 lames plus hautes que larges.

9. *El. insignis* 8^{me} Sup. — 10 lames sup. larges que hautes (craie)
mélange de 3 lames d'Asie (1844)

10. *El. genevii* 4^{me} Sup. 10 lames et un talon.

11. *El. bombifrons* 8^{me} Sup. 4 lames plus larges que hautes et
plus lisses.

12. *El. cliftoni* (m. *El. cliftoni*) 6^{me} 7^{me} Sup. 6 lames ou plutôt colonnes minces.

{ *Stenodon* 3^{me} lat 6^{te} 1^{re} m. 6^{te} 2^{me} m. 6^{te} 3^{me} m. 8^{te} Sup. 8 lames
variété 3^{me} l. hautes *Stenodon* qu'il y a 6^{te} m. 14 lames.
El. cliftoni

1^{re} m. 4 lames. totale 22 cm

2^{me} — 4 à 5 lames larges de 2 l. pour 1 m. — totale 29 cm

3^{me} — 1 à 2 lames. larg. 4 l. long 20 cm. pour 2^{me} m. totale 29

4^{me} — 15 à 18 lames. larg. 7 à 8 pour 1 m. — pour 1 m. larg. totale 29 cm

5^{me} — 17 à 20 lames — larg. 9 à 10 pour 1 m. — pour 1 m. larg. totale 29 cm

6^{me} — 22 à 25 lames larg. 12 à 15 pour 1 m. — pour 1 m. larg. totale 29 cm

199,021. — Carnet de 84 feuillets.
Boulouze, le 18 mars 1902.

1

Elephas primigenius

Elephas indicus

Elephas namadicus

Elephas hypsindicus

Elephas africanus

Elephas primus

Elephas planifrons

Elephas insignis

Elephas genevii

Elephas bombifrons

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Elephas cliftoni

Le m. perimètres avait beaucoup de ciment

Elephas du Texas — L'espèce distincte de *primigenius* 2^{me} de
lat indien. plus hautes que les autres.
Signalé par M. Harrison.

longues, répétés à l'antérieur & à l'arrière. à et agn le
gros & remplacent de la 5^e mètre & pour les par l'antérieur
à l'antérieur, l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur
à l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur

Mariloua humboldti (petit) très court & très

gros; os de la cage plus aplatis - estomac plus
oblique - la faiblesse de l'os de la cage

plus de la cage & la plus plus oblique de la

la os des membres plus court. L'humérus

plus court & la femur plus aplati

à l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur

à l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur & l'antérieur

le grand

longueur de la femur de *humboldti* 0^m, 92

longueur

moindre longueur de l'os 0, 19

longueur de l'humérus 0, 67

les os de la cage et de la cage sont plus
court que la m. & l'os de la cage

longueur de la femur de l'os 1, 12

moindre longueur de l'os 0, 24

femur de l'os 0, 87

moindre longueur 0, 17

artère artérielle plus prononcée dans les membres
que dans les membres - os minuscules de la
l'os de la cage - os de la cage plus de la cage

longueur de l'os - longueur de la cage inférieure - 0, 24

hauteur de la cage inférieure 0, 39

longueur de l'os - os de la cage

longueur de la cage inférieure 0, 225

longueur de la cage inférieure 0, 34

longueur de la cage inférieure 0, 34

Dont l'os de la cage est plus court & l'os de la cage

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

est plus court & l'os de la cage est plus court

de cette nous sommes par l'effort
 que tous les moments ont le motif d'être
 au 1^{er} degré de la vie de l'homme à
 nous appartenant à un tel d'
 même l'effort - par le même
 persévérance à ce que l'on s'efforce de
 cette façon qui est l'union
 transmise la fois de l'acte de l'effort
 le manifeste l'effort à la fois
 plus amine de la tension et de
 par, fait de l'effort qui (est l'effort
 et l'effort) fait de cette appartenance
 à de l'effort incontestablement plus
 nouveau, l'effort l'on l'on l'on
 le l'effort par l'effort et l'effort
 amine. C'est par l'effort incontestablement
 le M. l'effort de la l'effort
 l'effort d'effort et l'effort de l'effort
 l'effort de l'effort.

M. Aug. l'effort

6

Dans l'effort de l'effort de l'effort
 l'effort qui est l'effort de l'effort
 l'effort, le 1^{er} l'effort l'effort et l'effort
 L'effort de l'effort de l'effort. Le 1^{er} l'effort
 plus l'effort de l'effort l'effort à l'effort
 de l'effort de l'effort, et l'effort de l'effort
 et l'effort de l'effort de l'effort, l'effort
 incontestablement.

Le l'effort de l'effort l'effort 3 l'effort
 l'effort de l'effort l'effort l'effort
 de l'effort de l'effort l'effort l'effort
 y a l'effort l'effort l'effort l'effort
 l'effort de l'effort l'effort l'effort
 l'effort. Le 1^{er} l'effort de l'effort
 de l'effort de l'effort l'effort l'effort
 l'effort l'effort l'effort l'effort
 l'effort l'effort l'effort l'effort.

M. l'effort de l'effort de l'effort de l'effort
 l'effort de l'effort de l'effort de l'effort
 l'effort de l'effort de l'effort de l'effort
 l'effort de l'effort de l'effort de l'effort.

Mast. Buffoni. De croissant par l'anneau (coll. Bravais)
 Sur le croissant les lobes de dent sont (moyens)
 subcylindriques par l'anneau qui est de l'ant.
 de l'Ohio, & la velle intermédiaire et
 plus mince. Dent et sonner profond
 qui dans la dent de l'Ohio. ~~dent~~
~~opère~~ il y a les lobes de dent mince denture
 et les dents latérales qui sont de dentures
 de la denture sur le fond de la dent. Dent
 mince denture, la denture est profond
 de la denture sur le fond de la dent. Dent
 denture de l'Ohio. par l'anneau de dent
 par l'anneau plus court d'avant la dent
 et plus large en projection.

La dent d'aspect ^{ant.} de l'Ohio, par
 l'anneau plus court d'avant la dent, par
 la denture profondément; par la
 denture latérale de la denture qui sont
 les dents latérales de la denture qui sont
 à projection plus robuste. Dans la

denture de dent, les dents qui sont les
 dents latérales de dent et l'anneau de dent
 plus robuste et plus profond de la dent
 denture de la dent, il y a la denture
 la denture est profond de denture
 et projection plus denture de
 denture de dent. La denture de denture
 de denture de dent de dent de l'Ohio.

Mast. Buffoni

Mast. Buffoni - Buffoni - denture de dent
 denture de dent de denture de denture
 denture de la denture.

Modèle la plate de denture denture denture
 de denture de denture de denture de
 la denture de denture de denture de
 denture de denture de denture de denture.

denture de denture de denture de denture
 de denture de denture de denture de denture
 de denture de denture de denture de denture
 de denture de denture de denture de denture

Don rapportant au vrai M. Teyard
don le moule d'après de ces 2. le haut
garni par M. Latt.

2° une dernière d'après droite de celui
de feu St. Richard, d'origine inconnue: un fragment
d'origine inconnue: d'après le même fragment
d'après le même d'après le même d'après le même

3° une portion de dernière d'après droite
portant d'après celui-ci le telon creusé, d'après
le haut par M. d'après d'après d'après
de le haut garni: trouvé à d'après M.
garni, d'après de la M. d'après d'après

4° un modèle d'après de moule
d'après d'après d'après d'après d'après
M. d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après

La moule d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après

Le moule d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après

1° une moule d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après

2° d'après d'après d'après d'après d'après

3° une moule d'après d'après d'après d'après d'après

Dans la méthode d'après, la velle d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après

M. d'après a d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après d'après
d'après d'après d'après d'après d'après d'après

Dans le sang magellain je n'ai trouvé
Epelshain (ou peut-être Epelshain) par
Lait coloré les trois milieux de lait ont la
consistance d'un bon d'Epelshain. Dans
le sang magellain & l'argente par la solution et il est
vrai, plus réductible, le 1^{er} et le 2nd inclinent le sang
Lait par le sang même, mais dans le sang
Lait.

Dans le sang & le lait infusé d'argente
L'usage montre de la même argente par le sang.
à part qu'il y a l'argente.

Dans les arrires milieux supérieurs l'argente
à part le sang l'argente montre un bon
milieu qui incline de bon le sang
intermédiaire. Dans les milieux d'Epelshain, cette
~~argente~~ l'argente n'est que tardive et incomplète
entre les premiers rangs de la dernière ligne
et elle est même entre les derniers rangs
ou le sang n'est toujours complet.

ouverts. il résulte de cette différence de
disposition que dans la partie antérieure de cette
dent le sang de trifle l'argente même l'argente
par la solution par le sang, le sang. Dans les
M. l'argente par le sang même d'Epelshain.

Je ne parlerai pas de la direction
réductible des dents dans les parties moyennes
ou l'argente, attendu que dans les dents
semble diriger le sang tandis que dans
l'argente le sang. il peut y avoir
la direction de la direction réductible, par
la formation partiellement.

M. l'argente est rapporté à M. l'argente ou M. l'argente.
M. de la dent l'argente au milieu de la dent et l'argente
à M. l'argente. le fait de que dans la dent l'argente
M. de la dent n'admet que trois lignes de l'argente.
L'argente l'argente

- Dans le marabout de Jimon, le journal
muni de lait d'opium nait pour avant de mourir
Le même temps que la pousse, il parait
que le 3^e marabout pour le premier plan de
la bad structure longit. après le 2^e, en
dans au marabout, en le 1^{er} et le second
se présente que des fibres divisées ~~longues~~
de ténacité, le 1^{er} plus de 3^e ordinaire et
deja le ténac.

M. de Blainville considère après le M. Lignier
comme faisant une partie de peuplier des Simulacra
le dent de la petite tatarie, de la espèce pour
Bouffon et son pour de de verges. de M. Blainville dit que
c'est une similitude avec le dent de la tatarie, qui est un dent de dent
le dent de Bouffon (1833), pour de dent, rappelle
et M. de Blainville, plus de fibres pour pour Bouffon.
M. de Blainville ajoute qu'il a vu pour pour de 3^e
supérieur qui pour de la tatarie pour Lignier. avec de
Bouffon est attaché au 3^e Lignier. pour pour de 3^e pour pour
qu'il a le dent de la tatarie et un Lignier pour de 3^e
le dent de la tatarie qui est de la dent de la tatarie et de la tatarie

Dent de Bouffon qui est de la dent de la tatarie
après de la dent de la tatarie.

le dent de la tatarie pour de la dent de la tatarie
et de la dent de la tatarie pour de la dent de la tatarie, plus de
III. fig. 1 et 2. p. 512

Dent de M. Blainville pour de la dent de la tatarie
de la dent de la tatarie pour de la dent de la tatarie

Thellenshof pour de la dent de la tatarie.

Le marabout pour de la dent de la tatarie

Le dent

petite tatarie de la dent de la tatarie.

le dent de la tatarie pour de la dent de la tatarie

de M. de Blainville.

avec de la dent de la tatarie - rappelle de M. Lignier

pour de la dent de la tatarie. M. Lignier, dent de la tatarie.

ou a tatarie de dent de la tatarie de la dent de la tatarie

de la dent

Lignier de la dent de la tatarie
L. Lignier
M. Lignier
M. Lignier
M. Lignier

Mr. Anduin ?

Dans le dent rapporté de la République d'
Signature par Mr. Bourcier ancien consul de
France à Gênes, il s'y a peut-être dans
la valée ~~intermédiaire~~ intermédiaire qui par
profonde et en la membrane des poires ne
sont guère développés ; il y a aussi
une interruption qui est un grand trou avant
la denture ; ~~est~~ cette dent qui est
à trois collines ou à la denture légèr, pour-
tant est la première inférieure gauche.
Au-dessus ~~la dent~~ l'intermédiaire de
par Roubaix dans le Mr. Harbott de
les valées, surtout de cément fait former
à Roubaix par de denture tubercules
intermédiaires. Elle le rapporte de Roubaix
de par Roubaix dans le Mr. de Roubaix, pour
espérer qu'il y ait dans l'habitat ~~intermédiaire~~
une appétition préparée.

Dans l'acte dent Roubaix rapporté de
par Roubaix de Roubaix de Roubaix, il
y a de Roubaix dans le dent de Roubaix, cependant
la dent de Roubaix comme Roubaix de Roubaix
une plus comme Roubaix de Roubaix de Roubaix
et Roubaix de Roubaix de Roubaix de Roubaix
une dent de Roubaix de Roubaix de Roubaix
que Roubaix de Roubaix.

(il y a 3 acte Roubaix de Roubaix
rapporté par Mr. Harbott. Un de Roubaix
de Roubaix de Roubaix de Roubaix de Roubaix
à Roubaix de Roubaix qui Roubaix de Roubaix
à Roubaix de Roubaix de Roubaix de Roubaix)

Dans le dent rapporté par Roubaix, il y a
une denture de Roubaix qui Roubaix de Roubaix
à Roubaix de Roubaix de Roubaix de Roubaix

D. de Wedd.
Mantre de l'abbaye - D'os, presque ronds, plus
lourds que dans le semencier - mais l'abaissement à
la pointe, courbe peu sensible, torsion plus
marquée qu'en le semencier et surtout qu'en
l'angustius. band d'os blanc et dur, la torsion
est forte. L'insertion au tibia est forte
de force - de force très forte.

M. longirostris - il y a positivement dans le mandibule
un premier et un deuxième molaire inférieur de
remplacement, le premier dans la forme d'aller de
M. semicollis, le 2^e a un fort
talon et deux tubercules finissant au 3^e collin
ce qui doit être, le 2^e est un autre molaire
remplacement avec un collin de plus que dans
le M. semicollis, c. a. d. 2 collins.

M. Nary signale comme 1^{er} Supérieur
ayant un dent à 4 tubercules dans la région qui
est bien de côté gauche. mais ce n'est pas
un premier de la série puisqu'il porte la
avant comme la série à l'origine de deux dents
dont la plus haute se voit très comprimée. par
que de compression le tubercule et l'apex de la
dent disparaissent suffisamment qu'il est un dent
de remplacement. le 2^e a deux dents qui sont
le premier d'un premier de remplacement et suivent
de la 1^{re} série molaire. il y a dans le mandibule
de molaire la même large et dentée un

homologues à l'opercule
 des arthropodes à deux valves avec des prothorax, les
 gros sont antérieurs à ceux des myriapodes. Ils sont un
^{meuble} ~~meuble~~ de compression sur les faces latérales et les
 faces postérieures. Ils sont en trois ou quatre rangs
 C'est à dire un ~~rang~~ de myriapodes supérieurs qui les
 tiennent comprimés les deux autres myriapodes les
 tiennent comprimés ^{sur les faces latérales} les deux autres myriapodes
 qui les tiennent comprimés ^{sur les faces latérales} les deux autres myriapodes

M. angustatus de marte pichin

permittent même aux dents de tout
 point possible à celui de l'articulation

- M. longistatus -

permittent même aux dents de tout point possible à celui de l'articulation
 à peu homologues dans la structure à l'opercule
 présente les mêmes dents qu'il y a un peu
 mais pas à l'opercule et la dernière rangée transverse
 pour compléter la denture mais on trouve
 les dents sont comprimées à l'opercule des
 variations plus importantes

M. pichinensis

les dents sont plus espacées que les dents
 de forme à celle de M. angustatus. Elles sont
 l'opercule des myriapodes et les autres rangs
 les sur l'art et plus marquées à la
 mâchoire supérieure de la ^{mandibule} ~~mandibule~~ interrompant

La proportion des divers parties de leurs membres ne
font pas les mêmes que dans le grand mammifère.
D'homme comparé au fœtus. Les os sont plus
souples, les tendons sont plus courts, les ligaments
et les tendons sont plus courts, les os sont plus longs.
La brièveté remarquable de ces os met en évidence
la brièveté même que les joints ont la forme de
moignons arrondis plus ou moins, comme par exemple
dans les os.

Il paraît d'après M. Cuvier l'opinion que
la suite de mammifères du premier et l'artérian
la suite de mammifères du premier et l'artérian
la suite de mammifères du premier et l'artérian.

M. Cuvier croit que dans le grand mammifère la suite
de mammifères du premier et l'artérian. Les os sont plus
souples, les tendons sont plus courts, les ligaments
et les tendons sont plus courts, les os sont plus longs.

Les os sont plus courts que dans le grand mammifère
et les os sont plus courts que dans le grand mammifère.

La suite de mammifères du premier et l'artérian.

J'avais vu de la mouture de
pierre pour toutes
les puz en volay (alluvions volcaniques)

~~celle de la vallée de la Croix~~

n° 97 une dent usée à 4 colons. C'est la 1^{re} arriv. n° 10

inférieur gauche. elle a été à l'usage

de colons à malocclusion sub-orthogonale. mais
les contours émaillés d'émail sont fortommes
comme dans le modèle du N° 10. par l'orth.

(Du puz en volay alluvions volcaniques)

N° 99. Dente ~~alga~~ à 3 colons. C'est la 1^{re} arriv. n° 10

Supérieur droit. les colons sont très étendus
par la distorsion. elle présente des figures

de denton intermédiaire par le Van

à celle de simulacra et de lapp etc.

l'apex. mais cette dent n'est pas

abolissant. Ressemblant à son analogue

en n° 10 dans l'un ou l'autre type, qu'il

est rapproché de son faisceau d'apex.

son aspect l'apex, n'est pas le même

que celui de la précédente et l'on pourrait

dire qu'elle provient d'un autre gisement.

des autres dents n° 10 d'arrivage.

la dent 97 b. de la collection croix et la par

mauvais état. ~~1000~~ l'apex est fortommes. Elle

comme dans le modèle du N° 10. C'est

un gros imparfait de denton n° 10. C'est

évident les très altérés. il a une gage usure

de forme et de forme, avec la dent de

l'apex de la dent. Mais dans la proportion

réducte. — Très indur.

— Dans un modèle la petite dent de

inférieur droite fort l'apex, venant avec la

collection de la dent de la denton sub-orthogonale

de ~~1000~~ de la dent de la denton sub-orthogonale

de la denton sub-orthogonale. A cet effet que elle

dent ne peut être l'apex de la dent de la denton

et qu'elle est très probable de la dent de la denton

elle dent est de la denton sub-orthogonale de la denton

que les dents de dent de la dent de la denton de la denton

la dent de la dent de la dent de la dent de la denton

même terrain.

- Hamodon* 3^e lat. 8 larv. 12 larv. - 3^e m. 16 larv. - 3^e m. 20 à 40
Loxodon 4^e lat. 7 larv. - 1^e m. 7 à 8 larv. - 3^e m. 9 à 10
Stenodon 3^e lat. 6 larv. - 1^e m. 6 larv. - 3^e m. 7 à 8 larv. - 3^e m. 9 à 10
 Variétés de la série Stenodon - quelques fois 16 larv. à la 3^e m.
- 1 *Steg. prunigerus* 4^e lat. 22 larv. dans le 1^{er} m. - 18 s. - 1^{er} m. - plus large. Larve plus mince & moins fatiguée. plus petite à la 3^e m.
 - 2 — *Indicus* 2^e lat. 18 larv.
 - 3 — *rematius*
 - 4 *Antigonus* 2^e lat. 2 larv.
 - 5 *Antigonus* 2^e lat. 19 larv. plus mince que dans le *Stenodon* - plus mince dans le 1^{er} m.
 - 6 *africanus* 3^e lat. 9 larv. & un larv. lat. plus haute que large.
 - 7 *prunus*
 - 8 *glanifera* 3^e lat. 9 larv. plus haute que large.
 - 9 *inipini* 4^e lat. 10 larv. plus large que haute (mot en français) ^{2^e lat. 8}
 - 10 *ganga* 3^e lat. 10 larv. & un larv. (ganga de Pragny, Saône & Loire) ^(les deux sont à l'indien)
 - 11 *bombifera* 4^e lat. 8 larv. plus large que haute & plus large.
 - 12 *Chiffa* 3^e lat. 7 larv. - 6 larv. en photo idem plus mince.
 - 13 *metodon latidens* - médium intermédiaire à 4 colonnes
 - 14 *M. longiratus* 3.
 - 15 *M. longiratus* 2.
 - 16 *M. longiratus* 3.
 - 17 *M. longiratus* 3.
 - 18 *M. longiratus* 3.
 - 19 *M. longiratus* 3.
 - 20 *M. longiratus* 3.
 - 21 *M. longiratus* 3.
 - 22 *M. longiratus* 3.
 - 23 *M. longiratus* 3.

fauna sivalensis

Metodon latidens - *metodon prunigerus*,

La molaine sivalensis, fig. 40, fig. 8 & 8 a
 & donne comme tout de M. angustidens, et
 une prothèse inférieure droite de M. prunigerus
 (fig. 8). En. et le mot de 3^e m.

La molaine sivalensis 35 fig. 10
 comme tout de Metodon longiratus, et une prothèse
 supérieure droite. Est également pour la 3^e m. et
 de la 3^e m. dans le M. longiratus & Pragny.
 Est également pour la 3^e m. et
 tra. prothèse comme indente 1^{re} prothèse possible

M. latidens. Dent intermédiaire à
 4 colonnes. Dent intermédiaire à 3 colonnes.
 Dent de 3 colonnes.

Extrait de la faune bialorbi
mai 1846.

Les opinions des proboscidiens fossiles ont
longtemps été regardées comme
L'histoire démonstrative de l'ancienne géologie
de têtes, de queues et d'autres très faibles qui
nous ont été transmises pour la partie de la
spécification et de la nomenclature. Les uns les
grecs et les Romains d'autrefois, les préhistoriens
de l'école rapportant leurs animaux aux
actuels, aux Narkas ou têtes qui occupent
un si grand place dans les sciences de la
vieillesse.

Il y a donc parmi les paléontologues
et la zoologie de l'époque ou nous vivons
une grande diversité d'opinion, à propos de
degré d'affinité et de rapports génériques de
différentes espèces de Mastodons et d'Eléphants.
La plupart, partant de l'acte d'union et
d'union, se sont considérés comme constituant

deux genres distincts et bien marqués, quoique
leurs 3. très près. D'autres ont posé le Mas-
todore à la fin des genres. M. de Blainville
est devenu à cette opinion des années d'observation
que ce qu'on a appelé le Mastodonte
la plupart n'est que la même modification
d'un même type d'homme le plus hétéro-
gène toute la ligne pouvant appartenir
à un seul genre dans la limite d'un seul genre.
~~constituer~~ une différence plus grande d'opinion
et d'un bien plus grande importance à propos
de ce qui touche le nombre et la caractéristique de
l'espèce, ce tandis que la divergence de vues
concernant la distinction générique, n'a pas que
que les classifications systématiques, la détermination
spécifique ou l'espèce fossile affecte la valeur
ou fait et fournissent de puissants arguments
pour la géologie des terrains ^{deuxième} tertiaires,
tantôt en ce qui touche aux changements de
climat que l'on suppose avoir accompagné

leur formation, et l'extension des laves dans
une si grande étendue de temps, et de
long.

Cuvier considérait tous les restes d'éléphant
que l'on a trouvés en Europe, dans le
nord de l'Asie et de l'Amérique, soit qu'ils
provinssent du Silure ou du Pliocène ou de la
Pérouse, ou du dépôt tertiaire de val
d'Aoste, comme appartenant à un seul
espèce, l'éléphant primitif.

L'opinion d'un seul genre
toute les espèces et la possession de toutes
les ossements d'un même animal, soutient
la même opinion.

M. de Blainville ne peut pas même
que l'absence relative de caractères
suffisant pour séparer le mammouth
de l'éléphant indien, qu'il paraît regarder
comme étant simplement des variétés de
le même espèce (Hist. Nat. de l'Europe, p. 222)

D'autre part, M. Teste, après un long
^{examen} soigneux de ces fossiles d'éléphant d'Italie,
pendant un période de vingt ans, et dans une
collection riche de mille matériaux en forme de
Crâne, de mâchoires et de dents, insiste sur
la distinction spécifique de l'éléphant fossile,
M. meridionalis, d'avec le vrai Mammouth
de Sibirie. D'autres paléontologistes ont été
parvenus à faire 10 espèces au lieu de la
seule espèce de Cuvier, fondant leur
distinction sur les caractères de la denture
présentée par les dents molaires.

Une même diversité d'opinion d'avis
existe en ce qui touche les Mastodontes
Cuvier, Owen et de Blainville parviennent à réunir
les mastodontes à deux dents d'Europe dans une
seule espèce, soit Cuvier à même étendue l'extension
géographique jusqu'en l'Amérique du Sud. Tandis que
Croiset et Jobert, Kays, de Meyer et autres
les distinguent en deux espèces, la Mastodonte

longirostris & le M. angustirostris.

On s'aperçoit à l'é' jusqu'à faire
deux genres & au moins 10 espèces nominales.
Après des dents qui blanchissent, souvent
d'autres caractères attribués simplement à
différents âges ou sexes de la même
espèce; le M. christiani de l'Amérique du
Nord. Mais, les espèces fossiles, la de nos
à celle de l'Inde, sont limitées par certains
autres à des ^{parties} types & écartés ou
vingt Martens. L'autre Longirostris
le nombre de premiers à 10 et celui
des Martens à plus de 20 espèces.

Ch. Felsmann & Conroy font la proposition
de créer un peu près parfait de cinq des
espèces qu'ils ont décrites & une brève des caractères
de ont peu obtenu de crânes avec la dent
de tout âge, depuis la plus jeune individus
qu'à des adultes.

il résulterait qu'il s'agit de l'Amérique et l'Europe il y a
des paléontologues qui ont l'opinion que les dents de
l'Europe, mais après Carter et Sauter et d'autres
travaux de l'Amérique opposent la faune
centrale sans plus d'une circonstance de formes
très distinctes dans la même espèce nominale.

De plus, quant aux espèces qui ont été en
différents temps mais l'écrit en un genre commun
les caractères écartés dans les Martens &
le développement ^{de la dent} de dents martens, les
Martens & le type, leurs conclusions
sont, dans une certaine mesure, en l'honneur
avec elles de beaucoup de paléontologues qui
les ont précédés de l'Inde & d'autres familles.

Il est ^{pour} cependant difficile de donner une
histoire des travaux des autres auteurs; il y a
vraiment l'écrit et l'écrit ~~parlement~~ l'écrit de l'écrit
par le grand nombre de livres jusqu'à l'Europe on
a l'écrit, et pour ce qui est de l'écrit on
peut l'écrit la dent de l'écrit, et pour

Orson J. West, Brown, de Kige, Kany, et
autres paléontologues.

même après la traversée de l'Antarctique,
de l'Alaska, de l'Alaska et du premier Camp, ^{de l'Alaska}
de l'Alaska par de l'Alaska sur la superficie
de l'Alaska de l'Alaska, le a été qu'elle
se reproduit plus d'une fois pendant la
vie de l'animal, les ~~form~~ ^{et} ~~se~~ ^{pour} ~~se~~ ^{pour}
l'Alaska le a été de la nature. le mémoire de
^{paléontologie}
Alaska qui paraît dans les *Transactions philosophiques*
de 1797, donne des notions sur les ~~lignes~~ ^{sur}
sujets. c'est l'Alaska l'Alaska qui a été
l'Alaska plusieurs années de l'Alaska avec le charge
de l'Alaska l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska
Alaska, l'Alaska. par la prise de l'Alaska
l'Alaska l'Alaska, je a été la faiblesse
l'Alaska le a été et le l'Alaska
l'Alaska de l'Alaska, de l'Alaska l'Alaska le plus tard
l'Alaska l'Alaska, le a été le a été le a été
l'Alaska. et il a l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska

Alaska à la disposition plus de 30 ans
de l'Alaska l'Alaska, par la prise de l'Alaska le
forme, le l'Alaska et le nombre de l'Alaska qui
l'Alaska dans la composition de l'Alaska à l'Alaska
l'Alaska de la vie de l'Alaska. le observation
l'Alaska dans la l'Alaska l'Alaska le l'Alaska
qui a été l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska
l'Alaska. l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
de l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska qui paraît
le l'Alaska ~~de l'Alaska~~ à l'Alaska de l'Alaska,
l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska. il
l'Alaska l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska l'Alaska
l'Alaska, qui l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
qui l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
l'Alaska l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska. il a l'Alaska
le l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska et de l'Alaska
l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
l'Alaska et l'Alaska de l'Alaska de l'Alaska, et il
a l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska
l'Alaska. l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska l'Alaska

la observation porte sur la dent molaire. Il
 a montré qu'elle se reproduit plusieurs fois
 pendant la vie, et que le nombre de lames
 qui se trouvent dans la composition de chaque
 dent varie en croissant à mesure qu'elle se
 développe. Il a pu constater d'ailleurs
 cette succession jusqu'à la 4^e molaire. La
 1^{re} paraît se former 8 ou 10 jours après la
 naissance et elle est bien formée à 6 semaines. Elle
 est composée de 4 lames. La seconde les dépasse
 la première à 2 ans et la compose de 8 ou
 9 lames. La 3^e paraît se former entre 2 ans et 3 ans.
 Elle porte 12 ou 13 lames. La 4^e entre la
 3^e et 6 ans et la compose de 18 lames. ^{La 5^e paraît}
 se former entre 6 et 10 ans et la compose de 22 lames. ^{Assés} sans doute
 par l'irrégularité de nombre de lames et de
 direction de molaires qui paraissent appartenir
 à la même dent, et qu'elle observation
 l'auteur court au point où les observations
 cessent d'être concluantes, et il ne cherche

pas à définir le nombre de lames dans la
 dent qui forme la 4^e. Il établit, sans
 manière générale, que le nombre croissant de
 lames paraît être jusqu'à la 7^e et 8^e.
 que chez l'homme. D'ailleurs la composition de 22 à 24
 lames, est le nombre le plus considérable qu'il ait observé.

Le nombre simple de molaire attribué
 à l'hydat pour être fait adopté par l'auteur
 et l'auteur ~~accepte~~ jusqu'à 1844. L'auteur
 le qualifie ^{de fait} pour la première fois ^{chez l'homme} M. de Haime
 dans la partie de son orthographe à l'étranger
 d'hydat. Brown dans la lecture (Bibliothèque
 zoologique, 1838 p. 1240) et le signale de la source de
 la probabilité attribué 8 molaires à l'hydat, mais
 le dernier n'est pas le cas - que 6 ans méthodes (gros, gros,
 pendant 1842, v. III, p. 771)

L'auteur ne s'est pas appliqué à distinguer de
 l'hydat la dent de lait, sans l'hydat
 dans l'orthographe, qu'il ait été de la dent
 d'hydat pour la probabilité. Il s'est appliqué

[illegible]

Signe pour peindre la nature du lait d'un genre,
 à le différencier par la signification qu'il lui donne.
 L'abréviation d'un dent de remplacement ^{(selon les genres on}
 ou plus l'âge de l'individu, le conduit à peindre
 que le 3^{ème} ^{dent} premier dentaire fut le dentaire de dent
 de lait, mais que le 2^{ème} premier dentaire fut
 temporaire et que le dent qui avait du nouveau
 remplaçant le 3^{ème} dent restait lui à développer.
~~(concernant)~~ ^{Remarques} (actually undeveloped) ie l'absence
 ce ven à l'hygiène ou l'usage les trois premiers
 dentaires qui se développent d'être en position de l'adulte
 avec le dentaire de dentaire de lait ^{en l'absence} de dentaire original.

Nat. Linn. se propose deux nouvelles espèces, le 1.
Représenté par un machoire inférieure par dent, laquelle
est caractérisée par une prolongation particulière
la forme de la gouttière de la symphyse la symphyse
symphyse; le second qu'il nomme Elephas
Minimus, habitant l'Inde. Sur un machoire inférieure,
est distingué par la petite dimension du squelette, par
l'absence de la symphyse la dent et par la petite
denture. On présente la dent de son
Molaires. Curieuse refuse d'admettre l'existence
d'un éléphant proposé par Meade et de l'existence
de la machoire inférieure et la première denture phalange
de la denture supérieure qu'il éléphant, et
quant à la seconde, il la considère comme venant
d'un jeune éléphant. Mais après un long
séjour revint par son ce sujet le 1825, dans
un mémoire qui résumait les résultats de l'expédition
Hindou soigneusement faite pendant 17 ans. il
admet tacitement la justice de la critique
fait par lui-même au sujet de la seconde

espèce qu'il avait proposée, et abandonnant l'Elephas
Minimus la Protoprodon et la première espèce, il
produit une liste de preuves tirées de nombreux
os et de tout âge, depuis le fœtus jusqu'à l'adulte, et
de machoires inférieures des os des fleurs et autres, qui
toute dit et, montre la prolongation particulière de la
dent la symphyse en continuité avec la dent d'éléphant.
Des lors il s'est efforcé de prouver dans la proposition d'existence
d'une espèce qu'il appelle qu'il donne le nom
d'Elephas d'éléphant Minimus.

L'opinion de l'existence de l'éléphant Minimus a été
précisée par la paléontologie, et a été adoptée
par quelques auteurs d'éléphant trouvé le squelette
le nom a trouvé un place dans l'observation des
éléphants existants dans la paléontologie de Meade. mais les
n'ont pas admis par Smith Brown, Stairville
ou plutôt, et il résultait de certains passages des
British fossil mammals, et la grande autorité d'Osborn
font contraire à l'existence d'une espèce.

Le 1825 Goldfuss décrit un ossement trouvé dans

collection de coquilles de galea ressemblant plus à
l'éléphant d'Asie pour la forme du boudin
et le nombre de dents de la lèvre. Je ajoute que
la spèce que j'ai d'origine inconnue présente
un cimet et une corne de la même forme que
la dent fœtale de l'éléphant. Dans un point
mémorable, je trouve un autre dent trouvé par
les bords du Rhin, en Westphalie et attribué
à un singe d'Asie que la vallée de Rhin
à l'éléphant d'Asie par un éléphant
qui était plus voisin de l'éléphant d'Asie
que la mammouth n'est de celle de
l'Inde il a presque le même pourcentage
à la même éléphant d'Asie. Curie-
usement quelques dents de l'éléphant de l'Inde
mouvent avec les dents fœtales, ce qui est dû
à l'éléphant de l'Inde de la galea à avoir la
tranche; il les considère comme en tant que
dents que de la dent d'éléphant d'Asie d'Asie
d'origine moderne, mais d'origine d'origine

+ Bonn. Lithogr. nat. p. 1244

de, dent fœtale d'origine d'origine et le troisième
squelette, d'origine, d'origine, d'origine, d'origine
toute la partie centrale de l'éléphant d'origine de l'Inde
jusqu'à la dent de la corne quelques dents ont été
trouvées par Wagner (Kartenbuch. XVI. pag. 21) et de
dent indubitablement une fœtale présente de l'éléphant
semblable ont été trouvées dans les dents de l'éléphant
de la vallée de la lèvre à une profonde corne de
la dent de la lèvre. Je la présente plus loin.

fœtale d'origine, en 1844, j'ai pu de
l'origine de l'éléphant d'origine de l'Inde d'origine d'origine
fœtale d'éléphant fœtale de l'Inde d'origine de l'Inde
d'origine. Il la nomme et particulièrement d'origine,
El. Amplexus, El. Kamenskii, l'éléphant, et
El. pygmaeus. (Bull. d. l'Ac. d. Sciences. t. 4. pag. 275. sur
de la dent d'origine. t. 1. pag. 285. Le 28. d'origine de l'Inde
plus loin et d'origine d'origine d'origine d'origine, de la
polygène, sur la dent d'origine d'origine d'origine (voir aussi au cas.
Le 1844. de 1844, pag. 27. tab. 63.) mais la polygène
d'origine d'origine de l'origine d'origine d'origine de l'origine

— 1793 — prennent d'origine L. Martindale

2. L'avis par le nom: Elephas americanus

— 1797. Schumacher, l'avis en un lot

à genre par le nom: Mammoth Americanum

qui caractérisent brièvement par la forme
des dents

1798. Currier dans les premières éditions, le

dent comme une ligne de genre

l'éléphant pour la désignation précise

appliquée plus souvent à Elephas americanus

— plus tard admette Elephas americanus

à même qu'il n'en soit pas la même genre
propre de l'éléphant à déterminer

et Ele. mammoth.

— mais dans son second travail plus tard

à 1808, Currier par les proboscides

à dent mammoth du Elephant

il réunit les premiers dans l'appellation

de Mastodon y joignant pour type

l'avis de mad. de Cuvier sur le nom

de Mastodon giganteum. Ceci le dernier fait
par suite de ses hypothèses de genre à l'avis qui
fournit l'avis matériaux pour la comparaison
des mastodons avec l'éléphant vivant, l'avis

signale la correspondance entre les dents, en tenant
à tout le squelette, l'avis de dent molaires.

Il admet même, quant à ce dernier, que le

différentiel les mêmes traces mammoth de

Mastodon et les dents mêmes de l'éléphant, toutes

proportionnelles aux proportions, mais il insiste sur

cette distinction locale que dans les Elephant

les intestines des autres mammifères sont l'avis

l'avis par le même qui manque dans le

dent de Mastodon. la addition à cette

différence l'avis "il trouve de l'avis de l'avis

correspondants dans la forme de l'avis, qui

le l'avis dans les dents de l'avis de l'avis

général l'avis même l'avis le Mastodon

et l'éléphant. (avis par l'avis. 221.) dans

le même mammoth Currier caractérisent

Quatre autres types de la même série : M.
argenteus dans lequel il n'est, toutes les
des traits dans la largeur de quelques
ans l'Amérique; deux types de l'Amérique du
Sud, M. andinum et M. humboldtii et un petit
type qu'il nomme M. trimitus. plus tard il
ajoute deux ou trois types de la même
de M. lepidus.

Quant à la classification, d'après ce
avis admis chez la plupart des auteurs de
series générales, il me paraît assez évident
que dans la grande série américaine, l'Amérique
forme l'élément principal de la méthode ou il
vient le l'Amérique de voir que la série diffère
à la base et à la fin. (18 L. tout) il
n'est pas impossible de reconnaître de l'Amérique
l'Amérique de la série à la machine d'après
mais il fut le premier à signaler l'observation
que dans la série argentine, l'Amérique même
antérieure de la machine supérieure avait de

les renseignements satisfaisants, c'est dans le même
de des figures de la même série (voir mat. p. 3. fig. 2)
qu'il établit ce point de la série présente la
signification distincte, quoique avec une certaine ressemblance.
mais (moins exactement) dans la série argentine de
types, il n'y a pas de la même série d'Amérique et
forme très distincte. Cependant même par un
semblant différent ~~de la même série~~ de la série de
changement. ~~théorie~~ L. M. lepidus et la
M. argenteus. A la fin la série américaine forme
néanmoins à trois M. argenteus, dans la hémisphère
laquelle nous sommes avec les renseignements à un plus
forte M. andinum et M. de l'Amérique. quant
à la série américaine de M. de la (minut) elle
n'est autre chose, mais elle se perd dans l'Amérique
qui est une série distincte de la même série.

théorie L. 1845 (mon. d. l'Amérique de la série d'Amérique L. V.) met
la question d'Amérique de la même série d'Amérique de la même série
ou quelle d'Amérique de la même série de la même série. la
cette division d'Amérique de la même série de la même série.

Égypte M. de Haidek.

Autre origine de l'ancien Égypte il a assimilé
l'histoire about de l'ancien dans le musée
du musée. il le voit que cette position
n'est pas présente la quantité d'objets dans le
musée égyptien; quelle est cette position par rapport
dans le M. égyptien et dans le musée, mais
il est sûr la position d'Égypte. un autre dans le
M. égyptien. nous l'avons retrouvé dans la position
la date de l'Égypte, au point de l'Égypte, un peu plus
rapportée par l'Égypte, l'Égypte et l'Égypte de l'Égypte
à l'Égypte, et après de la date de l'Égypte de l'Égypte
bonne aide d'Égypte d'Égypte par la Égypte
d'Égypte.

Plus d'Égypte jusqu'à 1825 de l'Égypte à
l'Égypte. à l'Égypte d'Égypte
l'Égypte fait faite par M. de Haidek, le
la date de l'Égypte, l'Égypte de l'Égypte, l'Égypte
la même date et figure dans la transaction

géologique de M. de Haidek qui nous a grand
prix et l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
dans l'Égypte indienne, l'Égypte qui par la forme
la même de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte,
l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte et la
l'Égypte. il a nommé les Égypte de l'Égypte de l'Égypte
M. de Haidek, et par la forme, il fait l'Égypte par
une position de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
la même de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
un peu de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
les deux Égypte. M. de Haidek, nous envoie, nous
nous envoie la même de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
qui est d'Égypte de l'Égypte de l'Égypte (M. de Haidek)
la l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
spontanément et la deux Égypte de l'Égypte de l'Égypte
de l'Égypte qui paraissent d'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
forme distincte.

En 1825 M. de Haidek a écrit de l'Égypte de l'Égypte
M. de Haidek, l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte
provenant de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte de l'Égypte

à fin d'admettre que même en qui paraît être
l'absence d'un indice infime persistant, et
quodammodo et la même qui a été signalée
1830, l'observation de deux parties de figures infimes
dans un même d'habitude de denture
qui sont caractérisés un genre distinct et
probablement par le nom de *tetracaulodon*.
M. Cooper, ^{et peut-être} ~~celui~~ le ~~nom~~ d'un *Stetho* l'opinion
et la figure à de d'opinion d'opinion d'opinion. et
après l'opinion de M. Cooper. mentionné en 1831,
M. Haug, l'ont dit d'habitude de l'opinion lui-même
et quodammodo, il alla même voir la denture de
l'opinion d'un nouveau genre *tetracaulodon*, et le
ont dit le genre de nouveaux l'opinion de mœurs
pour le nom de l'Amérique, et dans ce même il
dit dit le ~~genre~~ par un ~~genre~~ ~~nom~~ d'un
d'habitude d'opinion d'opinion par la ~~denture~~
de denture d'opinion la mœurs d'opinion d'opinion
pour la denture d'opinion d'opinion d'opinion
chose même, et de la denture la denture

et l'absence d'un indice d'un indice d'opinion. pendant
que cette denture la denture de denture, le
d'habitude d'un ~~genre~~ ~~nom~~ d'un ~~genre~~ d'opinion
de denture d'opinion d'opinion fait la denture
de denture Haug, d'un l'opinion d'opinion
M. d'opinion. et d'habitude d'opinion d'opinion
d'un d'habitude d'opinion d'opinion d'opinion
probablement d'opinion d'opinion d'opinion et le
de denture de la denture d'opinion l'absence d'un
de denture d'opinion d'opinion pendant que la denture
d'opinion d'opinion d'opinion d'opinion d'opinion
et un genre de denture d'opinion d'opinion
de la denture d'opinion. Haug, d'opinion d'opinion
d'opinion d'opinion d'opinion d'opinion et il d'opinion
tetracaulodon d'opinion; mais pour tout, reconnaissant
la valeur de denture d'opinion par la denture d'opinion
d'opinion d'opinion d'opinion, je reconnais de
pour que d'opinion d'opinion d'opinion, d'opinion d'opinion
d'opinion d'opinion d'opinion, la denture d'opinion
et d'opinion d'opinion d'opinion, la denture d'opinion
et M. d'opinion. et de denture d'opinion d'opinion

De la même espèce, mais à dent guère
moins fine que typique de Martens, de 2 dents
totaux de l'arc. Pour le m. d. m. Sivalensis, on
il se son' d'angle d'écarts en ager.

2nd espèce Owen a proposé le
nom provisoire de M. Australis pour un
form qui repose sur un seul specimen
reçu de l'Australie. nous nous l'occupons
à savoir si on le peut sans inconvénient.

Le fossile précédent, bien avant l'époque de l'été
laque, présente des caractères généraux et l'épave et
le matériel sont incluses par le démontage de
l'épave nommé M. l'épave par Clift, il
devient évident par les dents et de la même pour
un même nom générique, on a cherché d'autre
caractères pour maintenir le caractère distinctif.

~~nom~~ Owen, dans la ⁽¹⁸⁵⁸⁾ description, caractérise le
Martens par la dent inférieure, par la longueur
similaires de l'épave de machine d'angle
grand d'angle de machine, et par le rang de dents

Martens dans machine antérieure. de la
même animal. il définit le caractère distinctif
de l'épave, par l'absence de dents inférieures, un
nombre moindre de dents plus anguleuses, point de
dent de char machine, et la présence uniformément
artère postérieure de tout le fin de machine, pour
un remplacement naturel.

M. de Blainville après avoir examiné que dans
l'épave avec les Martens de l'épave
de dents principales de l'épave et le même, que le même
de développement et uniformément artère postérieure, en outre
les dents de l'épave le ressemblent à tel point
qu'il devient difficile de séparer pour les os détachés
— ~~général~~ de l'épave appartenant à un l'épave avec
un matériel, qui lui a été connu le Martens
de machine, il se présente une série de gradation
intermédiaires, formant le passage de l'un à l'autre genre,
et ce les différences observées dans les organes à cet
égard sont qu'une signification indicative de l'épave
de machine visible qui existent dans l'épave d'épave

D. es Lycop., abonde le genre *Mastodonta* latic
 plus luvie, et c'est le premier *Stenotermis* de
 la suite à l'Alphar pour le genre
 d'Alphar, et c'est le premier des *Stenotermis*
 et *Mastodonta*. Dans la première colonne les
 Alphar sont dits, c'est à dire les des Lycop
 Lycop., avec l'Alphar *primigenius* certainement admi
 comme un forme distincte, et l'Alphar *latidorsus*, pour
 lequel il vient le des Lycop., Mr. Lycop. sub-latif,
 de cette pour l'Alphar. Dans la seconde section
 comprenant le *Mastodonta typicus*, il dit
 admet l'Alphar 4 Lycop. Sa. l'Alphar *obliquus*, l'Alphar
 l'Alphar *obliquus* typicus avec l'Alphar *piralidis*
 comme Lycop. distinct. il est à remarquer que
 Mr. de Hamel n'a rien pour fait d'Alphar
 à l'Alphar des mêmes de rapport pour l'Alphar
 verticaux, dans la même Lycop. de certains
 Mastodonta, bien que l'Alphar de fait est le
 Alaphar pour luvie dans le Lycop. de Lycop. et enfin
 plus tard pour l'Alphar, dans une observation très

primigenius. Il suit la direction de l'axe
indien descendant, par elle-même
la direction de l'axe descendant transversal.

La série des publications peut être divisée
comme commence par les deux les plus simples et
la moins volumineuses qui ont été de Diosthenes
lesquelles persistent ainsi dans la même position
le sur et le sur de l'axe, ~~et transversal~~
~~et transversal~~ ~~primigenius~~ la suite de la
série des publications et des publications primigenius
de la même position de la même position
la plus grande direction de la forme
ordinaire sans être transversal.

Le nombre et la forme des sautes part
la relation avec les divisions et la hauteur
de la colonne, elle peut être petite nombre,
grande largeur et plus ou moins distincte dans
les publications, tandis qu'elle est moins manifeste
même, comme et influente dans les publications.

Dans la suite de maturation (la colonne proprement
dite ~~et transversal~~ ^{la suite} la suite par elle-même ^{indien} la suite
transversal et divisé de deux par, par; longitudinalement
suivant la suite longitudinale, par une suite ou plus simple
qui commence dans l'hypogastrium et la suite par le dessous
~~la suite~~ la suite en deux parties à peu près égales. (La
suite et plus ou moins distincte trois fois la suite) ^{indien}
la suite et la suite transversal par des sautes
profondes qui alternent avec des sautes plus ou moins manifestes
ou transversal. (La suite sautes) (La suite sautes
latérale ou sautes) (La suite sautes) (La suite sautes)
la suite sautes plus ou moins distincte par sautes
ou manifestes ~~sautes~~ sautes. Dans la suite sautes
la suite sautes. il y a la suite sautes
distinction la suite sautes).

Chaque division latérale de la suite de sautes transversal
est composée ordinairement d'un saute de quatre sautes
et confluent transversal. Dans la suite sautes la
suite sautes la suite sautes la suite sautes
dans la suite sautes et elle incline graduellement

* et à peu près perpendiculaire dans la suite longitudinale
par sautes sautes et sautes sautes sautes sautes

convergence transversalement; les lam. latérales surtout vers
la partie postérieure s'inclinent le moins et le plus vers le
devant que les autres inclinent de dehors le dedans.

Dans la dent le cément et le plastron continuent qui forment
le plus vite, après vient l'os et enfin l'os qui se trouve
traverser le cément. — Les racines convergentes
aux lamelles qui sont complètes et se trouvent
chaque dent se perdant dans les os.

2. Elephant indien - 8^e Sup. 22-24 lam., long. 14, larg. 3,
hauteur 8. Ciment mince, postérieur et postérieur, postérieur dans
la partie antérieure et postérieure.

1. Eleph. primigenius - 8^e Sup. 22 lam. dans l'os
surgent par 18 lam. de l'os. Ciment plus mince et
disposition latérale postérieure. Ciment plus large et
les os osseux postérieurs et postérieurs.

3. Eleph. namadicus

4. Eleph.

5. Eleph. pygmaeus - 7^e Sup. 14-18 lam. plus mince que dans
l'Elephant d'Afrique et un plus grand nombre et origine dans
le même osseux (18 pour 9) lam. plus verticales. L'os osseux
grande cément plus large que les lam. d'os. Le cément l'os
plus épais = proportion que dans l'Afrique la hauteur verticale est
moindre que dans l'osseux africain. La masse basique d'osseux est
plus développée. - longueur 7.7.

Eleph. africanus 7^e Sup. 22 lam. et un talon - cément
d'osseux réfléchis le haut sur le cément et le bas pour le cément, en
qui s'attache une cornue à la base du segment
partiel des segments plus épais plus grand que
la largeur de la base. - long. 8.7

Eleph. pygmaeus

Eleph. pygmaeus 7^e Sup. 22 lam. plus haute que large. Ciment
réfléchi sur le haut de l'os et sur le bas. et vers le cément.

ou maximum. (Dans les mâchoires inférieures de l'Elephant pygmaeus, le
y a dans le cément d'osseux lam. osseux réfléchis l'os osseux réfléchis
la partie. Ciment plus épais angulaire épais dans la dent postérieure
d'Elephant d'Afrique mais le haut sur le bas cément antérieur et postérieur
point d'osseux. Le cément plus épais dans l'osseux plus
dans le cément d'osseux.

[illegible]

+ ganeba est lumen de die in die. In hys, equal est signum
cum una hys per hys a die de theophant, signum hys per hys
rephat. (V. coram, tunc per hys, 1795)

Ulysses. garrulus - 8. Sep. 10 km et un taton
le avant et le serein. ~~Cran de forme~~
~~analog à celui de dinterstein~~ ne diffèrent
pas beaucoup par le cran de Ulysses 2. l'oiseau.

Elg. bombiformis 4th. Long & larva plus large than
Natus et plus grain - cornet L. gentili - long 11. long
4 1/2. Antennae curved-shaped

Alph. Clifton. Bangor. 6 Mars a photo d'un corail
le corail se remplit peu complétement le intérieur
se est limité au fond de valant formant
un an passage d'eau immédiat le l'Alph
et le matériel et fut a un bon l'intérieur
une figure le Mat. de l'Alph.

M. fulvum propionat 2 die in la Styrat
la des parties 1^{re}. Styrat. pringieris, incens et
Lycopodium.

2^a. *Jasigini*. ~~*striata*~~ *ganga*, bank of river
in Chhota.

N. Lédans - 8^e Sup. cinq collines principales avec
un talon ou colline ~~à~~ arrière et un talon
subordonné à l'avant. Les collines sont traversées
et divisées longitudinalement par un filon, le long
duquel 2 points principaux & des mamelons intermédiaires
dans la vallée. Le filon très gris, comme
viduit à une construction mince observable surtout
dans le fond de la vallée. Le talon division ressemble
à celui de l'hydre gorgone, mais moins étendu et avec
un talon plus large - 6^e et 7^e m. de long. à la
colline de l'arrière - l'arrière n'est pas un filon
qui s'étend vers l'avant. Le talon de l'hydre
n'est 5^e m. de long. Le m. latéral est de forme conique
celui qui se rapproche le plus de l'hydre. Celui-ci est pointu
l'un ^{est} de l'hydre, il n'est à l'arrière un an de forme
intermédiaire. Il ressemble beaucoup au m. latéral
de l'hydre. Surtout par la forme m. de l'arrière et par la
perforation et l'oblongation que l'un a en sa
d'hydre d'arrière.

41
M. Visconti. 8^e Sup. colline plus angulaire et
dans le précédent comme traversée par un filon
longitudinal qui le coupe en deux, chaque division n'est
composée d'un seul point de mamelon conique contigu au
confluent, plusieurs plus ou moins alternativement. Les vallées
sont conséquemment interrompues - cinq principales collines
avec un talon subordonné à l'avant et un talon au
arrière ou arrière. Le dernier mamelon latéral de l'hydre
dans le fond de la vallée - 7^e m. de long. - 8^e m. de long
à mamelon alternant (le dernier ^{est} pointu) avec une
colline de plus. Les collines ont perforation et oblongation
- en fait ressemble beaucoup à l'hydre d'arrière
longue qui est la dernière forme indéfinie
de M. angustidens. Quelque fois il y a un talon de mamelon.

M. Shuster. 8^e Sup. La colline principale et un petit
talon latéral - l'arrière latéral de l'hydre est de forme
qui ressemble à l'hydre d'arrière. Colline traversée, terminée
par un mamelon transversal. (l'un est angulaire, l'autre) les talons
d'hydre angulaire ou l'hydre. Comme d'hydre d'arrière.
vallées larges et ~~longues~~ jusqu'à un point très avancé de

~~proboscidiens~~, ~~ordre des Pachydermes~~, ~~animal antediluvien~~, ~~dont on ne retrouve plus que les lambeaux disséminés çà et là~~, vient tout récemment d'être découvert aux portes de Bagnères.

Soit que ces restes aient été transportés par le terrain d'alluvion, ce que je crois, soit que cet animal ait vécu dans ce coin de terre comme tant d'autres proboscidiens,

— 4 —

ce qui n'est pas impossible, puisque M. Elie de Beaumont fixe la présence des Pyrénées à l'époque du terrain crétacé, époque à laquelle vivait en grand nombre cette famille, les restes de ces pachydermes consistent en une molaire supérieure qui mesure trente centimètres de circonférence, munie de deux collines à crête un peu usée, mesurant en longueur sept centimètres, et d'une vallée large de quatre centimètres, et profonde de trois centimètres. Cette molaire est munie d'un talon ou rebord. D'un côté seulement ce rebord est très-fort et replie sur lui-même à son sommet. — Plus un reste supérieur de défense mesurant sept à neuf centimètres, le tout bien conservé et de couleur d'un gris cendré. C'est à mon ami, M. E. Camus, que la science doit la découverte de ces restes fossiles. — Philippe, naturaliste. (Bagnerais)

de probable condition le relint dans les
montants d'un degré l'un plus penché
que le précédent.

Les descentes les plus simples du type ordinaire
sont les quatre d'essai, pour la distance ou profondeur
de pénétration dans le diastème ou en passant
remonté dans le genre 2 d'essai d'essai (3. 1. 1. 1.) en
ou deux tentatives. Le dernier est d'essai le plus
comme le bar et à trois colonnes. Le bar d'essai
est rempli pour le premier d'essai pour les plus simples
dans le diastème est d'essai à trois colonnes. C'est le
1^{er} mètre qui donne à l'essai et le plus complexe
d'essai le plus; crochets sont ou comme par d'essai
pour les plus simples le plus d'essai. Les quatre d'essai
commencent le dernier mètre qui est le
pour le dernier d'essai. Les deux premiers et les
trois mètres dans l'essai sont le plus simple, le
que le diastème est moins comme que le plus simple.

49
M. Christen. trois d'essai d'essai à trois mètres
le 2^{er} premier et le dernier d'essai d'essai. Le 3^{er} et
trois mètres comme dans le diastème - on s'agit
l'un d'essai d'essai d'essai mais le relint
fait dans le plus d'essai d'essai d'essai le plus simple
de d'essai ont le d'essai d'essai d'essai d'essai
en. Est d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
le plus simple d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
ou d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
donc avec un fig. d'essai d'essai d'essai d'essai
le plus simple.

Le 3^{er} d'essai, à l'essai le plus simple d'essai
d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
qui plus de d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
de d'essai, (d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai)
qui relint d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai

des d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai
non avec le d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai d'essai

ainsi que les autres M.D. Hainille et toute la note qui est
susceptible de détermination avant au M. armenien (longerote
2. kang. (confusion)

forme d'ailleurs par kang a de angien
pour age $\frac{2+3+3}{2+3+3}$ adulte $\frac{3+4+5}{3+4+5}$

M.D. Hainille ne peut pas être en double
car les autres ont été écrits à la disposition
celle qui peuvent appartenir au M. armenien d'un
côté représenté d'autre côté. il a été trouvé
et plus l'un, l'autre, l'autre à la fin. c'est pour
dans les autres de la colonne, il est écrit à
partir jusqu'à l'autre date dans la fin

La forme adoptée pour ceux qui
sont en même temps les autres et les autres

3. d. lat $\frac{2+3+3}{2+3+3}$ 2. ab. j. lat. pour. m. $\frac{3+4+5}{3+4+5}$ (huitième)

pour les autres) les autres sont les autres
à la fin de la orthographe au d. dans la forme

3. d. lat = $\frac{2-3-4}{2-3-4}$ m. $\frac{4-4-5}{4-4-5}$ pour la forme de

M. angien plus. et de M. longien

50

M. falconer dans la description qui est
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
M. armenien angien plus. et de M. longien plus. et de M. longien plus.

Enfin, tous les autres sont pour les autres reviennent au
quelques autres reviennent d'ailleurs, il a été
pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et de M. longien plus. et de M. longien plus. et de M. longien plus.

M. falconer dans la description qui est
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au

M. falconer dans la description qui est
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au
et pour les autres d. toutes les autres qui reviennent au

f. M. falcon figure pour le nom d'Alph. Antiquus (?) le
même crân. domi par nœud avec type de la
Alph. meridionalis.

Dont d'Alph. africain fossile de Millenium, par gentile
est le premier. C'est grand avec 9, lèvre et un talon double
Lambert. En fait très épais, à l'apex de la mandibule angu-
lairement un angle de la pointe de la mandibule
et l'angle de la mandibule et l'angle de la mandibule
longueur - 26 centim. - largeur de la base 8 cent.
Dont d'Alph. vivant d'Alph. homologues? glans au
talon postérieur double et postérieur. Lèvres à l'apex de
mandibule double et produisant deux angles à base opposée
lèvre inférieure mince - longueur 20 1/2 centim. -
largeur à la base 6 cent.

Dont le pourcentage (est bien)

Région par lèvre comme fossile par les très altérés, le lèvre
apex par les dents comme crân. fossile. Mais lèvre
plus intégration, il la a la lèvre lèvre - sont
épais ne peut déterminer, l'os lèvre appelé par M.
Garnier et son par M. Millenium. (11)

les derniers lèvre de chaque dent sont plus épais que
les premiers (Cuv.) et plus épais que les dents supérieures comme
épais supérieures - lèvre à l'apex de la mandibule
mandibule double et lèvre

Alph. Antiquus critique B.

M. falconne comme à ce qu'il se peut. Alph. Antiquus,
ce qu'il se peut en même par Alph. Antiquus
meridionalis, est à dire lèvre appelée par le nom
lèvre par nœud et par quelque autre dent
nom par de la dent d'Alph. par de la lèvre ou
comme. - peut-être les dents de lèvre de Alph. Antiquus
par de la même.

il faut voir si par Alph. Antiquus meridionalis ne
peut par être d'Alph. Antiquus.
- Dans d'Alph. Antiquus (assombré) il n'y avait que 3 lèvre
et un talon à la mandibule inférieure? la lèvre par plus
épais, l'os plus épais et l'os plus épais. lèvre
lèvre régulière postérieure. (Dolomieu)

Dans d'Alph. Antiquus, les lèvre par plus
régulièrement trouvées et plus plus régulière postérieure
par de la lèvre - lèvre lèvre. lèvre la mandibule
plus par toute lèvre de d'Alph. Antiquus meridionalis d'
falcons qui n'est par d'Alph. Antiquus

(1) la lèvre la postérieure comme dans l'indien. et la lèvre. l'os lèvre
mandibule double et lèvre de d'Alph. Antiquus meridionalis lèvre
mandibule double et lèvre de la lèvre.

Herb. *Lysichiton parviflorus* mûr le 11 à 13 oct. Non
 plus mûr qu'en l'Asie mineure & le plus grand nombre dans
 le nord du pays — Amal plus l'espèce est plus grande. *gigantea*.
Lysichiton & le représentant par les 2 Herb. *parviflorus*
 l'autre est le 2^e le plus mûr qu'en l'Asie mineure
 l'autre est le plus grand

James on the Express 13 terms at quarter

Davantage par le transman, mais de la même manière plus
minime

27) Lames - ont plus haute que dans *Phyodinium*

Parte. uguali misure, come pure tutti gli altri
che mi è occorso di osservare, si nella collezione del
R. Museo, che nella mano, in quella dell'Accademia
Nederl. ed altrove, non mi hanno presentati mai
alcuna visibile differenza da quelli che delineati ed
descritti si trovano come provenienti dalla specie
juvénile, senon ~~che~~ allorché stanno inattenti
nei loro studi, invece di esser fra loro paralleli,
come nella specie anzidetta, convergono anzi costantemente
verso la parte anteriore del cranio, tanto negli individui
adulti, che nei giovanissimi.))

~~Donc~~ il y a une plus brève que dans
les différences qui se rencontrent dans la dent, et
il y a aussi qui mérite d'être notée comme propre à
fournir au moyen d'un multiple la légèreté - que dans la
la dent ne ~~peut~~ se représenter par toutes les dents, que
quelques uns ont la forme plus grasse, d'autres
plus minces; que dans certains la forme ~~est~~ ^{saillante} ~~est~~
se trouve au dessus de la cavité de l'écaille tandis
que dans la dent, elle s'élevé - le bouton de la

« Alcuni . e attenta tutte le Differenze di
 « Stato tra la valle di la dent alle monte;
 « attende che tra le individe piu adatte le
 « buone per piu grazie che tra le giu piu;
 « per che le date vecchie di individe age
 « le buone tra alcune che le comuni , restet
 « le piu che le vecchie che le piu
 « particolar di comuni di la stazione . che
 « le montagne di le comuni di le
 « di le comuni di le comuni . e copi tutti i dubbi di
 « avverte che alcune vergono fatto per la simile
 « circostanze di alcune infantili per la simile
 « che le atte di condurre di distinzioni alcune di
 « Specie »

meridians par le pinnier

Des le marbre deuant - tamise (Belgique)
A Dessin, par M. Moreau, le dent mûle
convergent devant (Des le variété de l'Égypte
de Ceylan, le mûle forme deux lignes parallèles,
elles convergent des l'Égypte des dents jeunes - 55)

C. T. Caplan's letter is in German, some from
Sipon-Sipon, the great West-Indies or better.

M. Morren dit que le duc de la maison
de Tarnier tenait indigènes indiens de
Lé Pass. cependant on écrit au
moins 13 ans sur la première qui les
plus jeunes et qui peut être arrivée par
contour de première volée. à la caducité
on attendait être de la première ou
tout au moins l'antépénultième. or dans
l'épave nous la première n'est pas la
jeune qui a 20 ans. mais à l'antépénultième
qui tombe de 20 à 25 ans, et c'est bien vrai qu'elle
l'avait à peu près le genre à Pass, mais elle
a peut-être un plus jeune qu'après la
chute de Kall sur le pied, la quelle a
tombé vers 7 ans. - la géographie est laide et
stérile.
M. Morren l'appuyé sur la persistance et
la direction de leur migration qui leur
valent et leur venant pour voir le
pays n'est pas content de leur le même genre.

Ne dit rien de M. Morren indiquant 13 ans
sur un genre 9-15 antépénultième; car il paraît
l'épave qu'on suppose le même genre de leur
sur l'Ch. pringens.

Diagnose de l'épave possible fournie par M.
Bonie à M. Morren

1. *Elytr. pringens* (mammetti) - dentibus molariis rectis, lamina
numerosi, argenti, parum clavati, argenti fimbriati.
2. *Elytr. pringens*. Dentibus molariis rectis, lamina latius clavatis,
parum fimbriati, latera longe distincta.
3. *Elytr. probolus*. Dentibus molariis rectis, lamina clavatis,
profunde fimbriati, oblique pinguetis (Morr. mem. de Moscou, 1841
pl. 17. fig. 4-5)
4. *Elytr. pygmaea*. Dentibus finibus in mammetti, 13 plus quam
similis minoribus, lamina numerosis (ibid. fig. 2)
5. *Elytr. kamenskii*. molariis subaristatis, utrinque attenuatis,
lamina parum clavatis, numerosis, medio annulatis (comp. par
bull. de naturalité de Moscou 1843, pl. 172. espèce de naturalité de Kamensk
fig. 1830; du l'été 1831)
7. *Elytr. meridionalis*, rectis, cavis et pectus de Makhov l'épave
C13 5. *Elytr. conchyliata*. Dent. molariis subaristatis, lamina argenti, subnervi, arantia,
parum clavatis.

M^r Bonie, 2 Affir d'all. de l'opine vicantes par un
pointe moins prolongée et une canal plus large,
mais la même largeur — chez d'écrit par l'organe
le ditige d'chez de n'est, par un canal moins
profond — le même inf. et une l'écrit plus
ordinaire.

Hypha maculicinctus, nov. Jost. notarius lutei;
 utrinque attenuatus, laminae rufae, angustae, praem-
 levatis, praem levatis, angustae fimbriatis; maxilla eximie
 apice longe ad intus vixit / longior terminata, maxilla
 dentaria et alveoli artium convergentibus; caroli
 anterior angusta, brevissima apice magis foraminibus
 multibus. Tibia parallel.

Sept. D'auvergne

- 1^o mol. inf. g. de mal. batte } sub. et crost
2^o. fragant de malin par 2 clous } plant. }
3^o. forte mol. inf. d'orai par Mr. Bouzot et
trouv. à Soudan en s'ouvrant autr.

de le valli d'Agave

Juste ordinaire de l'univers de Toulouse. donné à la
publication par M. Courmon.

1. *Wachetia* 2. *Agony*

M. Hainville Le dit le dernier en face
 d'une maison du val d'Arno qui lui sert de
 Eau le développement de la ligne de Beaumagnans
 est égale et le fossé fait large et a le contour
 la forme d'un triangle ^{tri.} grand rectangle fait large
 la avant et prolongé le arrière le un fort d
quien formant un talon de 15 à 16 collines ^{large}
 et le premier par un contour considérable. - le fait
 est que le dit tout entier n'a que 15 ¹⁶ collines.

est l'acier pour le piston dit que l'on a
puut par coïncidence la largeur minime de
l'anneau comme un caractère de l'expansion flexible
suffisamment que la largeur de la dent
et que la forme de la machine et de la
crane; j'ai vu le effet le moulin
à l'anneau large et le piston pas
suffisamment et spécialement distinct de
celui à l'anneau minime

at Harbor (page 38) it is mid. and
sunshy) went quite far away. Again I began
fear to emerge that is have more
than a few large - rain -

On a blâimé pour ce voyage,
pour l'été, il pouvait être admi avec l'été
distincte regardant à l'été, m'admirant

Butler


 Sent Dr. Ayler representing me
 Lieutenant John Lewis Ayler
 and Captain John Lewis Ayler.

Si l'opercule se trouve en position normale
et si les proboscées thoraciques sont
sur le mandibule ou sur le labre.

[illegible]

M. de Harcourt pleure le Doyen et les
sœurs et le ~~regret~~ paralysement orgueilleux
par le vain que le Doyen regrette pleurer le
Doyen Doyen.

point de vue 'indulgent' dans les loys
Stephant - nature elle-même comme on
de la tête - vient de ceux de nature
avec de son action d'éléments de forme
L'œuvre de Stephant.

Différence de 4 à la suite de l'angle
inconnu (la somme de 2 et 14 est 16)
passe de 16 à 17 —

about the front part
beginning with the
sub-bell of the cord.

La bague de colliers et bague main
celle des intendants^{ns} jadis et par devant
fourme de caractere vray et de grandeur,
tant il y a de différence pour ce regard, pour
par de dents de même force et au même
degré d'usage (Mauville)

Sp. 1-bb. with an admixture of *B. trichocarpa*

Comète *perseus* —
perseus — D'après, plus courbée et formant
 de plus et de plus. — Les ovales plus forts,
 l'est et de en os plus rétrécies, plus l'ovale proportionnelles
 à leur longueur. — un Éto plus pyramidal à
 l'ouest et surtout bien plus prolongée de
 par os inégal. — de l'os plus grande
 et généralement plus courbée — Des ossements
 longuins d'un plus grand nombre de colonies
 plus minces et d'une plus grande largeur à des
 2.5. d'un plus petit, plus petit, par
 de l'Est et de l'Ouest. Les ossements plus rétrécies

Hyphae mundaoli

Taille mu plus grande — la base
 de la symphyse mandibulaire plus prolongée
 — l'arc des dents maxillaires plus saillant, séparé
 par des intervalles plus grands — (arête dentaire
 plus forte et probablement plus dentée ou tré-
 pée inférieure

M. de Kerscht peut avoir des C.C. manifestes
et Chy. juxtaglomer. ou pas du tout.

quant à la distinction de l'éléphant
peruvien ou sud de l'éléphant
de l'Inde et est que les os de l'éléphant ou
de l'Inde sont un peu plus gros et
c'est ce qui est l'éléphant de l'Inde
collection de l'Inde au musée
de Paris, et les os de l'éléphant
peruvien et de l'Inde sont
les os de l'éléphant
de l'Inde ou de l'Inde.

Il est très méridional en France, d'ailleurs.
Malgré son nom, qui l'appelle communément, c'est le comble
de l'élévation de l'Espagne. fort variable.

Sur l'ensemble, il y a guère plus en moyenne
médiane angulaire qu'en dessous de la médiane
médiane — les données des fragments digitaux des
données pour la norme de l'ensemble sont plus profondément
dans l'ensemble de données.

Don l'arriv. le 20th de 8 à 5 heures.

be common at midland & south provinces at the same
place & to the north of the mountains.

Le grand d'Espagne s'exprime l'été de celui à la mort
 Le 1763 par M. le duc de Lorraine et le duc de Mantoue
 & Rome

Wich. Miller & Trapp & Co. London nous ont offert
un lot d'hyacinthes de la plus belle qualité et de
bonne couleur. Les lot portent d'hyacinthes d'Inde,
d'Inde et non les fleurs, les on portent eff. les
reparties une molaire de Bengale. - et les fleurs
la plus en molaire d'hyacinthes et une molaire
sagittaire d'hyacinthes à plus fort brins avec sans action
changement.

— St. priscus. Dans un sent gélif le trou partit le
 du. & l'eau & l'air à 120 pieds, au-dessous du niveau actuel de
 la surface, on trouva le Dord. Cypripedium angustatum &
 4. Cypripedium parviflorum, mais l'air était fort froid, le vent fort violent
 les arbres brisés. inhabituellement cauteux.

et mûre d'après que le travail, toujours, la
certaines heures à droite d'après le travail le travail
que la main mûre, comme je le dis de l'Egypte
qui est en d'après, par la forme de la main d'après
de la main d'après qui d'après est de l'Egypte à l'Egypte
mûre d'après, comme le dit. - une d'après. d'après.
de l'Egypte et d'après. l'Egypte, comme le dit, par la
forme de la main d'après de l'Egypte à l'Egypte. une d'
l'Egypte et l'Egypte d'après l'Egypte, comme le dit.
une d'après, comme le dit, par la main d'après
que l'Egypte, comme le dit, de l'Egypte. - l'Egypte
l'Egypte, comme le dit, d'après. l'Egypte, comme le dit
l'Egypte, comme le dit, d'après.

Hyphant - la médaille romaine a representé jamais
qu'un Hyphant d'Égypte, ce le prouve par le grand des
oreilles. L'animal offre une queue se reproduisant à son
S. l'un temps. Les plus grands de ceux qui passent dans
le pays de germanicus son l'étranger. Néanmoins à Rome
on n'y jamais par l'étranger. Hyphant à manger de la chair.
- Taille de l'Hyphant. plus grand, on trouve à
un plus grand nombre de l'Hyphant plus grand et
implanté dans les éléphants plus grands. L'Hyphant
(L'Hyphant)

M. D. May, professeur de bot. à Dinan. Ave. de Charente.
M. Bouchard, avocat à Dinan, avenue de la République.
Le 18/32
M. L. May, professeur de bot. à Dinan. Ave. de Charente.
M. D. May, professeur de bot. à Dinan. Ave. de Charente.
M. D. May, professeur de bot. à Dinan. Ave. de Charente.

Mr. Kany avait l'opinion que j'avais y dit à l'...

M. sublineata - hypomelicta quæ parit unguem genale
 Simil. seu la. insinuat. & distinctum.

C'est une matière épineuse, mais que dans le M. Herzog et
L'acquisition de ces biens ne sera le mieux l'usage ou
seront plus utiles à l'avenir (ce n'est pas pour
les mêmes raisons, par les bons motifs ou M. G. Herbold.
M. ou dit que le mandant ne plus certains transplants
et - pour plus de quatre - dix - six ans.

Uzyp. mundanali & Uzyp. Antiqua (Charter)

Si fahome n'a point trouvé à Florence (l'Egypte)
Mante - mais a tenu à se trouver mit au
l'Egypt. missionnaire & il le fait & même à Charles
Iqari et fahome -

Dans l'Égypte moderne les basses sont
 moins hautes et l'humidité fut plus abondante. On voit
 moins hautes et le nombre de basses n'écrit pas
 inférieure 13 et en total pour le dernier et 9 à 10
 basses pour la première - 8 à 9 pour l'anti-
 -première - le dernier page 13 ou le total les
 intermédiaires comme les inférieurs. 14 de basses pages
 13 basses et total les 2^{es} 8 ou total les 13^{es} 8 ou total

Mythen meridionalis

from St. John's coast down the whole volcanic
or Malbetta from T'Noin - Pafos & further
to the East.

Ante i Lemm mine Samles bær
Natter - anordt. 7. 1944.

~~12~~ - same pencil copy, — 12

pour l'hygiène de l'art de former denton
~~pour l'hygiène~~ et pour la santé de la nation
 l'hygiène antique l'hygiène moderne —

Alpheus minutulus recte *Perris* in *Revue*
Scapin W. J. *Shannon*, & *Alpheus* 2 *hastatus* in *Revue*.

Don l'éléphant arctique & l'autre les lames sont
plus & deux fois aussi hautes que larges. & Don
l'éléphant - & l'autre à $\frac{1}{2}$ fois.

M. australis. hunc. dicitur in longis. (antelli)
 Cuius in melle. dicitur. (antelli) qui dicitur in longis
 et dicitur in longis. (antelli) qui dicitur in longis
 laquei in phloem. dicitur. (antelli) qui dicitur in longis
 visus hunc. dicitur. (antelli) qui dicitur in longis
 hunc. dicitur. (antelli) qui dicitur in longis
 tollit phloem. dicitur. (antelli) qui dicitur in longis
 augeo quod. (antelli) qui dicitur in longis

Stacion		Loyodon		Elasmodon	
q. d. lat.	6 hunc	2. —	7	3	8
1 ^{re} mol.	6	2.	7-8	2	12
2 ^{re} mol.	6	2. —	7-8	2.	16
3 ^{re} mol.	8 in 14	2. —	9-10	2.	20-80

M. John ~~Warren~~ Warren

Sur la prétendue dent de M. Augustin? Warren
à Baltimore, le encreur de and -

cette dent avait été trouvée par M. Dumbell
sur la côte, depuis son L. muck & Baltimore
pari Lavin, retourné à Londres et au lieu
commun dent américain pour M. Charles Smith
pour L. de Wilkes d'après l'adoption et de
est arrivé 27 dans le muck & Philadelphia.

— M. Dumbell & John Smith ont pu constater
que l'os ne est bien connu par M. Dumbell
par de la gigantesque M. Dumbell & de la
dent d'os à mort avant les prétendues
répondre également d'après M. Dumbell & la prétention
marche de l'enguelement, jusqu'à pour de
M. Dumbell. L'autre M. Dumbell l'a vu
pendant que c'était un dent de l'enguelement de
M. Dumbell. L'autre M. Dumbell l'a vu
de la qu'il a le parait de l'enguelement de
M. Dumbell & Dumbell plus qu'un dent
est de même opinion

69

est par admissible pour que cette dent qui est
Vintalant, une dent de M. Dumbell, une prétention à
quelque chose & marmelade, p. L. & Dumbell - pour l'enguelement
de l'autre M. Dumbell l'a vu de l'enguelement et de la
de l'autre M. Dumbell à une prétention de M.
de l'autre M. Dumbell & de l'autre M. Dumbell, la véritable M. Dumbell
de l'autre M. Dumbell - M. Dumbell & de la dent de l'enguelement
est dent, la dent marmelade à l'enguelement, pour
de l'autre M. Dumbell & de l'autre M. Dumbell

est une prétention inférieure avec la marmelade &
marmelade & une dent de marmelade, marmelade de l'autre
de l'autre M. Dumbell & de l'autre M. Dumbell.

— L'enguelement, dit M. Dumbell, l'autre
de l'autre M. Dumbell & de l'autre M. Dumbell. Cependant
M. Dumbell a pu de la dent de l'enguelement.

Cependant, M. Dumbell par de la dent
qu'il a le de l'enguelement, la dent marmelade de l'autre
et a pu de l'enguelement.

C'est la 1891 que M. Dumbell a pu de la dent
de l'autre M. Dumbell & de l'autre M. Dumbell

[illegible]

Si j'ai pu voir que le dent 2 tetracyclique et
la même la plus ou la plus longue que 2 l'arrangement
Si j'ai pu voir que c'est un dent anormal et
monochrome

Metoda taperului - Definitie a Section periferice a
Zurich - plan periferic (1) sau la nivel, sau
(1) "taper" & la Definitie -

sur le 3^e volume des mémoires de l'Académie
royale de Turin de Turin le prof. Borson a décrit un
dent traité à l'Université de Turin, le premier et qui s'appelle
de M. Gigantoni. ayant une dentition égale de l'extrémité
de la lèvre inférieure. (Borson etc.) et de la morsure de la
dent, sur le cabinet de l'Académie de Turin, naturelle de cette
cité (philosophie) par lui personnel qu'il s'appelle
par la suite (M. Gig.) les dentelles n'ayant pas
de courbure longitudinale et non l'apex de l'apex
de la dent au prof. Borson, l'ont nommé
M. Borsoni (myria! le dent marte le dit qu'il
longitudinale (phosom))

inscriptions de l'ait - gélins & géologie

un insigne, Mait de M.D. l'été a aron d'été et pendant
un autre d'été des années.

une mot. l'op. c. des années qui peut être un premier

de remplacement.

général - l'op. c. des années trouvée en
château, l'op. c. des années, l'op. c. des années
de l'été à l'été, l'op. c. des années (l'op. c. des années)
et l'op. c. des années, l'op. c. des années (l'op. c. des années)
l'op. c. des années, l'op. c. des années.

plus au des de l'été, l'op. c. des années
l'op. c. des années, l'op. c. des années, l'op. c. des années
l'op. c. des années, l'op. c. des années, l'op. c. des années
l'op. c. des années, l'op. c. des années, l'op. c. des années
l'op. c. des années, l'op. c. des années, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

Le fragment de l'été de l'été, l'op. c. des années

muscle - mol. sup. en perfection lob. interne

lob. interne au centre.

Muscle - sans - sur le sup. a trait en forme

lob. interne lob. interne et au angle externe mol. radiale

quadrilatère

hémion - sans - sur le sup. lob. interne pres

sup. et médian

Daw. - Remon - sans - mult. S. v. barbare

muscle - sans - 6.

eye-eye - sans eye-eye - 2. sans eye-eye
plus important du royaume

Le labry et l'aperte - pointes pres au quadrilatère
par le 3. royaume

eye-muscle - 2. eye-eye, pres eye-eye - 7. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

centre en par le 2. royaume, sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

apophyse - sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

le royaume qui est en par le 2. royaume - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

comme dans le 2. royaume

Daw. - Remon - sans - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

longue et en par le 2. royaume - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

apophyse - sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

longue et en par le 2. royaume - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

apophyse - sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye - 2. sans eye-eye

Charotars (Tigres)

Dans les charotars, le squelette est soudé avec le crâne et les
cuneiformes. Les deux métatarsiens latéraux sont complets et
développes dans le bas. Les autres sont à l'état de simple
fillet flexible. Dans d'autres charotars le grand métatarsien est
craquelé d'un sillon oblique et creusé sur sa face antérieure et
applané postérieurement.

Dans les vrais ours, le squelette est soudé au crâne
qu'en cuneiformes. Les métatarsiens latéraux ne sont
pas développés. En l'absence des doigts
latéraux sont représentés insuffisamment par 3 phalanges.
Dans les ours, les autres latéraux sont complètes
et effilées, les métatarsiens médians sont complètement effilés.
Les métatarsiens se fondent ^{du l. des tarses} chez l'adulte.

Chien de paysan - avec  longuement développés
très rudimentaires.

Ours - il y en a une avant de la ^{le} condyle antérieur
de l'humérus est petit.

Charotars

Surveys des cavernes Torton qui glomérat.

peut-être y a-t-il des lignés.

L'homme a été de moyen stature, dans
la position le lobe interne applati et les crêtes
des lobes externes festonnées et plus profondes. Et
le rapprochement de l'homme de lignés appartient à
l'Amérique méridionale par M. M. de L. et celle
de l'Europe.

Mais les charotars ont aussi différents Torton.

Dans l'Amérique différents avantages de charotars
Torton - leur lobe interne est ^{moins convexe} ~~prolongé~~ et peut
former de faibles bords tranchés ou en sautoir
un ~~bord~~ ^{faible} ~~convexe~~ ^{chez le charotars} ~~de lobe~~ ^{à un}
grand tendre à ~~peu~~ ^{comme dans l'Amérique}
les yeux et les dents brèves sont moins nombreux
comme à l'est de l'Amérique.

il paraît que la complication des festons provient
du rapprochement au l'Amérique de l'Amérique, mais qu'il y a

minime haute de la corne - ainsi que
 l'hyppurien et à jugulaire plus courte que
 chez le cheval à dent courte d'hyppurien
 minime. - Dans le cheval à dent courte
 de l'hyppurien minime, le lob interne
 le ^{plus triangulaire} ~~plus triangulaire~~, et le puy ovalaire de
 la charrue de chariot, se forme un oval
 fermé de l'hyppurien et il est définitivement isolé
 - Dans le cheval à dent courte, le lob
 interne forme un puy profond et triangulaire ouvert
 vers la corne.

L'ovale de lob interne peut plus éloigné de
 l'hyppurien que dans l'hyppurien.

Dans le cheval, l'atrophie a une partie
 plus postérieure, c'est-à-d. forme un puy et
 une plus considérable que dans l'hyppurien;
 l'ovale flexion plus tendue et de mouvement
 plus

Dans l'hyppurien flexion la ~~corne~~ ^{corne} est plus
 interne et ~~isolé~~ ovalaire, mais non isolé

Dans l'hyppurien antérieur de
 moins flexion, le lob interne est isolé mais
 l'ovale plus étroit que dans l'hyppurien
 de corne.

Dans l'hyppurien la face postérieure de mâchoire
 médiane est concave dans une partie de la hauteur
 de l'os, elle forme de petites lignes et puy. Dans
 le pelathon amblyopie, il y a deux puy, une
 supérieure isolée dans le même plan, mais isolée dans
 la partie d'une arête qui la sépare en deux puy.
 Cette espèce est ainsi, profond que l'hyppurien et
 l'hyppurien. - L'arête qui est qui part de la
 tête inférieure de mâchoire et s'élève que dans la
 partie postérieure de l'articulation de l'hyppurien
 dans l'hyppurien, elle est complète comme dans le
 cheval. - cette arête est toujours plus accusée
 dans la corne postérieure, la flexion étant plus
 complète par la dent. la rainure correspond

de la première pharynx est à peu près de même longueur
Le support ou le support est dans la tête de
Canos —

Dans le canon postérieur de l'archithème, il
y a une portion de cornue verticale, qui se lie à
par ailleurs de l'hyppocras — L'artère de
chambre est celle qui donne le p. de p. à
l'artère, qui vient de l'hyppocras,
c'est celle de l'archithème. Dans l'hyppocras
il y a une petite portion de p. de p.

^{Variété}
Archithème mammel (osier) Elephant à l'osier. ^{Variété}
Sont trouvés dans l'osier bleu de Mandale, Norfolk
2e inf. 3 p. de long et 2 p. de large — 8 lames
Sont généralement de couleur verte ou brune.

Ensemble de la masse, angustissime dans la
flèvre marine Craig de l'osier (osier phœnix)

Dans la première le développement des motifs de la
commence quelquefois par la dernière.

Demothium rugosum, gewöhnlich - ~~mit~~ ~~fein~~

Fig. 6. $\mu = \frac{2-3}{1-4}$, $\frac{2-3}{3-2}$, variation périodique, un
mouvement simple, par deux le double, et par les plus rapprochées
à celles de l'acte harmonique. machine, pour plus rapproché
d'avantage des machines, du double, mais plus simple et plus
les quatre le double, intubation est le plus et le plus de
la première machine. ~~la machine~~ la machine, machine et
la machine machine, machine pour les machines, machine
pour les machines. machine, machine, machine
à elle de l'acte et par les et des machines,

Shawyer

Dans un autre sujet, je trouve le 1^{er} molaire
bras, une et la partie abasale d'un caté. occupant presque
général; de l'autre ^{est} l'homologue est de je trouve le
dernier premolaire est la place et le moment serait
arrivé au le 2^{em} molaire par un mouvement
progressif pendant la phase de la per. et /rait peut
être à son tour chassé par le dernier, qui
finalement pourrait se trouver facile à l'apex
avec le dernier de remplacement.

phosphore

Dans un autre individu, je trouve les 3 promoteurs
de remplacement du germe simultanément avec la 1^{re}
et la 2^{me} môle. le dernier môle est à l'état
de germe sans l'aide de la machoire. les canines
sont déjà complètement développées.

Dans un autre individu *phosphore* j'ai trouvé
en place à la mach. sup. 2 mols. de lait; la première
était tombée précédemment et laissant son alvéole; après, vient
la 1^{re} môle p. lae; la 2^{me} petite à peine
la germe et les rudiments de la dernière dans
l'arrière de la machoire.

— Dans un autre individu, je trouve les
2^{es} et 3^{es} de remplacement en place simultanément avec
l'un des mols. la 1^{re} ou la 2^{me} et la dernière en
exemplaire. Dans ces singuliers l'état
l'un des vrais mols. la première ou l'antérieure
qui était tombée laissant en place les deux
mols. de remplacement. le vrai môle existant est
très ramouiné d'avant le milieu.

Cuvier cite dans le cabinet de l'Institut de Bologne, 77
des dents & l'épave d'un animal à l'emb. humain et
les autres à l'emb. large, mais sont une partie
de la région de l'organe que Maragli
a été vu d'être & l'épave la grande quantité
dans l'histoire.

D'après les dents & l'épave de cet animal dans
la haute vallée des Alpes, au pied du mont St. Bernard.

La collection humaine par laquelle la fin de l'animal
avait dans son armée un grand môle & l'épave.
on a trouvé de l'épave la plaque de la
fin.

Il y a une dent canine & une grande dent de la
partie de la dent de l'Institut de Bologne (voir
Cuv. des August. 1808. p. 18).

Données l'embryon conduit de l'épave contre
la collection & la collection. il se présente dans
la Rhénanie.

D'après la description par Gault qui
a été donnée de l'embryon de l'embryon, il est à
prévoir que la dent est une dent de l'embryon
caractérisée par la dent de l'embryon qui est une dent
de l'embryon. la dent de l'embryon & l'épave
sont de la dent de l'embryon de l'embryon de l'embryon
la dent de l'embryon de l'embryon de l'embryon de l'embryon.

L'expresse. Koptinsains après saluer qu'un
homme. du lot mine de l'atmosphère de
l'instruction que dans un état de nature et de
l'habitude. L'avis qu'on a vu avant
appartenir à un l'hyphant. De suite de suite
le tour d'un lot d'habitudes qui se sont
généralisées.

La dent de l'hyphant de graham.

Même dit qu'il y a un temps un marchand
avait apporté du d'hyphant L'anglaise de 1800
gros.

— La dent de l'hyphant donnée par le pasteur

Schäferstein, pasteur mort-belle
remarquable, dit l'avis par le l'hyphant de la
l'hyphant, et celle la même par elle donnée par
le d'hyphant. (Donnée l'hyphant avec son
de l'hyphant entre la l'hyphant.) voir l'hyphant. Tome 1. pag. 165
l'hyphant.)

X. Donnée l'hyphant de graham et l'hyphant
par l'hyphant de l'hyphant de la dent de graham.

+ L'avis dit une dent de l'hyphant de la dent de graham
vienne l'hyphant de la dent de l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant. cette dent donnée l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant par la dent de l'hyphant de la dent de graham.

+ L'avis, au rapport de l'hyphant, avait conduit un l'hyphant
de l'hyphant.

10.

+ L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

+ L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

+ L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

+ L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

— L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

L'avis l'hyphant de la dent de graham, l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham
l'hyphant de la dent de graham l'hyphant de la dent de graham.

Elephant vivant - pieds

Elephant de 10 ans (chassé l'année) 5 ongles devant et
3 derrière - Elephant 20 ans, 4 ongles devant
et 3 derrière.

phéochère

J^e 7 $\frac{1-1}{3-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$; mch $\frac{3-3}{2-2}$ — en moulin — Lot
 $\frac{3-3}{3-3}$ — remplacé articles

ad. 7 $\frac{1-1}{3-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$; p^r $\frac{3-3}{3-3}$ m $\frac{2-2}{3-3}$

Dans un individu, j'ai trouvé le plan à la mort.
enfermé le moulin en l'année. Savoir la 1^{re} première.

est remplacé la dernière de tout mais une qu'elle finit d'être
la 1^{re} moulin après elle — la 2^{de} moulin. Enfin
la dernière moulin au lieu d'être finit.

La première moulin le 1^{er} moulin — moulin

ou moulin 3^e moulin — moulin

— moulin, moulin — moulin — moulin

ou moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

— moulin — moulin — moulin — moulin

Abaissement d'apex à petite incisive opposée par la Verreux

Dans le Rhinoceros ~~et~~ Bœuf d'Asie, il y a
deux incisives de lait de chaque côté à la machoire inférieure on
en voit une de chaque côté à l'inférieur Supérieur. — la
première molaire Rudimentaire et voisine, fortifiée que
celle qui succède. — la seconde incisive normale c. a. d.
Distincte de la première
Dans le Rhin. pourvus par, j. n. n. point d'incisive
D'incisive de lait de la face.

Dans le fœtus d'hypopotame on trouve à la machoire
inférieure 2 incisives de lait de chaque côté, plus les deux
de la canine, mais retirant en arrière de la ligne verrouillée. Des
incisives, la Vient à peu collier. D'un coussin qui
peut être fait par 3 incisives, fort une 1^{re} mol. de lait
Dans l'hypopotame jeune, le coussin de la canine
est distincte de la canine et Entièrement écartée, il doit
être lte de même des incisives.

Dans le cochon les canines et la incisive de lait sont
à couronne distincte. — la 1^{re} première mol. se développe
qu'il y a les molaires de lait fort très usées et de même temps
que les canines de remplacement.

piéris

Dans le piéris, la Éruption du doigt commun par le
petit doigt au pied de l'arrière, les deux molaires de la mâchoire
et de la canine sont soudés dans la 3^{1/4} Supérieure. Le
doigt restant latéral (l'index) n'a plus aucune impulsion
fonctionnelle. L'arabique est dans la forme caractéristique
des paronychia. Carbone et l'hyphod-est distincte.

Daman

Dans le daman, la tête de femme est écharnée
comme celle du chamois et du rhinoceros, la 3^{1/4} latérale
est peu saillante et très remuante; la poche articulaire
inférieure est large et peu profonde, sans saillie marginale
des crêtes qui la forment. — L'apophyse du daman est
plus longue que celle de rhinoceros et il y a l'orteil beaucoup
groupé toujours dans le plan des imperio-gales.

à plein temps. L'apparition de l'est dent au dent de la
gummi d'air de 3 à 6 mois après le saignement. Elle tombe
à 10 ou 16 mois. — le d'effort pourvu de fondre au
part par cette gomme qui est de mûre, mais elle le baptême de
d'effort.

that this house at the present time is well or better than
 place to live. we sent this letter through by the railroad
 as soon as we arrived.

82

il cinghio per gale & molare in purpore

le premier de la 2. (Méthode et à cours de l'élève)

Spun matter - 2nd B⁺. Lumber 2 - col. pauling b
Mack. Lye

Des Cravattes de la Lemagne

Elephtherium ^{crist} forme dentaire semblable à celle
du Dierwies, Uegans dont il se rapproche assez
par ses formes générales.

la mach. min. haute. ne peut confondre
avec notre Dierwies.

Il y a des cravattes Dierwies (allusion)
dont les 3^{es} pr et quelque fois la 4^e présentent
une conformation de bilobation du côté externe.
(Addition de deux demi-cylindres) alors la racine
interne devient complexe, c'est à dire composée
de deux racines sub-confluentes. Dans la 4^e
première la denture est toujours plus simple.

On trouve dans le Rhénoceros d'Europe

la 1^{re} machine Supr. ayant la disposition la plus utile, tenant
presque aussi complète que dans la suivante. la racine
interne jointe avec une conformation de Dierwies. voir
le Rhénoceros ou le rhinocéros.

W. dans le Dierwies Uegans 3^e 3^e première dent
Sont implantées par 3 racines charnues, en
un 2^e dans 5^e dans le Dierwies.

Entolodon - les molaires à 6 pointes en
deux rangs. Excepté la dent qui est plus petite
la 4^e première a deux pointes transversales fortes.

Dans l'anglithorin, la 8^e se referme à deux lobes.
Le tetanolon peut former une extension
Entre l'anglithorin et l'anglithorin - la dent à 3 lobes.
ou un megapylorin (grand dent de l'éléphant)

- canothorin - les dents à 3^e première dent
dans l'éléphant. la 4^e et la 5^e ont trois racines.

Dans l'éléphant à l'été de Montebuzard, forme par l'éléphant
Dierwies. dent, dans la plus de l'éléphant machine avec
de côté droit. les molaires de l'éléphant sont la plus grande
il y a 3 mots de remplacement qui ont été mis à jour.
les deux premières machines molaires dentures. le germe de la
dernière dans l'éléphant de la machine - molaire
à l'éléphant pris analogue. - les béliers de germe

Mart. angustior - maxilla interna per
Lacaille.

- longueur de la gonapophyse non comprimée les incisives 0,44
- longueur totale de la maxilla — 1,22
- distance du condyle à l'avant de la première molaire 0,58
- D.V. la première molaire à l'hyant de la molaire 0,78
- Espace occupé par les molaires (quantité de dent). 0,28
- Saut de molaire — 0,82 à 0,90
- Maxilla molaire

- longueur de la gonapophyse non comprimée les incisives — 0,58
- distance entre la première molaire et l'hyant de la molaire 0,83
- Espace occupé par les deux dernières molaires — 0,30

ête le représentant? il la maxilla interne per
de la molaire.

distances de diffract. le prolongement de 0,44 le
avant de traverser l'orbite. la gonapophyse de
la maxilla inf. le prolongement de 17 centimètres plus
à l'avant.

de la gonapophyse est cachée le canal qui
se va allongement de l'avant jusqu'à la
base des incisives qui font une saillie de
18 à 20 centimètres à l'avant de l'hyant
maxillaire.