



MAISON DE BOULE
ET HOUTON
PAPETERIE
LOUIS-LEGRAND

1

199,028. - Carnet de 82 feuillets.

Toulouse, le 18 mars 1902.

Le Sous-Bibliothécaire



L. Jéze



formula dentaire { pour age $f. \frac{2-2}{2-2}, c. \frac{1-1}{1-1}, m. \frac{2-2}{2-2} = 20$
 adulte $f. \frac{2-2}{2-2}, c. \frac{1-1}{1-1}, prem. \frac{2-2}{2-2}, m. \frac{2-2}{2-2}$
 form. végétative $5-5 = 5-5$

Enjeux plus ou moins probables à voir
 L'homme, le plus souvent proclive et saignée en
 segment de cercle. Le système laryngien
 obliquement à son bord latéral ⁽¹⁾ — Canine
 dépassant le niveau des incisives, quelquefois
 les développe dans le max. (orang & Mandrill)
 long, avec une crête tranchante du côté interne et
 postérieur.

à la mâchoire supérieure les premières et les
 molaires sont implantées par trois racines, deux
 externes et une interne (2). à la mâchoire inf.
 les mêmes dents sont implantées par deux fortes
 racines divergentes. les molaires sont sub-égales; les inférieures
 plus étroites que les supérieures. les dents ou molaires
 et molaires — la dentition d. tout des

(1) Nanté chez les orangs et chez les autres singes supérieurs
 (2) Dans l'homme les premières sup^{tes} sont implantées par deux racines
 confluentes, les inférieures par une seule racine. les mol. sup^{tes} sont
 implantées par trois racines qui, dans la racine caecopossive se confondent
 quelquefois avec la dernière. Dans cette race également, les deux dernières
 molaires inférieures, ont le double quelquefois les deux racines connues.

fingeres ressemble plus à celui de l'homme que
 leur dentition permanente. Le développement de
 dents ne s'efface pas non plus dans le même
 ordre. Ces canins ^{à développement} de foyes, particulièrement
 chez les mâles, n'est pas la solution qui après
 la sortie de la dernière molaire une dent de
 sagesse. Le 2^e molaire sort avant les molaires ^{quincimolaires} de développement.

M^r Owen a vu dans la collection de
 Baron Van der Capellen, près D'entrech, en 1838,
 une variété de dentition chez une petite
 batyras à dents, par où dix dents molaires de
 chaque côté, mais dans seulement de ces dents
 avaient le caractère de primaires.

1. { *pithecus antiquus*, Blainv. orth.
phopithecus antiquus, gen. 7. et 8. et 9.
protopithecus antiquus, Lant. not. d. h. et h. p.

g. macacus

g. macacus Locemus, Owen.

Locemus

angustatus.

Fragment de mâchoire inférieure et molaires
 trouvés à 52° 3' latitude nord, à Kaysan, cont.

De Suffolk, en 1838 et 1839, par M. Dr. Colchester
et par M. Dr. Lyell. Les ossements fondaient sur
la forme des molaires et la particularité de la dernière
qui porte cinq tubercules dont l'apical est subdivisé
en deux parties, a placé cette espèce dans le genre
Marsacus. Elle est plus petite qu'aucun des
espèces de ce genre actuellement vivants et
présente dans la dentition des caractères
distincts. (Ann. history & British mammals.)

2. Marsacus pliocenus, Owen (British fossil mammals.)

pliocène sup.
anglaise

première molaire supérieure qui paraît
avoir de grands rapports avec ~~la molaire~~
correspondante du Marsacus cynicus. trouvée
dans le nouveau pliocène de Grays (Essex)

3. Mesopithecus, Wagner (1)

4. Mesopithecus pentelicius, Wagner

fragment de crâne décrit par M. Wagner
comme formant un passage entre les Lemnopyth-
es et les gibbons. M. P. de Meyer n'admet pas
que cette espèce diffère de pithecus antiquus

(1). On a trouvé dans le même gisement, au pied de penteligne 29,
celles de girafe? de rhinocéros, d'antilope, d'hyppogriffe, d'éléphant?
de Mairaturum. Le dépôt paraît être du même âge que
celui de Cucurum, c.à.d. du Miocène sup.

mais, comme le fait remarquer M. Giebel, les
caractères des incisives, leur ~~caractère~~ séparation des
canines et la forme des premières molaires (les seules
connues) justifient l'opinion de M. Wagner. Les
caractères typiques ne sont probablement pas suffisants
pour motiver l'établissement d'un genre nouveau,
et M. Giebel le rapporte au grand genre
pithecus, sous le nom de pithecus pentelicius.

— pithecus? martini, Bristol (Bull. Soc. géol. C. B. 1841, p. 46) pliocène
de Montpelier

espèce denture et incomplettement connue
rapprochée des guenons (Ceropithecus) par M. Dr.
Bristol. os des membres et molaires. Dans les
tableaux marins pliocènes de Montpelier.

— Lemnopythicus? Monopithecus, gervais ibid

espèce proposée d'après quelques dents, un
arbitraire et un radius. Les dents qui diffèrent
principalement de celles de l'espèce de Sanson,
présentent des rapports avec les molaires des
Lemnopythiques, et un peu avec celles des

guenon et des macaques. Dans son dernier ouvrage
M. Gervais émet quelques doutes sur la réunion
possible de cette espèce avec la précédente.

Simnopithecus subhimalayensis, M. de Mejer

Musée Sup.
Ophion
Inde.

Machoir supérieur avec fragment de la
face et de l'arcade orbitaire caractérisant par
le singe voisin par la dentition du genre *simnopithecus*,
et dont la taille répond à peu près celle qui existe
aujourd'hui l'orang-outang. M. de Blainville (1840)
contestait le rapprochement et mit plutôt sans crainte
s'il se véritablement appartenait à un singe) des rapports
avec les macaques et surtout les babouins (*lynceus*)
trouvés par M. Baker et Durand dans la colline
subhimalayenne près de Cuttly, à 30° latitude
nord, dans des couches de conglomérat et de sable
de marne et d'argile dont l'âge est par lui-même
parfaitement déterminé (musée Sup. Ophion Ind.).

L'année suivante, 1847, de nouveaux os de Cuttly
(Journal of asiat. Soc. Ind. VI, page 434) ont été trouvés dans
la même localité dans des couches plus profondes et bien
imparfaitement déterminés. Leur os caractéristique

par une machine qui s'approchant de celle de
l'entelle, mais plus grande. L'autre de la taille de
l'entelle et comme par un fragment de machine
inférieur contenant les quatre dernières machines, les
caractères ressemblent plutôt les macaques.

Les mêmes observations ont signalé l'existence
d'une canine gauche supérieure qui s'opposait par
sa dimension avec de la dent correspondante de
l'orang-outang de 7 pieds (Journal of asiat. Soc. Ind.).

2^e tribu. Singes d'Amérique

fam. dent. $\left\{ \begin{array}{l} f. \frac{2}{2} = \frac{2}{2}; c. \frac{1}{1} = \frac{1}{1}; m. \frac{2}{2} = \frac{2}{2} \\ \text{Aut. } f. \frac{2}{2} = \frac{2}{2}; c. \frac{1}{1} = \frac{1}{1}; m. \frac{2}{2} = \frac{2}{2} \end{array} \right.$

f. lebus macropterus, Lund. Ségayon car. du sib.

2. Callitrix primævus, Lund. Ségayon d'une
taille qui est plus du double de celle des
espèces de ce genre aujourd'hui vivantes.

3. protopithecus Brasiliensis, Lund. genre nouveau
haut de 4 pieds

2. famille. bristites

$$\text{form. dent} \left\{ \begin{array}{l} \text{y. ag. } f. \frac{2-2}{2-2}, \frac{0.1-1}{1-1}, m. \\ \text{adult. } f. \frac{2-2}{2-2}, \frac{0.1-1}{1-1}, p. \frac{2-2}{2-2}, m. \frac{2-2}{2-2} = 32 \end{array} \right.$$

Les canins présentent une caractéristique particulière ^{générale} dans ^{général} grandement, savoir: un filon longitudinal le long de la face antérieure de la couronne. Les prémolaires du bristites sont implantées par un faible sillon de la 1^{re} molaire à trois saisons du haut et deux du bas. Le dernier n'en a qu'un à chaque mâchoire.

- 1^{re} genre grandis, Land. type qui atteignait une taille double de celle des bristites de nos jours.
- 2^{re} une petite espèce qui se rapproche de jauchus gemellatus, Geoffroy. Car. de
brist

Shingites

Dans cet ordre les canins sont toujours présents à l'une et à l'autre mâchoire.

La série des molaires ne dépasse jamais $\frac{8-8}{8-8}$, et elle est double la première et la molaire (ov). Le nombre d'incisives est variable. $\frac{1-1}{1-1} \frac{2-2}{2-2}$, séparés par un trait médian.

1^{re} famille

1^{re} type ou famille. Shingites fragilis.

Dent diffinitive, membres antérieurs terminés par des ailes.
molaires à couronne plates.

$$\text{adulte} \quad \text{y. ag. } f. \frac{2-2}{2-2}, \frac{0.1-1}{1-1}, \text{adult. } \frac{2-2}{2-2} \text{ (ovoviv.)}$$

$$\text{form. dent} = \text{adult. } f. \frac{2-2}{2-2}, \frac{0.1-1}{1-1}, p. \frac{2-2}{2-2}, m. \frac{2-2}{2-2} = 34(1)$$

on ne peut observer de cette famille d'aujourd'hui de cette famille. Le prétendu ossement de bristites trouvé à Solenhofen, dans le calcaire lithographique, est du fragment d'interostyle.

(1) on ne peut observer de dent de lait pendant le dernier prémolaire des Shingites, alors cette dent deviendrait une vraie molaire ce qui ferait rentrer les Shingites à cet égard dans la formule de managins, c.à.d. 4 vraies molaires.

2^e type ou famille. chiroptère insectivore
malin à couronne bristée de points aigus.

g. moloss = Dysops ilij

de l'Inde au sud-est au large des
les Canaries d'Amérique méridionale

g. phyllostoma (phyllostoma lucifera)

Cinq Espèces, (l'une) dont un voisin de
phyllostoma punctatum (rampier) et dont deux
diffèrent beaucoup des Espèces actuelles

(11)

g. schizophya (Car. & grosbe)

1. Monstera d'une Espèce qui se trouve par
différence de grand fort à cheval. (Monstera
Equinum) cette espèce se trouve
et dans les inférieurs et autres fragments
de la même Espèce est par les os.

(11) g. palaenopterus, perula.

palaenopterus robustus par $\frac{8-1}{3-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-3}{3-3}$; $\frac{4-4}{4-4}$

Le crâne sup. & la base latérale de la base postérieure des dents. Espèce
plus petite que la for à cheval. terrain tertiaire à l'ouest. m. m.
(autres)

g. Verpestilio

g. Verpestilio $\frac{8-1}{3-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-3}{3-3}$ (L. m. Verpestilio)
form. Verpestilio $\frac{8-1}{3-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-3}{3-3}$; $\frac{4-4}{4-4}$; $\frac{5-5}{5-5}$
form. Verpestilio $\frac{8-1}{3-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-3}{3-3}$; $\frac{4-4}{4-4}$; $\frac{5-5}{5-5}$

Dans les os

Côtes larges; Sternum muni d'une petite crête; os
de l'Épaulé très développés, ceux du bras fort longs.
gambes au contraire petites et courtes. pas de long onguet
manquant à l'os. le doigt de l'aile. certains sont
tombent avec l'âge.

Car. de Béné.

1. Verpestilio peripateti, Lur. Verpestilio de la Verpestilio mais
elle se diffère par les proportions de l'avant-bras
— dans les gambes de Verpestilio —

Loc. Sup.

2. Verpestilio murinoides, Lart.

$\frac{8-1}{3-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-3}{3-3}$; $\frac{4-4}{4-4}$

les os des membres sont plus dans la forme de
celles du Verpestilio que de la Verpestilio. mais les
mamelles ressemblent peut-être davantage à
celles de Verpestilio auritus qui a, comme le
murin, les mamelles inférieures, mais seulement cinq
à la branche supérieure. L'os du bras (gambes) m. m.

3. Verpestilio noctuloides, Lart.

Verpestilio noctuloides, perula. voisin de la Verpestilio
une forme de murin, qui se précède à la Verpestilio. ibid.

4. Verpestilis praecox, L. S. Meyer

espèce provisoirement rapportée au genre Verp. elle
peut différer du Verp. vivante - schistosus

D. Meisenau —

min.

5. Verpestilis insignis, L. S. Meyer, autre espèce

rapportée provisoirement au même genre —

id.

M. Owen cite deux molaires trouvées dans le
terrain tertiary de Weymouth en Suffolk,
comme appartenant à un schizognathus (autres foss.
mamouth) mais M. D. Meisenau ne peut leur
leur caractère suffisant pour rendre indubitable
leur classement dans cet ordre. Verpestilis

quasi, aux schizognathus trouvés dans la carrière de
Weymouth, de Coligny, de France et d'autres localités.
— pour M. D. Meisenau, schizognathus, genre et
l'ordre, ils paraissent en peu différer des Verpestilis
actuellement vivants.

L. S. Insectivores.

11

Molaires à couronne en partie hérisse de
pointes, les canines petites ou moyennes et
confondent quelquefois avec les prémolaires, on
manquent peut-être les incisives pour les animaux.

partie Echinoides.

huitième sans épiphysse sur le grand postérieur.
cité de l'Ordre artérien par Meisenau. Oiseau
Meyn. peut-être en contact ou soudé, molaires à
pointes et hérisse, très obèses, la dernière très petite.

Meisenau — schizognathus, L. S.

form. dent. { 7. ag. $\frac{1}{2}$, 6. $\frac{2-3}{0-0}$ m. $\frac{1-2}{0-1}$ (la 6e) dent. ut. $\frac{1}{2}$ (comm)
Adult. $\frac{1}{2}$, $\frac{3-4}{2-3}$, $\frac{0-0}{0-0}$, $\frac{1-2}{2-3}$, $\frac{2-3}{2-3}$ (comm)

form. dig. 5 — 5.

1. schizognathus arvensis, Meisenau.

{ schizognathus arvensis, Meisenau

plus petite qu'il y a bien que L. S. schizognathus; son
incisive inférieure plus saillante. Les 2^e et 3^e assise —
— molaires supérieures saillantes plus petites. Couronne et hérisse
(Meisenau).

Meisenau inf.

(C'est probablement la schizognathus ovine de M.
provenant d'ont et autre fois un schizognathus —
Verpestilis (Cyrtus, genre London)

2. Crissacus nanus, agm.

Tetracus nanus, agm.

Encre plus petite que la précédente.
Dentier inférieur pourvu de 4 pointes
au lieu de trois; prémaxillaires plus ou
plus nombreux. Le horizon, puis le juy musc. inf.

3. Crissacus Sarpanirski, Lart.

plus petite de moitié que la
variété d'Europe. représenté par des
portions de mandibule, un grand nombre de dents
supérieures et inférieures, de os longs, omoplates,
humerus, tibia, calcaneum, phalanges etc. Sarpanir musc. inf.

4. Crissacus Dubius, Lart.

Indiqué par un fragment de maxillaire
inférieur portant une dent molaire fendue
à peu homologues dans le horizon d'Europe.
cette dent est précédée de deux prémaxillaires
normales érigées par deux sauts, ce qui
permettrait un rapprochement avec le terreux,
le g. prémaxillaires ayant été un peu plus
distancés. plus petite que la précédente. inf.

5. Crissacus? d'après deux fragments de

mandibule et un portion de tibia qui appartenait
un animal voisin de horizon d'Europe et appartenant
à la taille. inf.

6. Crissacus priscus, G. D. Meyer. (nouv. 1845)

Trouvé dans le dépôt tertiaire de Weissenau
et non loin de lui. ex. de maxillaire de
différente grandeur. Weissenau musc.

7. Crissacus major, journal.

D'un horizon plus grand que
le européen et plus trapu, par l'épaisseur. inf.

8. Crissacus foveoli - Schmidt.

paraît ne pas devoir être distingué de
l'épave actuelle. Car. et Diluv.

g. terreux; Centetes, Allg.

$\left\{ \begin{array}{l} 7. \frac{2-2}{4-3}; 8. \frac{1-1}{1-1}; 9. \frac{2-2}{2-2}; 10. \frac{4-4}{4-4} \text{ (comm.) } (1) \\ \text{pour } 10. \frac{7.9-3}{4-3}, 8. \frac{1-1}{1-1}, 9. \frac{2-2}{3-3}, 10. \frac{4-4}{3-3} \end{array} \right.$

pour 10. 5 — 5

1. Centetes antiquus, G. D. Meyer. (nouv. 1845)

De terrain tertiaire d'Europe. de grande taille
et distincte, par sa forme, et se fait un idylle voisin de la
mamm.

(1) Le Deuvenoy a obtenu une dentition de la dent de terreux
qui le rendait fort rare

g. chinogale, prom.

1. chinogale laurillardi, prom.

arvige

miv.

2. chinogale granki, prom. ibid.

ibid.

2^e tribu - glisporiensform. dent. 7. $\frac{2-3}{2-2}$; C. $\frac{1-1}{1-1}$; ps. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{1-2}{2-2}$ (omn.)

Cladobate (Cladobate f. luv.)

1. glispor? banfennin, indigènes pour quelques
fragments qui se laissent avant / ignobles
comme devant s'appeler du Cladobate. Sans miv.

g. oxygonophius, h. de luv.

1. oxygonophius frequer

2. oxygonophius leptogaster, les deux luv. de
terre de luv. fort approuvés

M. l. miv. du Cladobate de jans. miv.

3^e tribu - Sorinus

Donner Musaraigne, et qui miv. dent. à miv. dent. (de
M. l. miv. dent. à miv. dent. miv. dent. miv.)
form. dent. 7. $\frac{1-1}{1-1}$; C. $\frac{2-2}{2-2}$; ps. $\frac{2-2}{2-2}$ ou $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$
7. $\frac{2-2}{2-2}$; miv. $\frac{2-2}{2-2}$ (omn.) dent. miv. $\frac{2-2}{2-2}$ (omn.)

form. dent. 5-5.

Les fortes incisives à luv. miv. miv.; la
miv. et les points et miv. miv.

1. Sorus (Sorus) antiquus, prom. plus petit que
le Sorus vulgare. luv. miv. luv. luv.

miv.

2. Sorus (Sorus) ambigus, prom. très voisin de
la précédente. ibid.

ibid.

3. Sorus araneus form. luv.
Mysaraigne petite, prom.

Après l'analyse de la miv. luv. luv.

M. l. luv. luv. à miv. luv. miv. luv. luv.
Distingue de la miv. miv. luv. miv. luv.
la luv. luv. luv. luv. luv. luv. luv.

de grande incisive luv. luv. luv. luv. luv. miv.

4. Sorus pusillus, h. de miv. miv. luv. luv. luv.
luv. luv. luv. luv. luv. luv. luv.

miv.

5. Sorus banfennin, luv. luv. luv. luv. luv. luv.
de la taille de la miv. miv. luv. luv. luv. luv.
à luv. luv. miv. luv. luv. luv. luv. luv.
luv. luv. luv. luv. luv. luv. luv.

Epiphyse, nettement retrécie à sa jonction avec la
branche montante; celle-ci très robuste, avec une
apophyse angulaire fort courte et n'ayant pas, au
côté interne, cette fossette triangulaire profonde
qui est caractéristique des muscivores vivantes et
que je retrouve dans l'autre espèce fossile. par
contre, il y a une côte latérale au-dessous
qui rappelle les fosses mastoïdiennes de certains
Carnivores. cette particularité amènerait-elle une
régime alimentaire qui aurait nécessité de
plus grands efforts de mastication? En outre,
les molaires sont grandes et renforcées à leur
base d'un bourlet saillant. L'incisive est
triangulaire, très forte, relevée à sa partie apicale et
sans dentelure; son bord forme saillie au
dessus comme pour engager le mandibule à pro-
fiter l'inspiration. Au dessous, du côté interne
une fossette profonde et pénétrente dans l'épiphyse
comme dans le Sorex araneus. L'osmal des molaires
et des incisives présente à leur pointe une
cristalline s'élevant de celle de cet ossement, ce qui
l'on voit aussi dans quelques espèces vivantes. Sanson. mus. m.

6. Sorex fossorivorus, Lat.

petite espèce de la taille de S. vulgaris,
ayant deux faibles molaires à la mâchoire inférieure. Les incisives
des mâles molaires mâles obliques que dans les
espèces vivantes. Osmal des dents robustes. Sanson. mus. m.

7. Sorex Desmugensianus, Lat.

autre espèce très petite dont les ossements sont
avec leur couronne basse et le comprimé de l'os
à gauche que la forme primitive de leur ossement
y est très indiquée. une particularité remarquable
cette espèce, par l'induction de la projection, une incisive
inférieure à l'osmal robuste en rogne. cette incisive à
son bord supérieur longitudinal double comme dans
le Sorex vulgaris. Sanson. mus. m.

Les brachyostomes de l'Andalous, les Cervins
de Liège, des Cervins de Paris, d'Angleterre,
et de paysans ont donné des ossements de l'espèce
qui ont été ~~reconnus~~ reconnus à plusieurs espèces vivantes
par la nature qui les ont rendus à leur espèce,
Desmugensianus, Desmugensianus, Desmugensianus.

g. galerix, pomel.

(vivens Lili, blainv. ost.)

f. dent. $7. \frac{3-3}{3-3}$; $c. \frac{1-1}{1-1}$; $ps. \frac{4-4}{4-4}$; $m. \frac{3-3}{3-3}$.

1. *galerix vivensis*, pomel. (bibl. univ. d. genev. 1848, sub. p. 1848, p. 1848.)

Caractérisé par une mandibule très grêle.

trouvée à Sarpan — est de cette mandibule

que M. J. Blainville a fait l'esp. *vicaria lili*

identifié par M. J. J. J.

mic. m.

2. *galerix magnus*, pomel. ibid.

assez grand que la largeur d'usage et

indigné comme venant de terrains tertiaires

son dénomination possible.

g. pleurostox, pomel.

invisiblement dirigée comme celle des myriophanes,

notamment plus faibles et fixées par les inférieurs

1. *pleurostox forcinoides*, pomel.

talquides, pomel.

forcinoides, blainv. tertiaire

tertiaire d'Europe, plus grand que l'un des mic. int.

pyrénien. mic. m. m.

g. Desman (*Mygale* Lill.)

f. dent. $7. \frac{3-3}{3-3}$; $c. \frac{1-1}{1-1}$; $ps. \frac{4-4}{4-4}$; $m. \frac{3-3}{3-3}$ (Lorenz)

$7. \frac{1-1}{1-1}$; $c. \frac{0-0}{0-0}$; $max. \frac{10-10}{10-10}$

f. dig. — 5 — 5. membrane.

1. *Mygale Desman*, Lill.

Mygale Desman, Lill.

Mygale Desman, Lill.

un peu plus grand que le Desman des

pyrénées, avec lequel il ne peut être confondu,

car il présente des différences très appréciables, soit dans

la forme de la dent, soit dans le nombre

parties de la dent, souvent jusqu'à 10.

Sarpan — — — — —

mic. m.

2. *Mygale minuta*, Lill. petit l'esp. de

la taille de la myriophane commune établie

sur de nombreux individus plus faibles

de forme aux parties imprécises de Desman

visant, mais l'esp. précédente.

3. *Mygale magdalen*, pomel. Duman à Gephy-

trachetum plus faibles que le M. Desman

et cette dernière plus d'origine pyrénienne, ou

visant. *Mygale magdalen* (bibl. univ. 1848) mic. m.

18.

G. tribu talpina

G. talpa L.

Appartient à premieres obliques et à points
aigus. Numeraux presque carrés. Obliques
carrés, obliques de l'abdomen très développés.

f. st. G. $\frac{3-4}{3-4}$; C. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{3-3}{3-3}$ (assez)

f. G. $\frac{3-4}{3-4}$; C. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{3-3}{3-3}$ (assez)

f. sig. 5 - 5.

1. Talpa parsoni, Lest.

Talpa europaea (par) Hain. st.

Talpa telluris, gen. polat. fr.

Hyporhynchus telluris, prom. (abst. par. 1848).

Epine latine par un grand nombre de
peines qui ne laissent aucun doute sur
la distinction spécifique jusqu'à son plus grand
sur l'abdomen montrant genéique.

Très. plus forte, carmin mieux exprimée,
implantée par une seule saignée ainsi que
les deux premiers primaires. indiquent par
un moindre développement de la région frontale
qu'elle a de vivre dans un sol moins

résistant. Gen. fr. conjoints antérieurs. parson

2. Talpa minuta, Hain.

Epine de beaucoup plus petite et plus légère
sur un très grand nombre de points, concordant
sur la dimension et la distinction spécifique. id.

3. Talpa antiqua, Hain. tal. wendlandi, antedicta. ex.
{ exotrypan antiqua, prom.

avant-membran inférieure plus petite et courte. humerus
plus long, à apophyse trochantérienne plus inf. l'os.
les charnières.

4. Talpa brachycheira, H. d. Meyer. Epine de

terram testudin. de wendlandi impurité

deuxième

5. Talpa forsteri. Linn.

st. et lav.

G. dimylos. Meyer

à distinguer par le côté externe de la mandibule
un plus grand trou au lieu de deux pour la
petite. de la région et de la région de la base. il n'y a
que deux molaires inférieures au lieu de trois. y.
contenus par la mandibule.

6. Dimylos paradoxus H. d. Meyer. Mosman

G. palaeoplatys. Owen (odont. et hist. nat.)

palaeoplatys Meyer, ov. grand comme le bison,
voisin du mygdon. molaires carées et quinquangulaires. (voir folio.)

G. galatopis pom.

Stati. Ség. en humines.

galatopis mygaleus, pom. humines en pl. p. l.
comet que celui de roman de pyrie, mais
beaucoup plus large & déprimé. menton peu
velu. tertiaire

t. tertiaire

G. glisorey - (cladobate)

G. glisorey f. $\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; pa. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$ (ovale)
(gl. tertiaire)

glisorey f. adonidi, dent. ($\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; pa. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$)
plus grand que le tertiaire; plus voisin de *cladobate*
par les incisives & la canine et dentapex, pour la denture

Sarpan mine.

St. famille - Carnivores:

17

St. tribu - Versiers

plantigrades; membres courts. machelien tendu.
tuberculés.

G. bars - versus - Lix.

G. bars f. $\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{2-2}{2-2} = 22$
form dent. (adult. f. $\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; pa. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{2-2}{2-2} = 42$
four digit. 5-5.

Dans la plus part des ours de 2^e & 3^e
V^e primitif tombent successivement. Dans l'ours
des cavernes, les trois premiers manquent de bonne
humeur, ils se couchent dans le rétroscap, ou fuient
des tropiques. Ils habitent aussi dans l'ours
arctique.

1. Versus arctique, Cuv. et G. G.

Espec. se rapprochant un peu, l'ours de
pomé, des ours de Malaisie & de Cordillère
par la persistance de la dent canine & de
tubercules. plus petits que dans les ours d'Europe. par
bords frontaux. canine comprimée. (chaviers parous, 2. parous, phosène.

2. Ursus minimus? gerv. (Hyanodon?)

Semianachin ressemblant à Bartonnet,
Sables marins de Mont-Jubien (17)

juvénile

3. Ursus spelaeus, Blum. ours des cavernes

Caractérisé par son front bombé, chaque
os du front formant une protuberance
arrondie, la base que la ligne du profil
relevé sur la partie postérieure du front,
traverse par une pente très inclinée par
la base du nez. La dent de cette ligne
se fléchit qu'à un âge avancé, d'où l'on
peut conclure du habit de plus en plus
comparativement au type actuel. Cette
pente est constante du juvénile.

4. Ursus arctoides? Blum.

— planus, Oken

type tout voisin par l'os comme
distinct, tout comme jusqu'à variété de
l'os juvénile de la variété de l'os
de distinction. Spécifiquement ni par l'os ni par
l'os. On trouve des humérus sont le

(17) M. Gory a rapporté de val d'Arno deux
os d'ours qui pourraient revenir à l'os
de deux types de juvénile. Vrais Ursus Ursus
(Cuvier) de Cuvier qui, M. peut-être dit mal
à propos, dans l'os juvénile

l'os est un os juvénile par le passage de l'os
radial et des fémurs à cet plus oblique, c'est-à-dire
plus détaché et plus ressemblant l'os à celui de
l'homme. Un os qui soit appartenant plus
vrais, n'appartient point à l'os
cuvierien? L'os

Déjà et l'os.

5. Ursus priscus, Goldfuss
— ou l'os d'ours.

Le distingué de l'os spelaeus par la
construction plus juvénile. Son front est complètement
plat. Cuvier avança qu'il n'est distingué ni avec
l'os, l'os ni avec l'os noir. M. Gory
pour au contraire que ce n'est autre que l'os
arctos, ours brun d'Europe qui aurait eu
une grande le juvénile quaternaire.

Déjà et l'os.

Mais si l'os est un os juvénile, l'os
patellari, M. G. l'os, les os metoposcaurus et
metoposcaurus de même. L'os archaicus,
Cuvier. L'os dentifrons, M. G. l'os, ne formant
l'os et l'os / archaicus de l'os juvénile
et l'os maritimus formé dans la
Sécheresse de Hambourg. L'os juvénile, et
Hambourg — l'os archaicus (l'os ? l'os ?) l'os.

g. Hyenarctos, falwani et Cantley

1. Hyenarctos falwani falw. et Cant.
 { Hyenarctos falwani i.².
Agriotherium, Wagner
Amphiarctos falwani. Osborn.

form. dent. 1. —, c. —, p. 2. $\frac{3-4}{2-2}$, m. $\frac{2-2}{2-3}$

Le talon d. 4^e premolaire (carnassière) développée plus développée que dans l'ours type. Le tubercule interne de distance d. la molaire postérieure de la base d. la couronne. La 1^{re} mol. sup. à couronne quadrilobulée; les deux lobes internes plus petits que le externe. Diamètre transversal de la couronne plus considérable que l'antéropostérieur. La 2^e mol. sup. à couronne carrée, également plus large que longue et recouvrant par là la dent homologue de quelques petites carassières plantigrades. i.²

La 1^{re} mol. inf. à couronne simple et comprimée avec lobe médian unique et talon basilaire en avant et la arrière, mais sans tubercule interne. La 2^e à couronne aussi amarrablement comprimée, partagée en deux lobes perimélanges coniques; le dernier étant le plus large. Le dernier reproduisant le caractère

c) dans Hyenarctos insignis au sujet de la 1^{re} molaire et plus spécialement comme type guide de la base.

comprimé, mais plus large antérieurement et portant un lobe principal unique sur talon basilaire avant et derrière. Absence de trois molaires inf. et implantées pendant 2 années comme dans le ours vrai. mais la modification implique de l'instabilité plus carnassière que dans l'ours vivant ou fossile. Différence de petite mesure, plantigrade, par le complet développement de molaire inf. et plus large de hyène, celles les quels ~~impliquent~~ ^{impliquent} à la fois et qu'on n'a molaire à l'un et à l'autre maxillaire. Donc le nom d'Hyenarctos inapplicable. celui d'Amphiarctos préférable. musc.

2. Hyenarctos insignis, gen.

form. dent. 1. 2-3, c. 1-1, p. 2. 4-4 (quadrilob.) m. 2-2
 premolaires unisédentaires et persistantes, dont deux à couronne gemmiforme. carnassière, longue de 0,027, mais brachée que dans l'h. d. l'ind. et le tubercule main postérieur, c'est la distance sup. de l'h. d'adulte. Le troisième molaire moins forte que l'avant-dernier, contrairement à l'h. indienne, les faibles dents qui suivent la région du deux tubercules internes à presque nulle. Les deux av. mol. ont respectivement 0,055 de longueur. La 1^{re} 0,021 et son bord externe 0,024 à son bord antérieur. (molaire implantée, voir la figure 1 et 2 m. 2-2)

3. Hyenarctos falwani, gen. Amphiarctos sup. en part. Différence 24 dans l'espèce précédente.

4. Hyenarctos hamyoni, gen. Douteux. voir hamyoni.

G. Raton - (procyon, Storr)

f. d. 7-8; $\frac{2-3}{2-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$; m. 3-3

f. d. 7-8; $\frac{2-3}{2-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$; pr. 4-4; m. 3-3

f. d. 7-8 - 3-8. plant.

primaires pointues en avant. tubercules

pres carrier.

1. *procyon priscus*, Leconte (Ill. in. ymn. 1848)

trouv. dans une fosse de rocher rempli

d'argile durie et d. pelle d. l'été d'été

amorce - f. t. probab. d'été

G. Coati (nasua, Storr)

1. *nasua nasua*, Lund (ot. un. brasilien) Brésil

G. Mairiana (miles, Storr)

1. *miles tapers*
Miles antiquus Münster.
Miles antediluvianus (Koenig)
Miles vulgaris Forst. d. beyer

{ longue

Diluv. & lav.

2. *Miles morrisoni*, Leconte. D. t. univ. d'été.

trouv. avec d'autres lign. diluvien à l'été

consid. par St. Leconte comme esp. d'été

Diluv.

G. tilodon, gen.

1. *tilodon hombrovi*, gen. proprii d'été

un m. d'été inf. d. caract. sup. plant

pr. d. alv. d'été. L. d'été d'été (gard) L. d'été.

G. palaeoyon, Storr.

Caroteyon id

1. *palaeoyon primarius*, Storr.

f. d. 7-8; pr. 4-4; m. 3-3.

Le rapprochant des *hombrovi*, d'été de d. d'été.

après voir de ou et de r. d'été d'été. d'été.

Leur d'été pens. que d'été un d'été plus

omnivore que le *thylacine*. à corps trapu et bon

à se jeter; probab. d'été. d'été.

L. d'été.

terrain locum Dulm. a. intermedium, h. d. meyer et
a. leri, phien.

N. d. Blainville et gerani réimprimé au
gen amphizon l'agutheum d. Vauq,
trouvé dans le dépôt d'Agutheum

S. g. pseudogon Lait.

Plan. dent. L. — ; c. $\frac{1}{1-1}$, p. $\frac{1}{4-4}$ m. $\frac{2}{3-3}$

Sente plus dans le plan de celle de chien
que dans dent de l'amphizon. incisive attribuée
à deux lobes (celles de l'amphizon n'ont qu'un)
Ces incisives à arêtes dentelles mais moins convergentes,
l'arête interne plus saillante.
présentant à l'apex les dentelles.

Incisive attribuée sans doute aux
condyle internes. molaraires très longs
et falciformes, moires cycloptère que dans
l'amphizon. indubitablement ^{trigone} ~~trigone~~
peut-être un wheler comme certaines dans le
genre chien.

pseudogon Sarsenianli, Dent.
amphizon Laurillard, genre. Cataly.
à Sarsen et autre lieux du g. d. gers.

misc. sup.

misc.

S. g. hemizon

22

f. Dent. L. — ; c. $\frac{1}{1-1}$, p. $\frac{1}{4-4}$, m. $\frac{2}{3-3}$

C'est bonne la formule du chien. mais la
branch dentaire est basse et saillante de l'arc externe.
La forme massivement sur la arête : la forme
molaire falciforme d-forme, à tranchant caréné et par
dentelle ni talon. Les canines, Sarsenianli;
la dent tuberculeuse dans le plan de celle de
chien mais à tubercule plus marqué.

J'avais proposé de rapporter à ce genre
par analogie organique et rapport de similitude
un humerus à point inférieur double portant
un trou à son condyle interne et l'autre os
se rapprochant du type des masto.

Le Laurillard avait attribué avec doute
cette typologie à l'hémizon deux tuberculeuses
supérieures un peu dans le plan de homologues
de l'hémizon. Sarsenianli et parti de la
genre fait par g. g. hémizon hemizon.

1. hemizon Sarsenianli, Dent.
Hemizon hemizon gers.
Sarsenianli Sarsenianli

misc.

S. g. hydreyon, Lat.

poquet d'opini au milieu d'opini,
quelque dent isolée et plusieurs moines
de même genre de Lankent avoit,
au pi lui genre moi, l'avisage avec
caractériste en forme intermédiaire
aux types actuels de lui et de d. b. b.

f. dent. 7. — $\frac{3-3}{1-1}$ pr. $\frac{4-4}{4-4}$, m. 2-2

1. *Hydreyon* Lankent, Lat. (voir 7. le Mustel. hure-
-vire Hamkete - de hure.
Mustel. *hydreyon*, gen. 3. rognon de l'opini de la lute
salutari
Lute dubia? blain. 1. f. dent. min.

g. Chien, (Canid.)

$\frac{3-3}{2-2}$ $\frac{4-4}{1-1}$ m. $\frac{3-3}{3-3}$ (17)

f. dent. 1. adult. 7. $\frac{3-3}{2-2}$ $\frac{4-4}{1-1}$ pr. $\frac{4-4}{4-4}$, m. $\frac{2-2}{3-3}$

1. dent. 3-4 (ou 4-4 de *Canis* p. b.)

1. *Canis* parisien, Lankent.

2. *Canis* Lankent, f. dent. blain

forme lui rognon de l'opini de la lute, *Canis*

Lankent, m. 1. blain de l'avisage avec rognon de l'opini

l'opini avec le *Canis* Lankent. Rognon de l'opini

avec le genre rognon de l'opini de la lute

l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute. Loc. Sup.

2. *Canis* *gypsonum*, Can. l'opini de la lute rognon de l'opini

l'opini de la lute rognon de l'opini de la lute.

C. 17. *C. myaloti*, f. dent. 7. $\frac{3-3}{2-2}$ $\frac{4-4}{1-1}$ pr. $\frac{4-4}{4-4}$, m. $\frac{2-2}{3-3}$ = 46

3. *Canis* *viseride* de *Cynodon*

23

4. *Canis* *Borbonicus*, Can. (ou *Borbonicus*)
- *myaloti* de la lute
- *viseride*, rognon de l'opini

l'opini caractériste par des tubercules rognon de l'opini
très larges et de la lute et rognon de l'opini de la lute
talon l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute
le *Canis* de la lute et rognon de l'opini de la lute
saillant. l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute
talon de la lute et rognon de l'opini de la lute.

l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute.

5. - *Canis* *protolopex*, l'opini

voisin de *C. agassizii* - blain Can.

6. *Canis* *robustus*? l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute

7. *Canis* *lyodes*, l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute

8. *Canis* *incertus*, Lankent - rognon de l'opini de la lute

9. *Canis* *triglobatus*, l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute

il fait agnès - le *C. Spelaeus*, 2. d. *Canis* *lydes*

Spelaeus mine, *C. vulpes* *Spelaeus*, *C. neubroni*

rognon de l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute

l'opini de la lute et rognon de l'opini de la lute.

G. Cynodon, aymard
 { *Cyothecium* D.
Cynodicta part. par.

$\frac{1}{2}$ dent. $\frac{1}{2}$ $\frac{3-3}{2-2}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{1-1}{1-1}$, pr. $\frac{4-4}{4-4}$, m. $\frac{2-2}{2-2}$

On voit que la formule dentaire est la même générale des chiens. La distribution caractéristique de cette denture la a si les mêmes, mais certains de ces dents sont plus épais et la coracée est plus grande dans le plan de la dent. Les muscles indiquent une progression homoplasie grande et de la denture, probablement équivalente.

1. *Cynodon parisiensis*, form.
 { *Viverra parisiensis*, loc.
Canis viverrinus, blainville - parisi

loc. Sup.

2. *Cynodon praestus*, aymard. Nonson

loc. ? Sup.

3. *Cynodon Nelsonianus*, D. ibid.

ibid.

4. *Cynodon lauratus*, qu. apte

loc. Sup.

5. *Cynodon martini*, aymard. a. pr.

loc. ? Sup.

Elagodon martini, prome, caractéristique par un tubercule sup. plus large le chien qu'il est dans et restant le même dans le tubercule.

ibid.

214

G. Galeynus, ov.
~~*Cynodicta*~~
 même formule dentaire générale des chiens - mais se différencie dans la forme de certaines dents. Dents plus robustes. Formant l'apex ovale, le passage des chiens aux viverrins.

1. *Galeynus Chingensis*, ov.

{ *Canis praestus*, h. d. meyer

{ *Vulpes du plateau d'Anigou*, blainville

plac.

G. Spectator, leand.

Dents plus rapprochées que les chiens; marges de la denture tuberculées, par conséquent moins omnivores que la précédente.

1. *Spectator paucivora*, leand (margues d. parisi)

du bris

Can.

3^e tribu - Viverrini (Civettini)

corps tuberculeux & nuir plus les deux
à la mâchoire inférieure - un très fort tubercule
inter à la carapace - progression pour
demi-pentagone et angle quelques fois
étirés. tubercules sup. triangulaires plus
grands L. plus qu'à l'arrière.

Les Civettini (viverrini, f. viv.)

f. g. d. $\frac{3-3}{3-3}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; mach. $\frac{3-3}{3-3}$

f. dent. f. $\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; ps. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$
f. digit 5-5.

1. Viverra antiqua, blair.

2. Amphictis antiqua, perm.

mâchoire disposée en fer à pieu serré;
le tubercule inférieur très développé et
porté par deux racines. il a une sautoire
une crête transversale au dos, très arête,
et un seul un seul tubercule. Rang (clair)

2. Viverra gibbosa, blair. l'après quelques
mouvements trouvés à l'arrière

3. Viverra lanifrons, lat. l'après un
mâchoire inférieure un peu plus grande que

celle de la mâchoire supérieure et dont les
dents forment le passage de celle-ci à la
mâchoire. 3-3 l'arrière

4. Viverra finis, lat. plus grande que la
précédente, indiquée par une portion de
mandibule portant 3 dents de type de
mâchoire et le rapprochant plus particulièrement
de l'éléphant. 2-2 finis (perm) miv.

5. Viverra tylos, blair.

6. Galerix viverrina, perm.

l'après un demi-mandibule portant
seulement des primaires. M. primaires de
l'admet point dans la mâchoire. il a
à fait un autre type. l'arrière

6. Viverra persiphi, v. cyprus.

7. Viverra ferruginea, palzer, l'après
une infestation d'éléphant

M. primaires annuaires pour le com. d'Amphictis
Leptostychnus et A. lemanus, deux espèces de
viverrini dans le terrain tertiaire d'Allemagne.

8. g. pleistoc. perm

f. dent. f. $\frac{2-2}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; ps. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$

tubercules sup. triangulaires et des tubercules

Loc. 2, 1917

g. Marte (Mustela, Linn.)

petit tubercule interne à la commissure
inférieure.

f. dent. $2 \cdot \frac{3-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $4 \cdot \frac{2}{2-2}$; m. $\frac{1-1}{2-2}$
f. sig. 5-5.

1. Mustela gmelini, Blain. plus grand
que le précédent et à deux tubercules
plus petits, ce qui donne la commissure
en forme de arc. Sans

min.

2. Mustela minuta, gen. moyen

min. et.

3. Mustela longata, gen. moy. petit

plac.

4. { Mustela putorius, gen. moyen
 pusillus, gen.

min.

5. { Mustela ardea, gen. moyen
 Marte ardea, Linn.
 Mustela tuberosa, gen.

plac.

6. { Mustela angustifrons, gen.
 pusillus angustifrons, id.
 pusillus pomili, Linn.

(Blain), min.

7. Mustela

grand type, voir 2. le Mustela barbara (Blain)

g. putorius (putorius, Linn.)

f. d. $2 \cdot \frac{3-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $2 \cdot \frac{2}{2-2}$; m. $\frac{1-1}{2-2}$

f. sig. ~~commissure inférieure~~

Commissure inférieure d'égale longueur à la tubercule interne.

g. *Lutra* (*Lutra*, Storr)

membr. lutea, t. l. oxydatis et quere. signatis

f. dent. $J. \frac{2}{2} = \frac{2}{2}$; c. $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$; pr. $\frac{4}{2} = \frac{4}{2}$; m. $\frac{1}{2} = \frac{1}{2}$
 f. sigt. $5 - 5$. palmis.

un fort talon à la carapace Supérieure
 et un tubercule interne à l'inférieure.

1. *Lutra* *Dubia*, Storr

hydrocyon *paucimaculatus* ? ? ? St. lutea - minor.

2. *Lutra* *valetorii* (posthumus) St. guelf. et h.

Lutrina *valetorii*, prom.

Lutrina *clermontensis*, viv. Storr.

Hyndon *montanensis*, h. s. niger

Camp. un tubercule 2. plus à la mâchoire Supérieure

signe de pomme et une p. 2. moins à l'inférieure) *minor*
 (Cuvier)

3. *Lutra* *bravardi*, prom. - tuberculosa non

triang. de - - - - - plus

4. *Lutra* *musculina*, prom. carapace inf.

à denture interne peu développée, plus ou moins
 la mâchoire inf.

5. *Lutra* *antiqua* h. s. niger
 { *Lutra* *de* *cauvensis*, m. s. h. n.

taille plus forte que la *Lutra* *antiqua*. car.

g. *Thalassites*, Nordmann

f. dent. $J. -$ c. $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$; pr. $\frac{4}{2} = \frac{4}{2}$; m. $\frac{2}{2} = \frac{2}{2}$

Thalassites *robusta*, Nordmann *benarabii* minor.

(*Hyena* *hypparionensis*, Gerv. intermédiaire, m. s. n. guelf.)

f. dent. $J. -$ c. $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$; pr. $\frac{4}{2} = \frac{4}{2}$; m. $\frac{2}{2} = \frac{2}{2}$

5. tribu de *Hyenidae*

g. *Hyena* (*Hyena*, Storr)

carapace inférieure sans talon interne

f. dent. $J. \frac{2}{2} = \frac{2}{2}$; c. $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$; pr. $\frac{4}{2} = \frac{4}{2}$; m. $\frac{1}{1} = \frac{1}{1}$

f. sigt. $4 - 4$.

1. *Hyena* *hypparionensis* Gerv. petite hyène à talon
Thalassites *robusta*, Nordmann

2^e famille - Amphibien

3 phoque (g. phoca Lem.)

1. phoca vitulina dentique. blanc. juv. mieu.

de même L. Daphin

de même L. et quelq. fragments

2. phoca ambrigua, h. 2. moyen, remarquable plus.

Le mieu aut. est quelq. aut.
marques, suggère à mieu
aut. de la Lyell se en - d'ouest
un certain de la photo. tertiaire de
mad. de l'Amérique. de mieu suggère
elle aut. au ph. posthumus vivat,

Morsus (the bones)

on a été des fragments d'os
le genre tertiaire de l'os des mieu
leur inapparence d'os tertiaire.

Progneurs

1^{re} tribu Sciuriers.

g. Eumeces (Sciurus, Linn.)

f. dent. 7. $\frac{1-1}{1-1}$ 16. $\frac{2-2}{2-2}$ 17. $\frac{2-2}{2-2}$, m. $\frac{2-2}{2-2}$

f. dent. - 4 - 5

saussure les aragoneses. mieu tubercules.

1. Sciurus

montmorency

Les. page

2. Sciurus fignus, p. 100.

fig. 100 le p. 100

mieu.

3. Sciurus perianthi, part. plus grand d'un
tier que l'eumeces commun. L'opinion des
maxillaires des dents verbeuses et plus ou
des mieu. verbeuses de la queue en fragments
phos. grande que dans le vivant. perianthi mieu.

4. Sciurus genasiensis, Linn. de

l'été. L'été plus petite de l'été que

d'eumeces commun. L'été abondant et pendant
un certain temps de l'été. L'été mieu.

5. Sciurus montanus, Linn. plus ou moins commun.

ibid

6. Sciurus... un mieu de l'été. L'été plus ou moins commun.

Les. Eng.

7. Sciurus typicus, Gmel. plus ou moins commun. L'été de l'été. L'été mieu.

ibid.

8. *Nivius Astaniata*? pom. p. 1^{er} grand. long. mine.
 à qui se rapporte tout le *Nivius antonini*? 8.

g. *Marmotte* (*Antonini*, Gmel.)

f. dent. $7 \frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; m. $\frac{3-3}{3-3}$

Très femelle distincte les leviers inf.
 inf. min comprimés. subin hémis d
 joints.

1. *Antonini*, *armatus*, bar. arroya pilus.

2. *Antonini*, *antique*, pom. qu'est-elle
 la même que la précédente. ibid. ibid.

3. *Antonini*, *Gastaldi*, pom. appuis. Scher.

4. *Antonini*, *pinigensis*, Kämp. Gmelin. Scher.

5. *Myoxus pinigensis*, G. S. Meyer

6. *Antonini*, *pelicans*, Fischer & Weidner

7. *Antonini*, *fischeri*? pom.

Cavane de Scher. Scher.

8. *Antonini*, *Levy*, pom. (petite levier) Scher.

S. g. *pluriantonini*, Gerv.

noté à tubercule, plus arrondi que dans
 les marmottes.

1. *pluriantonini*, *gewaii*, bar. & pom. apt. loc. Sup.

g. *Spermophile* (*Spermophile*, f. inv.)

f. dent. $7 \frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; m. $\frac{3-3}{3-3}$

f. digit. 4-5

Différent des marmottes par leurs abajours et
 par des formes plus légères.

1. *Spermophile*, *speciosa*, G. S. Meyer. Weissenau mine.

2. *Spermophile*, *leucaligata*, Kämp. Gmelin, marmotte

— eny par de danger, arroya — Car. & Scher.

2^e ~~g. *Myoxus*~~

2^e. *Troch. myoxus*

g. *Lois*. (*Myoxus* G. mel.)

f. dent. $7 \frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; m. $\frac{3-3}{3-3}$

f. digit. 4-5.

1. *Myoxus*, *parisiensis*, Gerv. loc. Sup.
 } *pelicans*, fish
 } — *glis*, bar

2. *Myoxus* ibid. ibid

3. *Myoxus*, *parisiensis*, Bartet. la mine

les jeunes dit, mais la petite. très commune à Saxon mine.

4. *Myoxus*, *fischeri* & *schmidti*, cités en myoxus dans le Scher. Scher.

4. *Myoxus*, *murinus*, pomel - Bérard (albin) mine.
 petite léon venue de l'est.

carrière de la Belgique, dans le Scheldt avec des
sables d'ant. l'épave et ceux de la Tour.

Dans l'ind. de la paléontologie et cartographie
ont été des lignées indéterminées dans le
terrain tertiaire.

de l'ind. a trouvé dans la carrière de
l'époque méridionale de l'épave qui appartient
probablement, comme la vivante, au genre
Responsum. de la même époque, et se distingue
difficilement de vivante. les 4 autres tertiaires
sont beaucoup plus les M. robustus, debilis,
cristatus et talpinus.

G. { Cricetodon, Lat.
myxion? poms
molaires tuberculées comme celles des rats, mais
plus petites et celles des hamsters. Ils ont
un tubercule de moins que ces-ci, aux antérieurs
de chaque mâchoire. humerus percé d'un
trou au centre. Eptacris tertiaire.

f. de la 1. $\frac{1-2}{1-1}$ 0. $\frac{4-5}{4-5}$, pr. $\frac{6-7}{6-7}$, m. $\frac{7-8}{7-8}$

1. Cricetodon parvulus Lat. un peu plus

grand que le hamster. - - - - - tertiaire

2. Cricetodon medius, Lat. de la tertiaire moyenne

que le précédent. - - - - - id.

3. Cricetodon minor Lat. plus petit que le précédent. id.

G. hamster (Cricetus, Linn.)

différant de celui par des modifications
qui importent dans la forme des molaires,
par une queue courte et par des aléopores

1. Cricetus vulgaris Forster, dans le tertiaire
comme provient du tertiaire d'Ugelsheim,
mais plutôt de la division de même lieu
Montmorin par le détroit, devant Belgique.

id.

car.

Cricetus musculus? pour. 1. de tertiaire. l'épave. - - - - - tertiaire.

G. Caryacus (Caryacus, Linn.)

molaires de la même époque de la première
tertiaire, placés alternativement sur deux rangs.

1. Caryacus robustus, pour. - - - - - plac.

2. Caryacus - - - - - id.

3. Caryacus amphibius L. de la tertiaire moyenne. - - - - - id.

4. Caryacus protuberans, pour. - - - - - car.

5. Caryacus asiaticus, - - - - - car.

Voici le catalogue de la première

g. tribu - Castoreis

f. dent. f. $\frac{1-2}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; p. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

f. digit. 8 - 8.

1. Castor canadensis, place.

2. Castor fiber Car. 5
 Castor poleus Siber.

3. Castor trigontherium
 trigontherium levisi, Fisch. Rusk. Siber.
 Belyi & Angeltun
 si. Caillay & trou. van Lind. a
 Castor d. Houtt. & ang. d. long.

f. g. Stenofiber, Geoff.

Mutatis plus cylindriques qu'au cas

du Castor et un ossement plus long d'entre les

os de la main. carin plus développé

1. Stenofiber viarandei, gen.

Stenofiber, gen.
 Stenofiber, gen. d. d. m. g.

 Ligne d. Simsb. motus minor

qu'au Castor. (allure) à long, et à Waisseau min.

2. Stenofiber? polygynus (Walt. gen.)

Stenofiber, polygynus, gen.

Castor polygynus, Lest.

 Simsb. & Lest. min.
 7-10 mm.

3. Stenofiber Lest., gen.

Myopotamus pauculus, Lest. pitiligne d. parca min.

f. g. Stenofiber, Kang.

1. Stenofiber galeus Kang. Vale. d. Lest. min.

2. Stenofiber pygmaeus, gen. Myopotamus pygmaeus min.

g. Cavia (Myopotamus)

Castor ca gen cylindricus

1. Myopotamus castoreus, Lest. Cavia Car.

2. Myopotamus leopardus, Lest. Stenofiber

Myop. L. Castoreus & parca

g. Castoreis, Forster

1. Castoreis Simbsi, Forster - Lest.

gigantus Simbsi Forster parca marca

 raison de la car. ostéus - moléus & 100-

 La car. profondément dentée, disposée transversale

et à peu ondulée - Simbsi

G. palaeomys - Karp.

1. palaeomys Castoroides, Karp. Wisconsin min.

G. osteogera, Harten
mésam. oppos. t. u. de Castor.

1. osteogera, platycephala, Harten.
foss. n. sub. foss.

G. omegodus, Penn.
Voisin de Chimyois

1. omegodus Chimyois, Penn.
à la suite de murchisoni - Am.

10^{me}. tribu. hystricini

G. porco-lpis (hystris, Linn.)

f. dent. 1. $\frac{2-2}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; ps. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

1. hystris ...? curg. Amér. pluc.

1. hystris reforma, gen. sel. Kern? ibid.

2. lpis indeterminé dans l'ind. f. dent. et car. min.

3. hystris athia p. Kern min. hy

G. Cuvendous (Pyrotherium, f. Linn.) 38.

1. pyrotherium magna, Linn. bid. - Barrois.
2. pyrotherium duba, id. ibid. ibid.

11^{me}. tribu. Leptomys

G. livia (Lepus, Linn.)

f. dent. 1. $\frac{2-2}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; ps. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

f. dent. 1. 8-6.

1. Lepus Missouriensis, curg. Am. pluc.

Lepus laevigatus? Penn.

2. Lepus leptodus, gen. m. p. pluc.

3. Lepus Delawarensis, Linn. m. de l'Am. - Long. Car.

4. Lepus americanus - voisin de leptodus Long. Car.

5. Lepus parvus, Linn. petit lepus - brachycephalus Dubois.

6. Lepus brachycephalus, Linn. bid. Car.

12^{me}. tribu. Leptomys, Linn.

f. dent. 1. $\frac{2-2}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; ps. $\frac{2-2}{2-2}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

1. Leptomys palaeus, Penn. Car. de Kent. Del.

2. Leptomys americanus, Linn. brachycephalus. Del.

3. Leptomys parvus, Wagner petit - brachycephalus. Del.

4. Leptomys leptodus, f. de l'Am. - leptodus pluc.

5. Leptomys leptodus, Linn. ibid.

6. Leptomys ... leptodus m. p. pluc.

7. Lagomys kerkiraensis, Lat. voyer
titanomys

min

g. titanomys, L. S. Meyer
Lagodon? ponch

f. no 1. $\frac{2-2}{1-1}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{2-2}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

1. titanomys riponensis, Wignan min

Regard le rug et auverg

2. titanomys tuberos? gen. (lat.) min

3. titanomys kerkiraensis, f. Lant min

pt. tribe subangulata

g. lobayes (anama, f. Lant)

f. $\frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; p. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$
 4. anama robusta (Lant) - trist car.

2. anama gracilis (Lant) trist car.

g. moos (kerodon, f. Lant)

1. Kerodon bilobiden, Lant trist car.

2. Kerodon antiquum, d'abig
 Apit d'atun de pampar.

g. agouti (chloomy, f. Lant)

1. chloomy agouti, Lant trist car.

2. chloomy candida, id. trist car.

Atti le auverg et d'atun de Lant. d'abig

W. Schmitz et pampar.

g. psal (cealogenys, f. Lant)

f. $\frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; p. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

3. 3. — 3

1. cealogenys lobayes, Lant trist car.

2. cealogenys meyer, id. trist car.

cebiais (hydrocheum, Lant)

f. $\frac{1-1}{1-1}$; c. $\frac{0-0}{0-0}$; p. $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{3-3}{2-2}$

3. 3. — 3

1. hydrocheum trist car.

2. hydrocheum bilobiden, Lant trist car.

14. femur - parathy - (Bradypus) phillyphaga -

$$\sqrt{\text{Dent} - L. \frac{0-0}{0-0}; C. \frac{0-0}{0-0}; m. \frac{5-5}{4-4} = 18.}$$

Jamais de dent dans l'intamagillain.
 même largeur sur axe central de denture
 variable avec un même enveloppe de
 denture sur et sur variable et un intervalle
 externe et par 3 - cément. Dent plus colat
 existent continuellement et implantées par un
 son simple et facile - son leur support
 regroupent les dents supérieures subalternes
 avec les inférieures.

Megatherium - g. Megatherium Luv.

4. { Megatherium Cuvieri Buckland
Megath. americanum Bonaparte
 antebell - oven
 Bradypus giganteus - grand et petit

$$\text{form. dent} - L. \frac{0-0}{0-0}; C. \frac{0-0}{0-0}; m. \frac{5-5}{4-4} = 22.5$$

$$\text{form. dig.} - L - 3.$$

molaires prismatiques - Subalternant sans leur
rayon de mastication - sans mûr.

2. *Megatherium lauribardi*? Lund
Lund type proprium per se Lund

Cav. & Shu

Cav. & Shu

g. *Megalonix*, jefferson

1. *Megalonix jeffersoni*, cav.

Megatherium boreale, Owen
Oryzotherium Fischer (Oryzotherium turgidum, ⁴⁰page)

form. Dent. $I. \frac{0-0}{0-0}$, $C. \frac{0-0}{0-0}$ - m. $\frac{5-5}{4-4}$

molaires sub-triangles dont la racine
est brisée au milieu et le bord préminant
- osseux antérieur plus long que la postérieur.
- tibia et peronni distincts. pied articulé
obliquement. - amari - (taille du bas)

Cav. & Shu

de Owen (pages of the beagle, pag. 35) dit que
le même type a été trouvé au Texas &
mayella.

am. mûr.

ibid

2. *Megalonix grahni*? Lund

Brexit

Cav.

3. *Megalonix Kaupii*? Lund (Cav. & Shu)

ibid

41

g. *Myliodon*, Owen
Oryzotherium, Karlen.

f. Dent. $I. \frac{0-0}{0-0}$, $C. \frac{0-0}{0-0}$; m. $\frac{5-5}{4-4}$
f. Dig. 5 - 4.

molaires. Pâtes par quatre plans - les 1^{ers}.
Supt. sub-triangles, le second triangles et le autre
triangles, à l'angle interne crupé de la pille.
le 1^{er} inf. triangles, le quatrième triangles et
le dernier grand et bilobé.

le 2nd doigt l'exterieur fort peu ou pas et le
autre at de grands phalanges onguiculés. demi-
conique et inégale: aronias de l'ongle de la main
à l'ongle de la main, comme dans le *Megatherium*.
radial tournant sur l'axe - tibia et peronni
distincts, calcaneus long et gros.

1. *Myliodon darwini*, Owen. am. mûr. ^{ibid}
à la taille d'un rhinocéros.

2. *Myliodon harkni*, Owen. am. sp. Kentucky Cav.
Megalonix ^{de la} *de la* *de la*
Oryzotherium ^{de la} *de la* *de la*
Calcaneus ^{de la} *de la* *de la*

second mûr. Cav. et le 1^{er} à trois plans.

3. - Melodon robustus, Owen. am. merid.
 Symphyse de la mach. inférieure courte et
 large. Scapulae subtriangulaires et la
 denture a trois piliers dont l'interne arrondi.

Scelidotherium, Owen.
 platygonys? Lund

f. dent. $I. \frac{2}{2} = 2$; $C. \frac{2}{2} = 2$; mach. $\frac{3}{4-4} = 18$.

Molaires supérieures triangulaires - la 1^{re} inférieure
 angul. triangulaire la 2^{te} et la 3^{te} un peu
 coniques et la 4^{te} grande et bilobée.

1. Scelidotherium leptacanthum, Owen.

2. grande taille. amér. - Brésil.

2. Scelidotherium Bucklandi, Owen

Myotherium Bucklandi, Lund

2. la grande de Miguelong. Brésil -

3. Scelidotherium minutum, Owen.

Myotherium minutum, Lund

grand comme un cochon - Brésil -

4. Scelidotherium Agassii

Platygonys, Lund

Silur.

5. Scelidotherium Boppianum, Lund. Brésil 42
Platygonys, Lund

g. Cealodon, Lund

f. dent. $I. \frac{2}{2} = 2$; $C. \frac{2}{2} = 2$; mach. $\frac{4-4}{3-3} = 14$

Doigts raccourcis et inégaux; ongles coniques;
 les pieds obliques et la queue de Miguelong.

1. Cealodon magnus, Lund. Brésil -

taille du tigre d'Amérique.

2. Cealodon Kangui, Lund. Brésil -

g. Macrotherium, Lat.

1. Macrotherium Sanjani, Lat.

gigantum, gen. nov. Lat.

2. Macrotherium peruvianum Johnson

f. dent.

Dont peu sont peut-être apparents à la

f. dent. 7. $\frac{0}{0} = \frac{0}{0}$; 1. $\frac{0}{0} = \frac{0}{0}$; mal. 7. $\frac{0}{0} = \frac{0}{0}$.

2

Les dents antérieures mangent pour et surtout les herbes pour
la gomme, surtout la première supérieure. La 2^e des sup. est
petite longuement, obtuse; elle est opposée à une petite
inf. - la 3^e et la 4^e auraient une dimension et ont une
position transversale avec une surface latérale de deux
façettes. La 3^e et la 4^e sont la plus grosse de la mâchoire sup.
Elles ont une divergence longitudinale de l'axe interne et de
l'axe externe donnant à leur position transversale une figure
oblique. La 5^e est petite - les inf. s'effacent peu de
supérieures - les dents sont peu saillantes et placent
jusqu'au fond de l'alvéole, on ne voit point de
cavité pulpaire à leur base à aucun période
de leur développement. - mais elle n'est qu'une
aggrégation - les dents se composent d'une aggrégation
de dentules primitives levées à leur base d'un petit
surgissement pointant, une fois la dent dent.

2nd. Jamell. Lappin on tatous.

f. Wert f. $\frac{0-0}{0-0}$; f. $\frac{0-0}{0-0}$; Prob. $\frac{24-26-26}{27, 24-20-24-}$

est le même du précédent. Dans la partie latérale
la route est marquée suivant le sillon - médian
probablement dans la construction et passant
par quatre valées. L'évier à leur base et
traverse crissant. — corps suivant le
cours d'eau.

G. glyptodon, Owen

form. Int.

March $\frac{8-8}{8-8}$ (just now
in your oven)

Dent plus ou moins et plus adhérent à une
région végétale qui est la des autres
latitudes. sont toujours, sans raison, un peu
et trébuche par l'effet de deux filons, soutenant
et soutenant de leur forme latérale; ils sont ondulés
et peu profonds, aboutissant à la fin, trébuchant
la forme de trois lobes rhomboïdaux. il paraît
d'après tout que il y avait des dents

antennayillains. pharyngé q'a chinaw.

1. glyptodon clavipes, Owen. Buenos-ayres. Silur.

Carogean 2 - 1st 50 2 - long + 1st ~~2~~ 2 - large.

a. glyptodon ornatus, over. ibi. - ibi.

3. glyptodon reticulatus, orn - ind. 25.

L. glyptodon tuberculatus, over - " " "

ensuite, il se fait quatre hops, hophors
suprastratus, hop. fellow & hop. minor de
Lund, si toutefois ils ne font pas double
emploi

g. Meryothorium, Lund

for Int. $\frac{6-8}{9-9} = 34$

à la ment. sup. les deux antérieurs 2. chape
tot, et à la ment. inf. les trois antérieurs
font des incisives par position; les post

la forme de petits cylindres. Les molaires sont
larges, comprimées et leur section rappelle à
un rognon.

1. Alomyotherium humboldti, Lund. Brés. Cas.
taille de tapir

2. Alomyotherium giganteum, id. ibid. ibid.
taille d'un grand rhinocéros. ces animaux
sont très voisins de glyptodonts.

g. pachytherium, Lund

1. pachytherium magnum, Lund. Brés. Cas.
communément par gorges et des
extrémités qui indiquent des formes plus
lourdes que la précédente.

g. taberna. (Dasyurus Lin.)

1. Dasyurus quadratus, Lund. Brés. Cas.
à l'effroy de la largeur profondément
protrus.

2. Dasyurus octocostatus, Lund. — ibid. ibid.
à mesure plus court que son
homologue vivant.

3. un autre genre appartenant au
système Xeromys, Wagl. et ressemble
au Xeromys nuticandis, vivant
les Dasyurus antiquus et maximus, et
villardiels, vivant l'un comme au
glyptodon d'après Towner.

g. luryodon, Lund.

Dents comprimées l'avant le
arrière et posant par ses parties
à angles aigus.

g. heterodon, Lund

Dents plus variées dans leur forme
et leur dimension que chez le genre
vivant. taille d'un lapin.

fourmilier (Myrmecophaga, Lin.)

g. platyodon
à Lund en annonce l'existence d'un

les cornes du bust de deux espèces
voisins l'un de Mys. jubata, & l'autre
de Mys. tridactyle vivante.

G. glomothecium, ovum H. ophi
high.

gros balle par une partie postérieure
de l'œuf qui a permis à la partie
de l'œuf qui a été animal, avant
de voir la largeur des deux bords
du dent maxillaire. de la couleur
qu'il avait de rapport avec l'œuf.
M. H. de Meyer "rapporte le même
morceau au Myodon darwini —
Bande ornée.

G. Clammothecium fischeri

f. dent. f. - c. - dent. $\frac{5-5}{5-5}$ f. dent. d. dent.

1. Clammothecium fischeri

Les dents comme ont été comparées à
celles des Stenodermis & de Stenodermis. mais
la forme de la mâchoire & le mode de
l'implantation de dents, les rapprochent de
Sauris. c'est l'opinion de M. Cuvier (voir page
de la mâchoire).

(17) v. l'œuf de l'œuf.

proboscideans. proboscideans 6

f. g. Dinothecium Kaup. (Olivier, 1846)

f. g. dent. f. - c. - dent. $\frac{3-3}{3-3}$, $\frac{3-3}{3-3}$
f. dent. f. - c. - dent. $\frac{1-1}{1-1}$, $\frac{1-1}{1-1}$, $\frac{2-2}{2-2}$, $\frac{3-3}{3-3}$

1. Dinothecium giganteum, Kaup. f. dent. et mâchoire
d. maxillaire & d. maxillaire, Kaup. 1846. f. dent. et mâchoire.

2. Dinothecium levis, Kaup. au quel de de Meyer
rémise le d. Pravicum, le d. fundatum Kaup. &
le d. Königii Kaup. f. dent. et mâchoire. 1846.
à St. Germain. L'œuf, L'œuf - mâchoire. 1846. f. dent. et mâchoire.
M. H. de Meyer. - l'œuf de l'œuf. f. dent. et mâchoire. 1846. f. dent. et mâchoire.
l'œuf de l'œuf. f. dent. et mâchoire. 1846. f. dent. et mâchoire.

Epines à molain intermédiaire de trois rangées de
tubercules - (tribolophod, fal. & canth.)

1. Mastodon Buffonis, pomel

Borsonia (part) hay,

tegrivoides (pers) Chev. & Hous.

M. velleus et violetta, agn.

Trinivis inornatus. molaires à collines
simples, largement épaissies, dont la base
est large & le sommet en crête plate
coniforme, sans tubercules accessoires, ni
arête secondaire. Le volume intermédiaire
transversal. Le nombre des rangées
transverses de trois aux molaires intermédiaires
& de quatre aux dernières qui sont
le plus souvent sans talon, quelque
fois même les dernières molaires n'ont
que trois collines principales sans le
talon tuberculeux en forme de colline.

Les caissons sont contrastés. Le dent fort à
proportion plus large que celle de l'inf.

Superférie avec le M. angustior; cette
latine (par M. nodot) avec le M. angustior?

grande tertiaire; l'inf. par l'abbé Borson,
dans les environs d'Artois, récemment à la dent

(1) arête la plus élevée de molaires agn. & inter-
médiaires inf. collines les plus élevées qu'on
a vues.

dont est nodot & envoi les molaires en
plâtre, venant de min. de fer d'Allier
d'Autrey (Haute Saône). C'est à Vézelay (Haute
Saône) qu'on le trouve de sorte d'épave
qui se rapporte à l'épave de val
Harno. - la dent 3. par tout le monde par la

plusieurs

origine. Les dents molaires ont les 3 premières collines plates & les 4
longues, trois qui ont le sommet de la crête antérieure.

2. Mastodon tegrivoides, Cur.

Mast. - tegrivoides - falcatus, arête inornée

Trinivis superius sub-orale, & velleus

par qu'on a, pourtant on bande à l'inf.

par leur face convexe. On a vu de la dent de la dent
ou l'inf. & appliqué la face
inférieure inférieure inornée, aussi bien

que la face de la mandibule.

molaires intermédiaires à trois collines plus
crinées à leur sommet & leur base plus
arrondie que la précédente, reliées d'une arête
descendant obliquement de la pointe inférieure pour
les supérieures, et les deux pour les inférieures, vers
le fond du volume intermédiaire qui est plus
étroit. par l'effet de la rétraction, l'inf. mis à
un trait par la partie de la colline n'est arête
l'inf. la partie, & l'inf. & l'inf.

selon une figure de *Granger* ordinaire ~~et~~ plus tard *Subtrifida*.

en moulin fait à proportion plus étroite que celle

de *M. Buffon* et même que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

Le moulin fait à proportion plus étroite que celle de *M. obiectum*.

3. *Nastodon obiectum*

Elphas americanus, penard

Mammoth obiectum, Blumenbach.

Elphas americanus Cuv. 1798

Elphas mammothoides, Cuvier

Nastodon giganteum Cuv.

Tarabulodon mastodonticum, quidam
megamastodon canadensis, Fisher

Smilodon populator Cuvier, à contour

limité et par bande d'email.

Smilodon inferius Cuvier, on ne présente

que les en face et quelques fois réduits

à un seul. (Voyez)

Moulin intermédiaire à trois colines;

le dernier moulin a trois colines, mais

le plus souvent de la largeur finie d'un

talon crêlé. Le talon intermédiaire

plus large que dans le *Elph. togivoides*, mais

qui dans le *M. Buffon* le bas du colin

moins large que dans le dernier. L'arête

descendant oblique très prononcée, ce qui produit

par l'effet de la distance un hexagone bien

déterminé dans la figure d'ivoire mise à nu.

Amorce typographique avec l'*Elphas primigenius*

et peut-être dans le dixième plus récent contemporain

de l'espèce humaine. Il faut plus rapporter à quelques

observations qui ont regardé l'absence d'être en face

plus rigoureuse.

50
C. M. Warren

Travail en particulier

notable sup. à la colonne

Du point de vue.

Le point de vue

qui s'est le

Le point de vue

4. *Mastodon fimbriata*, dart.

- *angustidens* (pars) luv. et blain et oven.
- *angustidens* de may et felleman et gerain
- *longirostris* (pars) harriss. Dict. des sc. n. gerain.
- *sinuatus*, de lailler et gey. Dict. des sc. n. gerain.
- *lucieri*, pomel, Bull. des géol.

Tricuspidatus Supérieur au peu contourné le
spirale au sein d'un d'écaille par une
face concave. à l'apex d'un trou sub-
triangulaire au lieu point et oval
dans une partie moyenne.

Tricuspidatus inférieur tantôt arrondi,
tantôt aplati au au d'écaille
longitudinale au lieu face supérieure, souvent
d'un trou de l'écaille; les points
aiguës au biseau, persistant, à un
gros perron, d'un trou et l'autre face.

Mastodon de l'écaille plus tuberculé que
les autres molaires et pressent toujours les dents
supérieures *Phacelodonta* par des dents
plus simples. molarie intermédiaire à trois
rangées 3 tubercles mamelonnés, souvent
confluent; chaque rangée formée de

tubercules qui interrompent plus ou moins les
vallon intermolaires. Le dernier molarie
ordinairement de 4 ecailles (pari) d'un tel
tubercule pour la lèvre et mamelonné
dans la lèvre inférieure, quelquefois réduites d'un
coller.

Griffin sub-supérieur. C.C.C. orléans. C.C. miosène

Lucia - *alluvion* (m. s. l'apex) l'écaille
moteur l'écaille. - *Lucia*, de l'écaille

M. l'écaille à l'apex d'un trou d'un trou

M. tournant qui peut servir pour un trou
pour l'écaille et d'un trou plus l'écaille

5. *Mastodon humboldti* luv.

— *andrieu* ? Blain, felle et cally.

Lucia Supérieur, presque rond, par un trou d'un trou
Phacelodonta - *or* l'écaille formé au l'écaille plus l'écaille
~~*Phacelodonta* l'écaille l'écaille l'écaille l'écaille~~

Mastodon inférieur à l'apex d'un trou
pour l'écaille et d'un trou d'un trou - *Lucia* l'écaille
l'écaille molarie l'écaille par felleman.

molarie intermédiaire à trois rangées, le dernier
à quatre avec telon plus ou moins développé
l'écaille très l'écaille et marqué d'un plus verticaux
nombreux, avec tubercles intermolaires quelque
fois le nombre suffisant pour figurer

C. 1. j'ai l'écaille observé dans l'écaille et dans
la l'écaille de l'écaille plus gros et à l'écaille au peu plus l'écaille;
mais je l'écaille qui est l'écaille à l'écaille d'un trou d'un trou

dan les supérieurs usés. Dans triple division
autres ~~transversales~~ par les bases. Les
médians ~~transversales~~ de même largeur de largeur des quins
dan les fentes des villosités intermédiaires - am. med.

perpends

6. Martodon andinum, luv.

— angustum (per) luv.

Machoir inférieur à symphyse prolongée et
arrondie en bas dans sa partie antérieure.

Médians plus simples, probablement
sans ~~la~~ cime apparente à trois
colonne pour les intermédiaires. Membranes
supérieures en rangs transverses ou tubercules
aussin mais moins nombreux que dans le
précédent et plutôt dans la partie de
dante de M. finemuralis - l'os
non strié verticalement. Machoir
plus allongé pour le bec qui est de
forme différente - l'os est un peu
bien défini - am. med.

ibid.

La cavité du bec est plus profonde et plus
plus bombée dans son bord antérieur et plus
profonde dans son bord postérieur et plus
la base allongée mais la symphyse est plus
de la longueur.

Supérieur avec grande tige et pointant
en l'air profond comme dans le
Martodon angustum de même de même

7. Martodon gayani ?? Lant.

Après avoir étudié, j'ai pu s'éclaircir
quelques os de très petite dimension. Deux
médians de remplacement ~~fort~~ ~~complets~~
et un premier arrier médian supérieur?
cette dernière très petite, composée de six tubercules
longs disposés en trois rangs et sans aucun
tubercule antérieur. Cette dent plus usée que la
deux médians de remplacement avec la quelle elle
a été trouvée indiquant par là que c'est un
premier arrier médian. Elle est trop simple dans
sa composition pour qu'on la prenne pour un
dent de lait. Les dimensions calculées
s'expliquent le volume de la dent, cette lèvre
n'aurait pas atteint la taille d'un os ordinaire.

Environ de l'os (per) pour M.

2 - gayani

miocène.

✱

Martodon

Epier à molaires intermédiaires de
quatre rangs de tubercules (tetraphodon, Val.)
Cautley

8. Mastodon angustidens, Cur.

- Swaleensis? ovum
- brevicostis, gervais
- arvernensis (sans) p. d. et noyer

Inusivus supérieur longue et
courbée en fer de lance. L'ovale d'après
la buse qui lui est la torsion très prononcée. Voir l'index

Inusivus inférieur indigène dans
le jeune âge par N. de l'Amérique
dans une mâchoire à bec court,
dans laquelle, il a une morsure
de castor et petit inusivus caduc.

Molaires à tubercules ou mamelons
disposés par paires confluentes et
alternantes, surtout les postérieures dans
le dernier molaire inférieur des
M. angustidens d'Europe. Dans le
mastodon sicilien, ce sont les paires
antérieures qui alternent. à

La mâchoire supérieure l'alternance des
mamelons n'est pas aussi marquée, mais se fait
dans le sillon intercollinaire des tubercules
saillants qui s'interceptent continuellement et
à tout degré de distinction. Le général
le dernier molaire est, comme le intermédiaire,
un rang de plus que dans les épier à
dents tricolinaires (tetraphodon). L'ovale
du molaire est lisse et il n'y a point de
cément apparent, il n'est pas dans le
fond du sillon.

France, auvergne, alluvions tourtoisennes -
Bresse - haut saône - Tethys marin de
mont-pellier - Espagne? comat - anglterre
Crag, pag. de Norfolk (avec un éléphant?)
Crag, de Suffolk (avec un éléphant?)
Italie, Val d'Aoste (avec 2 éléphants individuels?)
De Nîmes - environs de Rome - Allemagne
Stellenhof, Hambourg près le comte Brunn -
pologne. auvergne alluvions porceps - à vidette (pays) - (1) pliocène -
Inde? mar (solikis?) - - - - - miocène?

Ces épier de géomètre le M. angustidens, p. traversant,
est le auvergne soit dans le val d'Aoste dans le département
plus ancien que l'éléphant méridional qui caractérise
le premier dépôt de formation alluviale auvergne (pliocène
de quaternaire) le M. angustidens p. traversant (sans dénombrer avec un rhinocéros
Cingulatus m?) qui sont différents de M. tetraphodon intermédiaire et M. meridionalis

1. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 2. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 3. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 4. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 5. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 6. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 7. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 8. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 9. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 10. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 11. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 12. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 13. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 14. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 15. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 16. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 17. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 18. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 19. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 20. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 21. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 22. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 23. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 24. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 25. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 26. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 27. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 28. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 29. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 30. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 31. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 32. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 33. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 34. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 35. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 36. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 37. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 38. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 39. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 40. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 41. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 42. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 43. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 44. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 45. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 46. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 47. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 48. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 49. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 50. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 51. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 52. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 53. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 54. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 55. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 56. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 57. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 58. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 59. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 60. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 61. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 62. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 63. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 64. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 65. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 66. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 67. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 68. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 69. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 70. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 71. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 72. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 73. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 74. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 75. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 76. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 77. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 78. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 79. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 80. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 81. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 82. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 83. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 84. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 85. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 86. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 87. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 88. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 89. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 90. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 91. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 92. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 93. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 94. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 95. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 96. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 97. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 98. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 99. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional
 100. M. meridionalis est une espèce de l'Europe, l'Amérique - avec l'éléphant méridional

9. Mastodon longirostre Kaup.
— argutidens (non) Meis. wien.

Mastodon à longue symphyse avec incisives permanentes. la symphyse parait avoir été moins longue que dans le M. d. - pinorum.

Trois molaires d. lait; la 1^{re} à 2 tubercules sur 2 rangées, la 2^{te} à trois rangées; la 3^{te} à 4 rangées. remplacement obtenu pour la 2^{te} molaire d. lait. ce molaire d. lait ressemblait beaucoup à celui du M. argutidens. cependant dans le dernier de celui-ci les membres sont alternants.

Dans les arrières molaires les rangées sont transverses et les membres non alternants. les vallons intermédiaires qui séparent les ~~dentures~~ postérieures du dernier molaire restent toujours ovales ce qui n'a jamais été obtenu dans le M. argutidens.

Nallie du Rhin - Eppelheim
+ peut-être dans l'Inde?

mus. Sep.
mus. ?

ott

10. Mastodon (valensis, fohmann + Cantley)
argutidens? wien

molaire de forme très rapprochée de M. argutidens. seulement la portion des membres latéraux dans le dernier molaire inférieur n'alternent que dans les trois premières rangées. les membres ^{se rencontrent point.} du deux ^{et} sont ^{se rencontrent point.} dans le dernier rangée où ils n'alternent pas.

muséum
m. f. v. l. v.

11th M. parvirostris. — molaire à vallons non alternants, tubercules intermédiaires dans la partie antérieure. les membres latéraux transverses par alternance latérale. ^{se rencontrent point.} dans le dernier rangée où ils n'alternent pas.

11th parvirostris

12 Mastodon latidens, Clift.

molaire à vallons transverses divisés longitudinalement. les deux ~~parties~~ parties pairs de points prismatiques qui n'alternent point, comme dans le précédent. le dernier supérieur ordinairement avec vallons prismatiques avec un talon postérieur ou avant et un talon ou vallons transverses les arrières. les mol^{es} intermédiaires à 4 rangées 2- tubercules sans membres antérieurs interrompant les vallons. mais les ^{deux} ^{parties} ^{pairs} ^{de} ^{points} ^{prismatiques} ^{qui} ^{n'alternent} ^{point}, comme dans le précédent.

une variété mineure d'ovale, parvenant dans la
forme des valves. Les lobes divers, dans les dents
ou l'ovale et l'oblong ressemblant beaucoup à
celui fourni par la dent de l'Elaphant ganges,
mais ~~il est~~ ~~en~~ la valve sont moins élevés et
leur base plus élargie. Le M. Latidens est
de toute la forme connue celle qui se
rapprocher le plus de l'Elaphas cliftii (M. Elaphantinus clifti) il ressemble d'autant
plus, au M. Baginatus de Kangu, surtout
par la dernière valve et la coque les
pointes et les dentelures mais moins que
celle d'une Elaphus Westg. — Il y a
une variété mineure - même dans la ovale
la coque long, pointu et ~~est~~ la bourse et la valve.

13- *Arctodon australis*, *omni* (ass. du bassin rétro.) -
Londres. Tan X11

Mr. Nelson a ~~été~~ à Québec au sujet d'un machin au-
vant dit très large, et la machine très épaisse et
très serrée - il faut qu'il y permette être la
même qu'à Mr. du prégonie

Elymus manihoms

Martinson Christian



Elephas hydrieus.



Elaphas namadicus.

5. Daphnys planifrons, falc. & cant.

Dents molaires qui commencent à
devenir lamelleiformes, les lames étant plus
hautes que larges à leur base. Le comest
et porte au maximum de quantité
dans cette espèce. L'osail dans la dent
littéraire fait quelquefois un byssus ou
rayé anguleux à l'arrière ou le milieu
des lames, mais la disposition de la largeur
longitudinale n'est pas aussi régulière que
dans l'éléphant d'Asie. Les lames
de 2 ou 3 plus anguleux opposés base à base (cf.).
Les molaires intermédiaires de l'éléphant planifrons ont
des lames plus hautes que larges. Dans l'éléphant
d'Asie de 2 ou 3 plus anguleux avec un tubercule subordonné.



(17) Dents fortes d'Asie attribuées par M. Gervais
à l'éléphant d'Asie, à 2 ou 3 plus anguleux
ou les molaires de l'éléphant, mais la position des plus est
différente.

6. Daphnys priscus? falc. & cant.

57

Dents molaires ayant l'aspect d'un
cane. 1. l'éléphant d'Asie
autre, plain d. l'Asie (voir le croquis)

l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie
grays de l'éléphant

éléphant

Section de l'éléphant (voir le croquis)

7. Daphnys meridionalis, marte
— probolus? falc.
— antiquus, falc. & cant.
— arvensis
primigenus (falc.) l'éléphant d'Asie

Dents à l'osail épais, l'éléphant d'Asie
les lames (1 section par l'osail - à l'arrière des lames du plus grand
section.) l'osail d'Asie plus épais que l'osail d'Asie qui
les lames. Les lames de l'éléphant d'Asie sont plus
longues mandibulaires prolongées.

(l'éléphant d'Asie)
l'éléphant d'Asie - l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie
l'éléphant d'Asie (avec le l'éléphant d'Asie?) - l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie
(avec le l'éléphant d'Asie?). Le plus grand l'éléphant d'Asie
postérieur avec le l'éléphant d'Asie. l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie
avec le l'éléphant d'Asie qui l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie, l'éléphant d'Asie

éléphant



gouges pour repères par l'effet de la gaine
 que les dents ont gravée dans le bois
 M. 2000 et une denture mobile qui s'agit
 repère dans le bois par sa partie
 portante. Dignes généralement courbes.

Longue, étroite, serrée, épaisse? Dans
 la denture Longue, étroite et la cavité.
 Epaisseur de l'échancrure l'échancrure, au
 régime, ours, chevrons et à certaines

Epaisseur dans les dents - au régime, dans la denture, dans la
 dent de bois, qui s'agit.

Epaisseur - une denture ou de l'échancrure de la denture. Cavité.

U. primum?



Epaisseur dans la denture

Epaisseur dans la denture, au régime. U. primum. 2000.

Epaisseur dans la denture, au régime.

Epaisseur dans la denture, au régime.


Epaisseur dans la denture, au régime.

Epaisseur dans la denture, au régime.


Epaisseur dans la denture, au régime.

Epaisseur dans la denture, au régime.


Epaisseur dans la denture, au régime.




U. primum




U. primum



U. primum



U. primum



U. primum

2. { *Acerotherium gannatense* Desv.
~~*Chamaeceras*~~ = *promela* (1)
 plus grand que le précédent - dans la même
 espèce le 2^e collier et le premier du cou sont à peu près
 antérieurs le 3^e du nez plus saillant et plus allongé.
 le juv., Bouasse (Puy-garnot) (allier)

microsc.

3. { *Acerotherium croqueti* prom.
~~*antennothoracum*~~ Desv. et *blanc*
 espèce plus petite, argentée par les molaires
 semblables à celles de la précédente. Les os
 du nez sont très courts, longs et amincis
 à l'extrémité (juv.) Vassier, gannat, l'auvergne

microsc.

4. { *Acerotherium foveolatum*
Chamaeceras foveolatum Desv.

5. { *Acerotherium occidentale*, Leydi
Chamaeceras occidentale, id
 os du nez très. molar. distinctes plus petites
 que celles de l'a. typus - taille 3/5 ou plus.

(1) *Butastherium*? croquet

de l'Inde. - molar. supérieures, couvertes d'un
 bourslet baplaire plus saillant aux quatre antérieures.
 le velum interlobulaire du 3^e et 4^e premiers fémur
 de bonne heure. les arrières molaires sans crochets
 apparent. le 1^{er} premier collier forme la division en deux
 colliers distincts traversés bien plus distinctement que
 dans aucun type européen. + molar. inférieures
 diffèrent aussi un peu de celles de l'espèce d'Europe
 - Abney, sept. formation de l'Inde (1) des bords
 de la Nebraska. (2)

+ 3^e et 4^e de
 l'Inde. l'Inde
 d'Amérique,
 le quel est
 rapporté de
 l'Inde, molar. inf.
 par l'Inde.

6. { *Acerotherium nebrascense*, Leydi, p. 181.
 Abn. nebrascense d'Abn. p. 181.

petite espèce de la taille d'un cerbion
 ordinaire. molar. supérieures, assez saillantes
 aux molaires de l'a. les colliers plus saillants
 le arrières que dans le précédent. velum de la 3^e p.
 form. de bonne heure. le 1^{er} collier très distinctement
 bourslet baplaire dans le 4^e premier fémur. il
 existe aussi dans le molar. inférieur. Dans le dernier
 fémur, il y a le arrières un fémur qui marque
 la tumeur à venir à la disposition bilobée de cette
 molar. même l'os qui le précède.

(1) d'après M. Leydi et d'après. je crois plutôt que c'est
 du même.

Occure?

Inde

7. *acanthium*? *perimur*, *Salomon* & *Canthay*

inde

mic.

(1)

s. g. *Rhinoceros*.

8. *Rhinoceros* *incipiens* *Can.* *opulens* *Dur.*
 { *Rh.* *Schlegelmanni*, *Kang.*
Rh. *Sarbanensi*, *Lart.*

Sarban, *Orkenai*, *Opulens* &c.

mic. m.
 & *typ.*

9. *Rhinoceros* *Brachypus*, *Lart.*
 { *Rh.* *goldfueri*? *Kang.*

10. *acanth.* *Velamen* & *Al. curvi* *proposit* *per* *de* *Rayne*
reim *Blabner* *in* *Dutch* *Engl.* *idem* *a* *quid* *est* *in*
fig. *Rongothurum*.

felus *de* *la* *Tourain*, *felus* *de* *Orkenai*, *S. per*
Gyrolthum —

mic. m.
 & *typ.*

10. *Rhinoceros* *Lauricardi*? *Lart.*

Lart. —

mic.

11. *Rhinoceros* *ornatus*, *Can.*

mic. inf?

12. *Rhinoceros* *pleuroceres*, *Dur.*
 { *Rhin.* *paradozus*, *per*

mic.

Clinton, Jersey

97. *pluv*

14. *A. benesueus galatindicus*, ind

Chas.

2250

13. *Rh. platychinus* in.

لکھنؤ

And

Ans.

69

16. = (Albin. *Leptorhynchus*, Car.

~~Chen~~ - megastheni? Crut.

Sh. monzetteanus? no form.

Callosa 2^a mod. Sup. Larg. et termin par un cul 2-lan 200

bitob! wenn Du Lithionium, oder vertikale Infanterie...
Externe der mol. Typ.

*mont. pilini*¹, *convergen*², *angulata*, *italica* plur.

17. *Phuribaculus protobaccharius*, n. sp.

— *Leptostichus*, osv.

18. (Rhinoerus Elatus, cong. r job.

at the same Water, from

Stipite a suggeste de Rhinoceros mont. pollicin

La 1^{re} prunella (pyre et bi-collinaire, ^{par} une bruyère polie)
sur la nebrose (america)

perrier, ~~perrier~~

29. Abinus tichorkinus, Aur.

critici dau la judec, stand, etc: cum

notaire Juss. à Longfonten d'Email; la dernière

Silobis. Les inférieurs plus primitifs. Mais

très brins et rugueux; semblerait l'admirer ou

melles. Choison de Minne otte

Surgeon

Silene
Cav.

20. *Akinacium Lunellianii*, gen.

Al. *Picornis afri.*? Laro

car.

Leav. P. Hunt sent to Dr. J. G. Rehn.

S. g. Stevens? det.

1. *Stercorarius lapponicus* galli Sen.

St. Louis

John

G. tapir (Tapirus, Brisson)

for Dig. 4 - 3

1. Tyrinus poirenei novel

1/4 plus petite que la tige d'Amérique
moins inférieure les tiges - vannes.

A. tapirus princeps, Koenig

Sphenothamnium - brachi creatum misc. Sup.

B. tapirus antiquus? Kangas

Syzygium — *ibid*

4. *Capinus arvernensis*, criz. 5. *id.*
— *indicus*, Blain

Voir à l'égard d'Amesbury. Amersbury - phos.

S. Laxius minor Grav. Elg? pom.

vicelli; azma
mon pelli, Louis-Jacques

phvi.

S. tapirus ruberatus, G. S. - meyer

metaph in Marbades ———— omi²

7. *Teperius junius*, Lam. 9.

the San Marcos. ~~Spain~~ Can.

64

g. bartanus, over

L'opini m'amen voisin de toyis. compressé
L'opini de arde par m. Barban pour le non
de fus americains. - georgie avec le despotisme d'ibou

G. platygomus, Leconte. (Illin. Am. Journ.
1868 - Vol. C13)

1. platygaster concoloratus. Arvoti

Polistes pygmaeus représente une des espèces les
 inférieures à celles traversées, la dernière une telle
 comme *pygmaeus* comprises comme elles de *maclurei* Des.
 & Gault.

g. Lophodon. Cur

f. dent. f. $\frac{3-3}{3-3}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; pr. $\frac{3-3 \text{ on } 2-2}{2-3}$ in $\frac{3-3}{3-3}$

form sig. 3? - 3? —

formes à trois tranchantes, arêtes ciliées. Poist
median subgynostegium -

S. g. Coryphodon, ovum

1. Coryphodon locatus, ovum
 { Coryph. 2-3 ovules, cur.
Coryph. antrochodum blanc et gris.
antrochodum de meudon, Dorsigny
Coryphodon de laonnois, cur.

arg. pl. de meudon légende du (laonnois). arg. 1. l'ind. Loc. inf.

S. g. Coryphodon, cur.
 ovules sub-similaires, la dernière plus
 plus ou moins oblique suivant les lignes.

1. Coryphodon ischiodon, cur.
 plus grand l'antre que le tige des ovules

1. l'ind. et argenton Loc. m.

2. Coryphodon parisense, cur.
 3. Coryphodon 1. meudon, blanc.

l'antre 2. pari, cal. gress. Loc. m.

3. Coryphodon tapiridum

ovule de Coryphodon, antrochodum
 (ant. 1. l'ind.) Loc. m.

65

4. Coryphodon bupresticum Loc. m.

2. le tige de tige de l'ind. 1. l'ind.

5. Coryphodon medium argenton Loc. m.

6. Coryphodon tapiridum
 2. le tige de tige de l'antre. 1. l'ind. Loc. m.

7. Coryphodon olivaceum
 1. l'antre plus petit que le tige
 l'antre - 1. l'ind. 1. l'ind.

8. Coryphodon minutum?
 argenton 1. l'ind.

9. Coryphodon 3. l'antre, meudon
 tige grande tige qui se fonde par la
 détachement de l'antre, si le verif' qu'il n'avait que
 deux ovules de l'antre et à la machine inférieure,
 avec le meudon la machine inférieure qui en
 l'antre à la détachement de la meudon la première
 l'antre qui est attaché à cette tige l'antre
 1. l'antre le plus grande de Coryphodon. mais la
 première inférieure revêtait plutôt de la forme
 de celle de l'antre meudon l'antre (ant.) loc.



Coryphodon ischiodon

2. *palaeotherium medium*, cur.

ou de nez plus court, à pieds étroits et
avec allongé plus petit qu'un os de maxillaire.

paris, ayt, castelnau-dary

3. *palaeotherium crassum*, cur.

ou de nez plus
longs. pieds larges et courts. même taille que le
précédent. paris, ayt

4. *palaeotherium latum*, cur.

à pieds très longs et
et plus étalés. même taille - paris

5. *palae. curtum*, cur.

pieds courts plus sauteurs et
plus larges. taille d'un mouton. paris. ayt.

6. *palaeotherium indeterminate*, cur.

int. indéterminé aux
pieds. médium et crassum. paris

7. *palaeotherium girondicum*? Hae.

main grand qu'un le pied. maxillaire.

à la gorge - Dordogne - Loc?

1. *palaeotherium*, ovine

fig. 1. $\frac{3-4}{2-3}$; $\frac{1-2}{1-1}$; $\frac{4-5}{4-4}$

f. dent. $\frac{3-4}{2-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{3-4}{2-3}$; m. $\frac{2-3}{2-3}$

fig. 3 - 3

premier fig. main compliquée que dans les *palaeotherium*.
augmentant rapidement de dimension de la 1^{re} à la 3^{re} qui
n'a que trois racines et dont le sillon intercalaire est
formé du côté interne dans la dent inférieure. Dans les *palaeotherium*
certaines le lob. antérieur ne se réunit au lob. inférieur que
dans la dent dont le sillon est visible et se y a
interception, d'autre d'un, division en deux lobes. Le lob. antérieur
dans la dent la jeune. Les sillon font même
oblique au - dans le *palaeotherium*. comment?

Le 4^{te} première et unique avec une base antérieure
de petite tubercule et plus compliquée que dans le
palaeotherium. la dent réduite du *palaeotherium*
même que dans le *palaeotherium* et compliquée et ressemble
plus aux premières homologues de certains mammifères. Le
5^{te} reprend l'allure bilobée des molaires normales du
type *palae.* mais les croissants sont moins courbes. Les
trois v. molaires sont bilobées avec un long sillon latéral
en arrière, comme dans le *palaeotherium*. mais la dernière,
d'après les ossements, n'a pas le troisième lobe en croissant
plus ou moins court qui se retrouve dans

2. *hypotherium antelgipium**hypotherium antelgipium*, fol. & c. ind. min.

Dans le *hypotherium*, le fémur est à l'os du dent.
et porte une saignée de compléation. Le lobe
interne du molaire inférieur et tige isolée partie terminale
de la dent molaire inférieur isolée comme dans
l'*Equus* d'orient.

g. *Equus*, *Equus* d.f. 1. $\frac{7-9}{5-7}$, $\frac{1-1}{1-1}$; pr. $\frac{4-6}{4-6}$; m. $\frac{2-3}{2-3}$ (petit molaire caduc)1. *Equus pleistocène*, ovum

Dans l'os du fémur, au p. fémoral, on
dans l'*Equus*, mais dans le lobe interne
est point isolé, qu'on différencie du cheval
actuel. dent moins large, terminant terminant. U
dent molaire inf. isolée dans la partie terminale. orient. car.

2. *Equus fossilis*. Dans l'os du fémur
dent terminale du molaire inférieur
dans la saignée actuelle.

3. *Equus fossilis*, fol. & c. ind. min.4. *Equus nemadensis*, id. ind. min.

C19. Dent trouvée au p. d'os à l'os fémoral; autres
dans la saignée vivante à l'os fémoral. Dans le *Daw*, le molaire postérieur
fémoral. lobe interne point isolé. a. *Amphotherium* peut-être. lobe
interne molaire.

5. *Equus palaeomys*, fol. & c. ind. min.6. *Equus curvidens*, ovum, am. fém. & molaire.

molaire à saignée longue et courbe

7. *Equus americanus*, am. fém. lobe -voisin de l'*Equus pleistocène*.8. *Equus principalis*, Lind. - am. molaire.9. *Equus neogaeus*, Lind. - id. -

Voie Lind. am. - d. m. - 2. fém. f. 7111 p. 519. - grand bill. molaire 1868, dent ⁺¹⁸ 1869
cheval & zébu d'orient lombard. am. molaire, dans chemise 5.7
union finale au fémur, lobe interne point isolé et molaire.

g. *Maasanchinus*, ovum1. *Maasanchinus patagonicus*, ovum.

molaire présentant quelque analogie avec celle de
galactomys. trois doigts terminés par des
phalanges; le molaire un peu dans la forme de celui
de cheval, mais bien que l'os du fémur - molaire
de ces analoges à celui de l'os - patagonien
le dent molaire inf. molaire 2.5. lobe (grand molaire inf. molaire)

g. *Microdon*, ovum

os du fémur, fémoral. molaire point isolé
dans molaire de l'os du fémur par la saignée
la dent ^{le molaire} ~~point isolé~~ comme de cheval.

1. *M. imbricatus*, ovum - d. la taille de l'os, am. molaire.2. *M. pulchellus*, d. d. la taille de l'os - id. -

Br. les le pousse que lui ne devint la troisième avant la mort.

G. amphoterium, Cav.

7. 49 - 7. $\frac{2-3}{3-3}$; $\frac{1-1}{1-1}$, mod. $\frac{4-6}{4-4}$

f. Dant. 7 $\frac{2-2}{2-2}$; $\frac{0-1}{1-1}$; $\frac{1-4}{2-4}$; $\frac{3-3}{2-3}$

form digit 2 - 2 on 3? - 3 - (Smithsonian)

Desm. en pers. continens, caninus incisiformes.
granulatus *Dissonatus* & *congruus*. *mutatus* ^{longus} *quinque-*
-lobus. 1/2 *lobus* à la coll. autrichienne.

4. Amphibolium Commerson, var. 2. la talle 1 m
petit ann. pari, apt, ila D. Wright.

Loc. Sup.

2. Amphib. Secundarium, com. in Juncosagi pum.

Epinephala munda. peris

g. Surithrium? guss. (sur les bryophytes au sein d'un bouquet
à chaque pied, mais fort rarement & en petit
nombre forticaux. n. b.)

1. *Eurhacium latipes*, nov.
anopl. platysm. form. Sept — Ex. p. 2.

Loc. 7.

G. amabilis, Lat. ♀. Int. $\frac{78-9}{2-3}$; C. $\frac{1-1}{1-1}$; per. $\frac{9-2}{2-3}$; m. $\frac{9-2}{2-3}$.
Chalcithrinum, Kamp.

1. *Amisodon magnum*, Lat
 { *Amisodon grandis*, Lat - grandis Haines.
 { *Chalicotherium* - goldf. Haines.

prostratus dissimilans, retatus et plus ou moins unguiculatus.

Serviciu med. igienic (implantat bilotie - autogazd

En outre jouter? Sanson, Simon, Eggenstein

move.

2. David Don wishes
Chas. Ireland's company - particularly in the present
position.

miss.

71

~~Myanipdon? zethasens. Lant.~~

Palaeotherium (titanotherium) proutii, Rob. Owen, narrow antlers

grand l'opium qu'on se voit avoir été mal à propos, corrigé dans la g.

pelicantherium. (18 pieces analyzed) - long at 8 piers & bent / bad lands: how?
(see fig. 1)

compte p^{er}fectionné. sur un terrain ~~de~~ le faire à un
Weymann ~~de~~ mis en (1^{er} étage) le terrain m^ulti^{er} à un 3^e l^{er} - (7)

S. g. latimodon, h. v. Mayr - non pubescens carterii!

1. tequinoson gressleyi, h. d. May. ~~unim de tolema~~
voisin d. d'anylotheus.

meo.

J. G. Hyndman (rev. from former edition) on the subject of
the opium (but also on the subject of the opium
trade)

1. *Xyphodon gracile*, nov. Tailla en hamois. peris, sept. Loc. Say.

2. Zyphodon gelender gew. St. gelb (herault). See See.

B. Zeph. pseudopurum, from. apt. 1851

Fig. Dichobium, var. maius formos.; mais dont nous continuons. machine en tôle
pour la typographie, les ^{diverses} lettres en 9 lettres, une ou 6 caractères.
pour un grand imp. - plus de 7 doigte ?? (la machine) deux doigte

limitaires, la 3^e plus grêle, probablement non fonctionnelle.

Diobon pulchrum, gear. *martern* (ed. goud. l. c. m.

2 *Dichobum robertianum*, var. *pari* Rodriguez

2. *Trichostema*? *leptocarpum*, Cav. taken on lava, S. of Montezuma

longs. mont martin low. high.

4. *Dicksonia cerriana*, Owen, plus grand, the 2. night-bird. E. I. S. J.

• Si chet benin zu sein dann pa der pratt, und mit phet in y phet.

619. *pusilla* nig. et. id. g. 6 *modestissima*.

g. torquatus, ovum (to Egg, au, Odeus, but)

f. dent. $2 \frac{2-3}{3-5}$; c. —; pr. $\frac{4-5}{3-5}$; m. $\frac{3-4}{3-5}$

1. *torquatus platensis*, ovum. De la taille de *h. hypogastri*.
 mutaires longues et courbes, avec cornues et lésions des
 la supérieure, se fassent à l'égale la saignée d'argent et le rouge
 sont presque à la ligne médiane du pôle, forment une série
 d'arcs, capelle de milieu à une grande position. inégalement
 à celle du rouge et comparable à celle du blanc tant
 par leur marche que par leur rapport d'orientation.
 division inférieure semblable par deux fois, comme celle du pôle.
 mutaires inférieures à pôle persistante et un peu courbe. Dans la
 position, il y a un biais que par la partie inférieure, ce
 qui est horizontal. par cette orientation l'huile sur la
 colonne, le torquatus diffère du pôle par son et se rapproche
 des brutes. am. muid.

2. *torquatus angustatus*, id.

id.

id.

3. *torquatus persicus*, l'originaire

id.

id.

originaire
h. hypogastri art. Dargy

g. hypogastri . *hypogastri*, l. (tétragynodermis folium)

f. dent. $2 \frac{2-3}{3-5}$; c. $\frac{1-2}{1-2}$; m. $\frac{3-4}{3-5}$ ou $\frac{4-5}{3-5}$ l. luv.

f. dent. $2 \frac{2-3}{3-5}$; c. $\frac{1-2}{1-2}$; pr. $\frac{4-5}{3-5}$; m. $\frac{3-4}{3-5}$

f. dy. 4-5.

impair et l'anneau de l'est normale. division persistante et

taille comme dans le cas. division et l'anneau persistante à pôle
 persistante. mail de la corne pôle persistante et l'anneau - inverse de
 l'anneau.

1. *hypogastri major*, luv. 2 et 3. première plus grande que
 9 ans 2. h. angustatus et plus distinctes; face antérieure des cornues obliquement
 striées; caput plus haut; face plus courte. plus plus grand. Val d'Amor, orig. Dargy.
 Anster, au rouge, etc. etc.

plusieurs et
 exclusives?

2. *hypogastri minor*, luv. taille du pôle - division mutai
 plus compliquée, face persistante de l'origine angustatus et la maille. Dargy

miscan?

3. *hypogastri portlandi*, l. d. moyen; intermédiaire par la
 taille au d'origine persistante. grosse de base circ. pôle -

id.

4. *hypogastri diffinilis*, fol. et caule. id.

id.

5. *hypogastri persicus*, id. division id.

id.

6. — *hyp. hypog. namadun*. id.

id.

7. — *hyp. hypog. arvensis*, fol. et caule. la base de l'anneau -

id.

Cochon g. Sus. (17)

f. dent. 1. $\frac{2-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$

f. d. g. 4-4.

1. Sus dentigera Kaup. Epiglochin
2. Sus pleschkei, Kaup. ibid
3. Sus antediluvianus D.
4. Sus chieridii, gem. - arvensis D. - Epiglochin?
5. Sus lockharti, gem. (Hering? Lockhart? arvensis? antediluvianus? ibid)
6. Sus binomiale, Lat. - binomiale
7. Sus belianus? gem. - ibid - Sus lockharti - maritimus
8. Sus arvensis, arvensis - ibid
9. Sus javanicus, gem. - ibid - Sus lockharti - maritimus
10. Sus megas, gem. - arvensis
11. Sus pringi, Goldf. - ibid - Sus lockharti - maritimus
12. Sus giganteus, Cant. & Gale. - ibid
13. Sus hypodermis, ibid
14. Sus pleschkei, ibid - (type de f. g. hypodermis)

g. hypodermis, Lat.

1. hypodermis, Lat. - ibid - Sus lockharti - maritimus

g. Calymene, b. d. megas.

caractéristiques de dent canines voisines d'elles

de pleschkei.

(1) Dans la famille les canines sup. font une courbe uniforme marquée
l'animal n'a aucun dent. l'animal n'a aucun dent. l'animal n'a aucun dent.

Sus pleschkei, gem.

f. dent. 1. $\frac{2-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$

injection prénatale dans le plan de l'arthrodontisme;

notamment dans le plan de pleschkei - grand dent

1. pleschkei, gem. - ibid
2. pleschkei, megas, ibid
3. pleschkei, Wetherhousei, D. - ibid
4. pleschkei, pleschkei, D. - ibid

g. chieridii, Lat. - chieridii.

f. dent. 1. $\frac{2-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$

1. chieridii, D. - ibid - Sus lockharti - maritimus
2. chieridii, D. - ibid - Sus lockharti - maritimus
3. chieridii, D. - ibid - Sus lockharti - maritimus

chieridii, D. - ibid - Sus lockharti - maritimus

chieridii, D. - ibid - Sus lockharti - maritimus

g. hypodermis, Lat. - ibid - Sus lockharti - maritimus

f. dent. 1. $\frac{2-3}{2-2}$; c. $\frac{1-1}{1-1}$; p. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$

f. d. g. 4-4

Lophocherus blamittei

1. *Caprihorn* *Chloridion*, Lat. $7 \frac{2-2}{3-3} \left(\frac{1-1}{1-1} \right)^{2-2} \frac{2-2}{3-3}$
Caprihorn *Chloridion*
Caprihorn *Chloridion*, Lat.

1. Agrostis corniculata

[illegible]

G. luteoladon, *agmar* (Notharium, promel
archaethium? Leidy)

For 4. $\frac{3-3}{2-1} = 0$, $\frac{1-1}{1-1}$ is $\frac{2-1}{2-1}$ in $\frac{2-3}{2-1}$

trém. pag. longues et courtes. malades les collines très vives
tristesse le dernier plus petite. (Mad. l'and am. Sep. 1802.)

1. Entodon magnum ^{long} grayi (Chas. Gray) Gray. inisc. 1871

2. Antalis benyonii, argus. (Antalis benyonii, argus benyonii argus)

G. macropterus, Cuv

γ last. $\frac{b-a}{b-a}$; μ . $\frac{b-b}{b-a}$; m . $\frac{b-1}{b-1}$. = molaires & tubercules

Les deux sangs ont le premier avec trois tubercules, collet basilaire

1. *Chrysotamus paripictus*, Cuv. - sp. Cuvieri, viv. paripictus. Loc. Ind.

2. *Macropstomus affinis*, *gambianus* Le Schreger, Cat. - 162

g. hypothermia; Meyer mol. $\frac{\beta - \beta^0}{\beta - \beta^1}$ voir la thermogène.

1. hypothese mediane, 2. mean Wahrscheinlichkeit

2. *Lycopodium. Macmurtrei*, E. *subtruncatula* (L.) Presl.

R. hyal. - pumilio, D. - - - *gorgonensis* *phila*

17th dans le profond creux. bilobé de 2. 1/2 part bas (Bengel) *Colymbus* *lucorum* *lucorum*
3 lobes en pointe comme celui de *lucorum* et des *merganser*.

G. anthracinum, Aen. f. dent. 7. $\frac{3-3}{2-2}$; $\frac{5-1-1}{1-1}$; per. $\frac{4-4}{4-4}$; m. $\frac{2-2}{2-2}$. Aug. 4: 4?

Paromol. dissimilans; molani Sze. Carrii et Geringi - Unguicis. Castregei ludobovianae

1. Anthracosia magna, Cuv. Carbon, Cuv. Sign. magna?

2. Ant. minus, brev. De menter plus petit - endosse

Aspt. striatum 32 sp. 7. feather

(1) *L. anth. oviformis*, ^{nov.} *gen.* (An. magn. d. Montanum, Hains) de noviss. (Hains)

Sq. hyoglossum, over - another name. Bothridium anal.

visini de anthracothereum, molare sup^a a colina marginale fortante

napfeln. Das lam. milium *Glossa*. *bonthe* prismatis. sehr wie eine

San Carlo. nervosa bracteosa. nervosa paillette. *San Carlo* and:

inférieure à l'écoulement plus anguleux du côté le terrain est maintenant à l'air

you are not invited - Dave Steadman

(1) *L. haemorrhoidalis* var. *haemorrhoidalis*

2. Hypothesen Prüfung 1

[illegible]

21. 11. 1911

2. *Hypericum perforatum*, L. Anagallis

1. *Myrica* *parviflora*, Willd. 1822

G. nylaschemum, Owen = Isotriaena triviridis De Meijere.

1000 paces

Agrostis thymifolia, Owen

H. hyem. curvatus, ~~Eximius~~, *Hyem. in p. p. p.*

g. Microchaeta W&B

Linnaea, wood. — knowell

(1) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 2x - 8} = \frac{2^2 - 3 \cdot 2 + 2}{2^2 - 2 \cdot 2 - 8} = \frac{4 - 6 + 2}{4 - 4 - 8} = \frac{0}{-8} = 0$

que les bêtises qu'on se permet.

67) *Synaphobranchus zosterocirrus* from ^{Mt. S. L.}
with *Synbranchia long.* ^{lateral lobe anterior - narrow}
^{lateral fan lateral - point & apophysis}

g. Archaeotherium, gen. - voisin du paléotherium. (voir l'archéotherium, et Diller)

1. Archaeotherium patrinianum, Lyg. de la Sabra - loc. Lyg.

g. Heterotherium, gen. - voisin du paléotherium, voisin du l'archéotherium.

1. Heterotherium armatum - Gumbellien (Bartholin) (voir l'archéotherium) loc. moy.

g. Archaeotherium, Lyg.

1. Archaeotherium Martoni, Lyg. - voir l'archéotherium. (voir l'archéotherium) loc. moy.

2. Archétherium (loc. de la Sabra) - loc. ?

g. Prototherium, gen. - voisin du l'archétherium. le plus petit des archétherium.

1. Prototherium primatum, Lyg. - voir l'archétherium. loc. moy.



Sivatherium giganteum

Ruminants

g. Ruminants (voir l'archétherium.)

1. Ruminants (voir l'archétherium.)

2. Ruminants (voir l'archétherium.)

1. Ruminants (voir l'archétherium.)

2. Ruminants (voir l'archétherium.)

g. Myrtherium, gen.

1. Myrtherium (voir l'archétherium.)

2. Myrtherium (voir l'archétherium.)

3. Myrtherium (voir l'archétherium.)

g. Giraffe, gen.

1. Giraffe (voir l'archétherium.)

2. Giraffe (voir l'archétherium.)

3. Giraffe (voir l'archétherium.)

4. Giraffe (voir l'archétherium.)

g. Sivatherium, gen.

1. Sivatherium (voir l'archétherium.)

2. Sivatherium (voir l'archétherium.)

3. Sivatherium (voir l'archétherium.)

g. Brachytherium, gen.

1. Brachytherium (voir l'archétherium.)

g. tregulus. Chevreton - $\frac{0-2}{2-3}$, $\frac{1-1}{1-1}$, pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$

Le contour est à peu près ovale ; la milieuse
à l'ordant aux bords d'un côté de la hauteur. D'ord.
L'écaille développée - ^{milieu fort large} - l'écaille large, angulaire, polygonale
mais moins développée que dans les morches primaires
et la petite transverse. milieuse à l'écaille unique, plus
qu'à l'écaille.

1. *tragus* Sanderus. lat. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5
{ *tr. natus* 3.
lat. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique. (lat. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5)

2. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

g. tragus Kargi - $\frac{0-2}{2-3}$, $\frac{1-1}{1-1}$, pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$

(*Amphitragus*, pr. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5, lat. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5)
milieuse à l'écaille unique.

1. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

2. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

3. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

tr. natus à l'écaille unique.

g. tragus Kargi - $\frac{0-2}{2-3}$, $\frac{1-1}{1-1}$, pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$

{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

1. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

2. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

lat. 3.5 à 4.5, large 1.5 à 2.5

g. tragus Kargi - $\frac{0-2}{2-3}$, $\frac{1-1}{1-1}$, pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$

milieuse à l'écaille unique.

1. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

2. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

3. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

4. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

5. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

6. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

7. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

8. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

9. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

10. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

11. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

12. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

13. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

14. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

15. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

16. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

17. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

18. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

19. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

20. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

21. *tragus* Kargi. pr. $\frac{3-3}{3-3}$, m. $\frac{3-3}{3-3}$
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
{ *tr. natus* 3.
milieuse à l'écaille unique.

g. *Spelaodon* harlowi Wood.

Hardwell

Loc. des.

g. *Dasygnathus* griff. $\frac{7-8}{4-5}$ p. $\frac{1-2}{1-1}$ p. $\frac{2-2}{2-2}$ m. $\frac{4-4}{5-5}$

1. *Dasygnathus* Lamachus, Wood, and cap in valley valley

Loc. des.

g. *Nidagrus* (Chaeropus, Thom, halmatium, Thom) $\frac{7-7}{5}$; $\frac{1-1}{1-1}$; $\frac{1-1}{1-1}$; m. $\frac{4}{4}$

1. *Nidagrus* etiam, Wood, plus grand que le N. arctus.

id.

id.

2. *N. etiam*, Wood.

quodam est Thom.

id.

3. *N. affinis*, Wood.

id.

id.

g. *Sigistodon*, Wood - impressum in forme de D. fuscus - modum

actum de S. est le communis et forme de D.

collis transversalis significum comm de la terre et la

Kangaroo, mais plus compressum et plus lunus - la

reppresentant de perchodum et de congruunt.

modum

1. *Sigistodon* australis, Wood - thick de hypogonum Cav.

Cav.

g. *Nototrichium*, Wood - modum modum


modum modum de la terre et la terre et la terre

1. *Nototrichium* inamum, Wood - modum modum

Cav.

2. *Nototrichium* Mitchellii, Wood - modum modum

Cav.



El. planifrons, palis



El. planifrons, much. top.

El. planifrons, much. top.

El. planifrons, much. top.

1700 *membranifera* *micranta*

faune canne & pater. T. pater 7/4 *membranifera*

100
100
100
100
100
100
50

850

membranifera *frontis*

faune & pater 60

faune & pater
on pater

faune pater & pater *membranifera* 60

oile *oile*

oile *oile* 29

oile *oile*

oile *oile* 132

faune des pater & molen

faune des pater & molen *membranifera* 29

faune des pater & molen *membranifera*

faune des pater & molen

faune des pater & molen *membranifera* 31

faune des pater & molen *membranifera*

faune des pater & molen

faune des pater & molen