

SOCIÉTÉ LIBRE
D'ÉMULATION

DE LA

PROVENCE

Marseille, le 17 Novembre 1869.



D

26 B

Cher Monsieur, Partie,

Je reçois vos plantes si j'en ai reçu immédiatement à l'heure pour procéder à leur inscription. J'y retrouve beaucoup de vies très connues et de nouveaux amis que vous me faites connaître : donc j'ai tout à gagner à me donner à vous par politesse votre appeler un bel usage fatigante, puisque, outre mon profit personnel, je trouve le plaisir de vous être agréable en quelques chose.

Pour établir d'ordre dans mes indications j'ai numéroté vos plantes de 1 à V, et marqué par des chiffres arabes vos figures.

Pl. I.

1. *Janira bicostata*, Cogn. Compt. XIII, 3, 4. (2 Plicatula Dugd.)
Type de l'Afrique - Rothmeyeri
2. *Janira dictyota*, Cogn. Compt. XIII, 1, 2. (Type d'Afrique)
- 3-5. *Plicatula Bournei*, Cogn. Compt. XVI, 5, 6. Rothmeyeri
Vos exemplaires ont les côtés moins époussetés que l'indique que j'ai fait figurer ; mais j'ai des lettres qui établissent le prestige pour trouver probablement parmi vos cheveux la P. regalis, qui a des tiges de l'espèce.
Fourni à la même terrine. Pour compte de l'auteur
6. *Plicatula* — L. N. — Je ne sais pas qui l'a publiée, au contraire manière, Vallonius à la P. alpina.
7. *Cardium Hispanum* — Je retrouve rothmeyeri ex Afrique

8. *Cardium* — — section par les ornementa niaill non
perpendiculaire, ni sa forme allongée de la *Hilleman*
c'est pour moi une belle espèce nouvelle à nom
9. *Danira aquicollata*, orb.
10. *Corbic rotundata* (Moule).
11. *Cardium Importae* Cogn. Compt. XI, 8, 9.
12. *Veneres regulus*, Cogn. Compt. VII, 11, 12
- ? 13. *Pholadomya Motti*, Cogn. VI, 6, 7.
Suivante le pellionne spirante, la forme des
bords est très variable. C'est peut-être une
espèce un peu plus épaisse que celles de ces figures, mais
j'en possède deux ou trois tout identiques.
14. *Cardium Pauli*, Cogn. Compt. X, 5, 6.
La figure rapporte une espèce pas la même que
la mième mais je suis certain de l'identité.
(La autre coquille tout nouvelle pour moi)

PROAEGE

Pl. II.

- 1, 2. *Ostrea oltopunctis* Cognard - ou *Ostrea regia*, Cogn.
O. oltopunctis est la *Stygia oltopunctis* de Sharpe
See Rock's Catalogue Natural 1869, XIX, 1, 2
Elle a très voisine de l'*Ostrea regia*; mais comme il y a
différence, dans une Monographie de l'Atlas de la
Côte, j'apprécie les exemplaires de ma collection :
a cette espèce voisine de forme avec l'*Ost. ostrea regia*; s'ou-
vrant par les côtés plus épaiss et surtout par la
calice mediane, alors que pour la valeur superficielle que le
moule presque entièrement bâti, tandis qu'elle est régulière
et excellente dans la partie "
- Ma figure ne ressemble pas le valeur superficielle, mais la 1^{re}
et la 2^e sont la cause de l'*oltopunctis*. Si cette dernière
d'Aristote, d'Espagne de l'ouest de la France. Elle hésite
avec *O. flabellata*. Comparer la valeur superficielle de
tous autres ostreides attitrés.

7. Ostra oviferae Variété — sans doute ancien
4. O — Epi de nouille.
5. N'est rapporté le n° 5. Tous les auteurs indiquent c'est une variété de l'otter Hæmimede (Aristide) et ne parlent pas avoir des stries divergentes sur la valve supérieure; mais l'ouvrage des Otters concurtoises, berthevill, donne cette fig. 6.
- se le rapprocheur que j'italise sans motif suffisant
par elle n'a pas été fait, si faire une epine nouille
6. J'en fais de l'hermine coquard, à bloc, tout en possédant une belle étoile. J'en ai une, depuis la publication de ma Monographie Africaine qui le rapporte à cette figure. D'accord avec (les jeans) la crochet tête.
Je dois faire observer aussi que beaucoup de jeans (et autres) des Ostracites débataillent comme les Hermines; mais il convient également de l'arrêter, pour l'application des espèces, à des étoiles radicalement distinctes de leurs gros exemplaires, justifiant, mieux que mes figures, mon opinion. Tous ces verres point la couleur de l'O. columba. Ce verre peut venir de diverses sources dans l'Ostrea et l'Astarte. C'est là un caractère constant de un ou plusieurs genres qui au contraire Columba devra avoir l'étoile Atlantico-Africaine.

Pl. III

- 1-6. Ostra Africana. Coquard. Monog. des ostracites
de 1869, pl. XXXIX, figs 5-12.

1799. — Emeric Method, 1809, Pl. 5, 6
1801. — Grapheca Africana P. K. Systema, p. 398.
C'est une des 10 figures de la fine Encyclopédie 1809, Pl. 45 et 6.
Elle a été brouillée dans l'Astarte par le botaniste Delfontaine; donc le nom bien justifié d'Africana
que il faut toutefois.

1819. Grapheca leucanda P. K. in L. Vol. t. V, p. 199.
Il renvoie à la même planche de l'Encyclopédie 1809, Pl.
45 et 6. Cela donne le nom d'épines

- 865
- l'anneau qui était à angle sur proues étagées, quand il rédigait les Traitéaux pour vestiges, a peine de voir l'écriture primitive. Il leva donc lui-même au delà du double emploi, et il faut croire en toute la plus ancienne
1849. *Gryphaea secunda*, Pl. Ann. 1. Taf., t. VI, p. 199.
Céphalopode des îles de Colombie, comme d'anciens
Ouest-est.
1848. *G. affinis*, Calcare, Cenox. Sac. Moll. VIII e. Folio 11.
 Bruxelles, p. 18, N° 83 (Madame où je l'ai
 retrouvé moi-même, entre Falerna et Mollian).
1852. *O. cornu-aristis* Cogn. Socie de Constantin, Mem. pl. V,
 fig. 3-4 (voir 1 et 2)
1852. *O. dentata* Cuvier, Prod. See pl. XVIII, fig. 102.
1862. *O. furcatus* Cognacq, Pal. Coqu., XXII, pl. XI, fig. 12.
1864. *O. tartar*, Monogr., Oktz. Cet. Fisch. pl. IV, fig. 2.
1867. *O. Matheroniana* Frans, Nat. Denks. Bericht p. 86.
 voilà la synonymie de cette variété espèce que j'ai
 pu connaître partout
- 7 - 11. Ottor. flabellata
- 12, 13. *O. Delitzi* Cogn. — Variété ott exogyroformis
elle a été trouvée dans l'Amazone par le père
imhojus, c'est une côte assez dans le sud
- 14 - 16. O. cancellata.
- 17-22. *Ottor. Daylei*, Guérin des Ménapiers, Cogn.
 Monogr., pl. XLVI, fig. 8, g.
 Cependant n'a la reticulata, n'a la reticulata.

Pl. IV

1. *Ammonites bisagmum* Nönn.
 De formule ? Elle a été trouvée dans la campagne
 à Lourdes ? de la subdivision de Scl. J'en possède
 l'acquéreuse.