


Res p
XVII 117/2

DE
CONCHOIDIBUS
ET
CISSOIDIBUS
EXERCITATIONES
GEOMETRICÆ.

Autore R. P. PETRO NICOLAS, è Societate JESU.



TOLOSÆ,


Apud J.G. & A. PEKIOS, Comitiorum Fuxenium, Illustrissimi & Reverendissimi Archiepiscopi Albiensis, Collegiique Tolosani PP. Soc. JESU,
Typographos, sub Signo Nominis J E S U. 1697.

Cum Facultate & Approbatione.



Mr. J. VETRO NICOLIS, 5 Southgate Road.

Classifications of Alkaloids



ILLUSTRISSIMO VIRO DOM. DOM.
**GEORGIO MATHIÆ
D'AUTERIVE,
IN SUPREMA TOLOSATUM CURIA
SENATORI INTEGERRIMO**

QUOD mihi dudum in votis fuit, gau-
deo nunc evenire, SENATOR IN-
TEGERRIME, ut publicè profiteri pos-
sim quantum Te colam, quantumque Tibi &
clarissimæ Familiae Tuæ, pro singulari illa qua me sem-
per complexi estis benevolentia obstrictus addictusque
sim. Atque utinam illustre aliquod ac perpetuò dura-
turum possem relinquere observantie meæ, gratique ani-
mi monumentum: Quod in me est, nunc offero exiguum
illud quidem, quod tamen ut spero non ingratum erit. Ma-
thematicas disciplinas non solum amas & magni facis ut
docti omnes, sed apprimè calles, quod perpauci. Quantum
in iis excelleres jam olim adolescens ac penè puer demon-

frasti. Nunquam excidet memoria celeberrimæ illius diei, cùm spectante Senatu Tolosano ceterisque ordinibus civitatis, de universa Matheſi, quod à nemine anteā tentatum fuerat, quærentibus disputantibusque viris eruditis ita respondisti, ut omnes in admirationem raperentur. Ac licet ad alia deinde studia Te contuleris, natus ad omnia, nullumque sit seu politioris literaturæ, seu doctrinæ reconditæ genus quod incredibili quadam ingenii vi, & capacissimæ mentis intelligentia non comprehendenteris, ſaþe tamen teſtatus es inter omnes artes ac disciplinas nulla Te magis quam Geometria delectari, præfertim interiore illa & subtiliori quæ difficillimam curvilineorum dimensionem aggreditur. Non displicebit ergo libellus hic qui totus in ejusmodi argumēto versatur, atque Tibi, V I R C L A R I S S I M E, eò etiam nomine acceptior esse debet, quod illius ſcribendi anſam mihi cauſamque ipſe dedisti. Cùm enim inter nos aliquando, ut ſaþe facimus, de ſublimibus Geometrarum inventis colloqueremur, ac fortè de Conchoide ſermo incidiffet, dixisti præclarum quidem de illius quadratura extare Theorema apud Laloveram noſtrum in Appendix ad libros de Cycloide, verūm quod maximè dolendum erat, demonstrationem omiſſam, eāmque à nemine hactenū exhibitam fuisse, nec mirum, perdifficilem enim eam videri. Hinc mihi primū Conchoidem examinandi mens injecta, Antiquam illam dico de qua Nicomedes librum ſcripſerat, qui temporis injuria periit, & cujus descriptionem habemus apud Eutocium & Pappum. At ecce dum

hanc lineam propius diligentiusque intueor, novus rerum
mihi nascitur ordo, aliae quippe innumerae ac diversi
planè generis & formæ sese obtulere Conchoïdes. Que-
madmodùm enim illa à circulo ortum habet, sic intelligi
potest cuicunque figuræ suam Conchoïdem, nec unam so-
lum sed infinitas respondere. Adverti etiam quod mihi
jucundissimum fuit, eodem propè modo & Diocleam à
circulo & ab omnibus cujuscunque generis Figuris Cis-
soïdes alias procreari, quare maximam esse Conchoïdes
inter Cissoïdesque affinitatem; quod quidem haud scio
an ullus antea observarit, neque dubitavi cùm valde
similis sit utrarumque genesis, inde communi methodo iis-
démque ferè principiis deduci posse cetera quæ circa Fi-
guras Geometræ solent inquirere, ut Tangentes, & Solida
circa basin aut axem, Centra gravitatis, ac demum Qua-
draturam ipsam. Cùm igitur è curas omnes cogitationes-
que convertisset, scripsi de his libros quinque, quibus
non solum ea quæ his Exercitationibus continentur, sed
multò plura comprehendenderam: nam aliis multis harum
Curvarum speciebus insistebam, earumque proprietati-
tes fusè persequebar. Atque hæc omnia cùm dein-
de Tecum communicasset, VIR CLARISSI-
ME, ac Tu pro singulari humanitate Tua exami-
nasses, exinde me ut ea prælo committerem hortari non
desisti. Nempe cùm inter eas lineas quas veteres Geo-
metræ contemplati sunt, nobilissimum locum Conchoïdes
Cissoïdesque teneant, dicebas earum tractatione, ac no-
varum ejusdem generis accessione Geometriam non pa-

rum illustratum iri: præsertim cùm eam partem Recentiores nondum occuparint, nam de sola Nicomedea Lalovera primum, deinde Barrovius, præclare quidem sed breviter & strictim egerunt, de Dioclea VVallisius, Conchoides in universum & Cissoides attigit nemo. At ego licet obsequi voluntati tuae maximè vellem, hæsi tamen aliquandiu, quod in animo esset huicce lucubrationi Curvarum ipsarum dimensionem adjungere, ac superficierum quæ ex iis in orbem ductis efformantur, quod etiam sciebam Te valde desiderare. Verum re attentiū perspectâ, cognovi longioris id esse opera, ac tantæ difficultatis, ut non meum solum, quod sentio quām sit exiguum, sed etiam præstantissimorum Geometrarum in genium & industriam exercere valeat. Si quid igitur hac in parte occurrat deinceps, quod Tibi placere posse intelligam, SENATOR INTEGRIME, ejus Te confestim ut soleo participem faciam. Interim hac quæ nunc offero benignè accipe, & nos ut facis amare perge.



FACULTAS SUPERIORUM SOCIETATIS
JESU & Applicatio Privilegii Regii.

Ego infra scriptus Præpositus Provincialis Societatis JESU in Provincia Tolosana, juxta privilegium concessum à Regibus Christianissimis Henrico III. 10. Maii 1583. Henrico IV. 20. Decembris 1605. Ludovico XIII. 14. Februarii 1612. & Ludovico XIV. 25. Decembris 1650. quo prohibetur omnibus Libratiis & Typographis, nè libros ab ejusdem Societatis hominibus compositos absque permisso Superiorum imprimant; concedo ut Exercitationes Geometricæ Patris Petri Nicolas ex eadem Societate, judicio trium ejusdem Societatis approbatæ à Joanne Guillelmo, & Antonio Pekius Typographis Tolosanis Typis mandentur. Datum Turnone die 12. Augusti 1696.

FRANCISCUS PERRIN.

ERRATA.

Pag. 16. lin. 16. AB. lege AC. pag. 28. lin. 19. AMP lege AMPO. pag. 34. lin.
8. ADI lege ABI. pag. 39. lin. 5. constituta, lege constituti. pag. 45. lin. 5.
data hyperbolæ quadraturæ, delectantur hæc verba. pag. 65. l. 3. ad circulum, lege
ad semicirculum. pag. 68. lin. 30. BFGHZ. lege BFCHZ, pag. 72. lin. 5. sicutque il-
lius centrum A. lege sicutque illius axis transversus AB. pag. 74. lin. 17. lege (fig. 21.)
pag. 88. linea ultima BME, lege BDE. pag. 92. lin. 12. quadruplum. lege quadrupla.
pag. 95. l. 34. AE. lege AF. pag. 96. l. 19. leg. (fig. 6.) pag. 97. lin. 25. EOT. leg.
BEOT. pag. 103. lineis 13. 16. 17. AKM. leg. AKH. pag. 119. lin. 24. SD. lege SO.
pag. 129. l. 7. outem. leg. autem. pag. 133. lin. 4. AH lege AG. pag. 135. FC. l. FG.
pag. 138. l. 8. od. et. Ergo, lege et, dt.



SYNOPSIS

EORUM QUÆ IN HOC OPERE
continentur.

EXERCITATIO PRIMA.

DE CONCHOIDIBUS.

 RÆMissa generatione universali Conchoidum, ex qua sequitur unamquamque lineam sive rectam sive curvam suam Conchoidem habere, immo infinitas, Methodos tradimus generales ad dimensionem omnium Conchoidum cujuscunque generis & naturæ fuerint. Atque has methodos deinde applicamus triplici Conchoidum specieis nimirum Conchoidi antiquæ seu Nicomedæ omnium nobilissimæ, Conchodi Semicirculari & Conchodi cuidam Hyperbolicæ. Hoc est in universum argumentum hujus primæ exercitationis, quam in quatuor partes distribuimus. Prima continet Methodos universales pro dimensione Conchoidum. Secunda est de Conchoide Nicomedæ. Tertia de Conchoide Semicirculari. Quarta de Conchoide Hyperbolica.

PARS PRIMA.

CONTINENS METHODOS GENERALES
Ad dimensionem Conchoidum omnium.

- I. **M**ethodus generalis ad inveniendam dimensionem seu quadraturam Conchoidum. *Proposit.* I. 2. 3.
- II. Methodus ad Dimensionem Rotundorum solidorum ex

A

- Conchoidibus genitorum circa basin revolutis. *Prop. 4. 5.*
 III. Methodus ad Dimensionem Rotundorum ex Conchoi-
 dibus circa axem revolutis. *Prop. 6.*
 IV. Methodus ad invenienda Conchoidum centra gravitatis.
Prop. 7. 8.
 V. Methodus generalis ad inveniendas Tangentes Con-
 choidum. *prop. 9.*

PARS SECUNDA.

DE CONCHOIDE NICOMEDEA.

Quæcumque pertinent ad Conchoidis hujus Quadratu-
 ram, Rotunda, Centra gravit. & Tangentes accuratè trac-
 tantur. Et quoniam de illa etiam nonnulla tradidere clarissimi
 Geometræ Vallisius, Fermatius, Lalovera, Barrovius, eo-
 rum inventa referuntur, atque ex nostris principiis demon-
 strantur.

De Quadratura Conchoidis Nicomedæ.

- I. Ostenditur Conchoidis hujus quadraturam pendere
ex circuli & figuræ Secantium quadratura. *prop. 10.*
 II. Ad inveniendam dimensionem figuræ Secantium, præ-
 mittitur methodus generalis comparandi figuras Cylin-
 dricas sive in superficie Cylindri factas, cum planis. *prop. 11.*
 III. Juxta illam methodum figura Tangentium ostenditur
æqualis segmento Hyperbolico. *prop. 12. 13.*
 IV. Aliæ quædam figuræ Cylindricæ cum planis, & solidæ
 inter se comparantur. *prop. 14. 15. 16. 17.*
 V. Figura Secantium æqualis ostenditur segmento Hyper-
 bolico. *prop. 18. 19.*
 VI. Sector Conchoidis Nicomedæ æqualis est Triangulo †
 sectori circulari † segmento cuidā Hyperbolico. *prop. 20.*
 VII. Figura Conchoidica exhibetur æqualis figuræ Hyper-
 bolico – circulari. *prop. 21.*
 Ex his manifestum est Conchoidis Nicomed. Quadra-
 turam haberi datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ.

- VIII. Dimensio Conchoidis Nicomed. à Lalovera primò inventa & sine demonstratione tradita ad finem libri de Cycloide , demonstratur. *prop. 22.*
- IX. Inventa Clarissimi Viri Isaaci Barrovv de Dimensio-ne Conchoidis & figurarum ei connexarum referuntur atque ex nostris principiis demonstrantur. *prop. 23.*
- V. Doctissimi Viri Vwallisii Theorema de spatio Conchoidis asymptotico infinito aliter demonstratur. *prop. 24.*
- XI. Circulus , Hyperbola, & Conchois Nicomedea figuræ sunt ita inter se connexæ , ut datâ duarum simul quadraturâ , tertia quadretur & vicissim. *prop. 25.*

De Rotundis solidis genitis ex Conchoide tam circa basin quam circa axem revoluta.

- I. Rotundum factum ex segmento Conchoidis Nico-med. circa basin seu Asymp̄totum revoluto reducitur ad sph̄ram, datâ circuli quadraturâ. *prop. 26. 27.*
- II. Rotundum ex spatio asymptotico hujus Conchoidis circa asymptotum reveluto finitum est , eique assignatur Sph̄era æqualis. *prop. 28.*
- III. Rotundum factum ex quolibet Segmento Conchoidis Nicomedæ circa axem revoluto reducitur ad Sph̄ram, datâ Hyperbolæ quadraturâ. *prop. 29. 30. 31.*

De Centro gravitatis Conchoidis Nicomedæ.

- I. Datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ habetur cen-trum gravitatis figuræ compositæ ex duobus Seg-mentis Conchoidicis æqualibus & similibus. *prop. 32.*
- II. Analogia centri gravitatis Segmenti Conchoidici cum centro gravitatis Segmenti circularis. *prop. 33.*
- III. Demonstratur insigne Theorema olim à Lalovera inventum & sine demonstratione traditum circa centrum gravit. Conchoidis. *prop. 34.*
- IV. Cujuslibet Segmenti Conchoidis Nicom. centrum

gravit. habetur ex circuli & Hyperbolæ quadratura
ob hodiis *prop. 35.*

De Tangente Conchoidis Nicomedæ.

Octo novæ constructiones traduntur ad inveniendam Conchoidis Nicom. Tangentem, quibus aliae tres adjunguntur. Una Barrovii, altera Fermatii. Tertia Cartesii atque à nobis aliter demonstrantur.

P A R S T E R T I A.

D E C O N C H O I D E S E M I C I R C U L A R I.

INTER Conchoides quæ ex semicirculo generari possunt, illam illustrandam suscipimus quæ Polum habet in extremo diametri constitutum, basin autem ad diametrum perpendicularē. Quæcunque igitur ad hujus Conchoidis quadraturam, Rotunda, Centrum gravitatis & Tangentem pertinent determinantur juxta methodos generales traditas in prima parte.

I. Sector hujus Conchoidis æquatur Triangulo † Figurae genitrici quæ circularis est † alteri sectori circularei. *prop. 37.*

Vnde quadratura hujus Conchoidis pendet à sola circuli quadratura.

II. Spatum Asymptoticum hujus Conchoidis finitum est & habet ad circulum rationem notam. *prop. 38. 39.*

III. Rotundum tam ex Segmento quolibet hujus Conchoidis quam ex spatio asymptotico circa basin revolutio, reducitur ad Sphæram datâ circuli quadraturâ. *prop. 40. 41.*

IV. Rotundum autem circa axem ex segmento quolibet hujus Conchoidis reducitur ad Sphæram datâ Hyperbolæ quadraturâ. *prop. 46.*

Atque ad hoc probandum, præmittuntur propositiones 4. precedentes 42. 43. 44. 45.

V. Rotundum

- V. Rotundum ex spatio asymptotico hujus Conchoidis circa axem revoluto, infinitum est seu majus quamcumque data Sphæra. *prop. 47.*
- VI. Centrum gravitatis figuræ compositæ ex duobus segmentis similibus & æqualibus hujus Conchoidis habetur ex circuli quadratura. *prop. 48.*
- VII. Sed ad centrum gravitatis segmenti cuiuslibet requiriatur etiam Hyperbolæ quadratura. *prop. 49.*
- VIII. Dari potest absolútè centrum gravitatis duplicitis spatii asymptotici hujus Conchoidis. *prop. 50.*
- IX. Unum autem spatiū asymptoticum seorsim sumptum centrum gravitatis habet infinitè distans ab axe, ac proinde nullum habet. *prop. 51.*
- X. Variæ constructiones ad inveniendam tangentem Conchoidis semicircularis. *prop. 52.*
- XI. Ex iis quæ dicta sunt de Conchoide semicirculari, demonstrantur insignia quatuor Theorematum quæ Lalovera invenit & sine demonstratione reliquit circa novam quamdam figuram. *prop. 53.*
- XII. Alia duo Theorematum circa eamdem figuram. *prop. 54. 55.*

P A R S Q U A R T A.

De Conchoide Hyperbolica.

En Conchoidibus infinitis quæ ex Hyperbolis oriri possunt, assumpsimus unam præ cœteris insignem, quæ generatur ex Hyperbola circulari, Polo in extremo axis transversi posito. Et illi applicamus methodos traditas in prima parte ad dimensionem Conchoidum.

Igitur præmissis nonnullis circuli & Hyperbolæ proprietatibus quæ demonstrantur. *Prop. 56. 57.*

Ostenditur in hac Conchoide Hyperbolica data Hyperbolæ quadraturā haberi sequentia.

I. Ejus quadraturam. *Prop. 58.*

II. Dimensionem Rotundorum circa basin. *Prop. 59. 60.*

- III. Dimensionem Rotundorum circa axem. *Prop. 61. 62.*
 IV. Centrum gravitatis. *Prop. 63.*
 V. Tangentem. *Prop. 94.*
 Deinde Theorematum duo demonstrantur à Lalovera tradita circa figuram quamdam novam Conchoidi nostræ Hyperbolicae valde affinem.



EXERCITATIO SECUNDA.

DE CISSOIDIBUS.

POst traditam Cissoidum generationem, ex qua sequitur unamquamque lineam sive rectam sive curvam suam habere Cissoidem, imo infinitas; dantur methodi generales ad inventiendam earum omnium quadraturam, dimensionē Rotundorum tam circa basin quam circa axem, Centrum denique gravitatis & Tangentes, ut in Conchoidibus factum est, atque ex iisdem principiis. Atque hæ methodi applicantur Cissoidibus semicircularibus, Diocleæ imprimis. Denique perpetua mirabilisque Analogia explicatur quæ inter Conchoïdes Cissoidesque intercedit eodem Polo eadémque basi genitas quas ideo Cognatas appellamus. Hoc est in universū hujus Exercitationis Argumentum. Series autem propositionum est hujusmodi.

De spatiis Cissoidum.

- I. Methodus generalis ad dimensionem Cissoidum. *prop. 1.*
- II. Methodus præcedens applicatur Cissoidibus Semicircularibus. *prop. 2. 3. 4.*
- III. Atque imprimis Diocleæ. *prop. 5.* ejusque accurata dimensione traditur. Theorematibus septem.
Theor. 1. Dimensio sectorum concavorum Diocleæ.
Theor. 2. Dimensio segmentorum convexorum.
Theor. 3. Dimensio spatii integri Diocleæ.
Theor. 4. Dimensio sectorum convexorum.
Theor. 5. Dimensio figuræ contentæ Diocleæ portione & arcu circuli.

Theor. 6. Quadratura absoluta figuræ contentæ tribus arcibus circuli & curva Diocleæ.

Theor. 7. Quadratura absoluta totius spatii contenti arcu semicirculi generatoris, curva infinita Diocleæ ejusque asymptoto.

IV. Dimensio alterius speciei Cissoidis semicircularis. *prop. 6. 7.*

V. Quadratura absoluta spatii integri Cissoidis semicircularis. cuius asymptotus secat in centro diametrum semicirculi generitoris. *prop. 8.*

VI. Analogia Conchoidum & Cissoidum quoad spatia.
Prop. 9. 10.

De Rotundis ex Cissoidibus circa Basin revolutis.

I. Methodus generalis ad Dimensionem Rotundorum ex Cissoidibus circa basin. *prop. 11. 12.*

II. Methodus præcedens applicatur Diocleæ. *prop. 13.* ejusque Rotundorum dimensio circa basin traditur sequentibus Theorematibus.

Theor. 1. Dimensio Rotundi ex spatio integro Diocleæ circa basin seu asymptotum.

Theor. 2. Dimensio Rotundi ex quocunque segmento Diocleæ circa asymptotum.

Theor. 3. Reducitur absolutè ad Sphæram Rotundum ex Diocleæ spatio inter quadrantem peripheriæ, curvam Cissoidis, & asymptotum contento & revoluto circa asymptotum.

Theor. 4. Reducitur etiam ad Sphæram aliud Rotundum ex spatio inter quadrantem circuli & Diocleam contento, ac revoluto circa asymptotum.

III. Analogia Conchoidis & Cissoidis quoad Rotundâ ex spatiis & segmentis circa basin. *prop. 14.*

IV. Analogia corundem Rotundorum cum centro gravitatis figuræ genitricis. *prop. 15.*

De Rotundis ex Cissoidibus circa axem revolutis.

- I. Methodus generalis ad dimensionem Rotundorum ex Cissoidibus circa axem. *prop. 16.*
- II. Methodus præcedens applicatur Diocleæ & ostenditur ejus Rotunda circa axem haberi datâ Hyperbolæ quadraturâ *prop. 17.*
- III. Analogia Conchoidum & Cissoidum quoad Rotunda circa axem. *prop. 18.*
- IV. Præcedens propositio applicatur Diocleæ & Conchoïdi semicirculari ipsi cognatae. *prop. 19.*

De Centro gravitatis Cissoidum.

- I. Methodus generalis ad inveniendum centrum gravitatis in Cissoidibus. *prop. 20.*
- II. Applicatur Diocleæ methodus præcedens & ostenditur ejus segmenti centrum gravitatis haberi datâ circuli & Hyperbolæ quadratura. *prop. 21.*
- III. Centrum gravitatis spatii integri Diocleæ distat ab ejus asymptoto sexta parte axis. *prop. 22.*
- IV. Analogia Conchoidis & Cissoidis quoad centra gravitatis. *prop. 23.*

De Tangentibus Cissoidum.

- I. Methodus generalis ad inveniendam tangentem Cissoidum. *prop. 24.*
- II. Aliæ constructiones generales ad inveniendas tangentes Cissoidum. *prop. 25. 26.*
- III. Variæ constructiones & novæ ad inveniendam tangentem Diocleæ. *prop. 27.*
Unde constructio tradita à clarissimo viro Petro Fermatio demonstratur.
Alia etiam à doctiss. Barrovio tradita & demonstrata nova demonstratione confirmatur.
- IV. Analogia Conchoidum & Cissoidum quoad Tangentes. *prop. 28.*

E X E R.

EXERCITATIO TERTIA.

DE VARIARVM CONCHOIDVM & Cissoidum natura.

Propositum nobis est in hac Exercitatione examinare cuius naturæ sint Conchoides & Cissoides nonnullæ cæteris nobiliores, utpotè genitæ ex lineis rectis vel sectionibus Conicis, vel ipsis Conchoidibus ac Cissoidibus, quásque ideo Triangulares, Parabolicas, Hyperbolicas, Ellipticas, & Conchoidum Conchoides Cissoidumque Cissoides appellare possumus.

De Conchoidibus & Cissoidibus Triangularibus.

- I. Conchoides & Cissoides genitæ ex lineis rectis basi parallelis sunt lineaæ rectæ. *prop. 1. 2.*
- II. Conchoides & Cissoides genitæ ex lineis rectis basi non parallelis sunt Hyperbolæ. *prop. 3. 4.*

De Conchoidibus & Cissoidibus Parabolicis.

- I. Conchoides & Cissoides genitæ ex Parabola, Polo in curva constituto, basi autem assumptâ parallelâ axi, sunt aliæ Parabolæ. *prop. 5. 6.*
- II. Conchoides & Cissoides genitæ ex Parabola, Polo in vertice constituto, basi autem parallelâ axi, sunt etiam aliæ Parabolæ. *prop. 7. 8.*
- III. Conchoides & Cissoides genitæ ex Parabola, Polo in vertice constituto, basi autem ordinatâ ad axem sunt (Conchoides quidem,) curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis Hyperbolæ secundi generis † ordinatis Parabolæ similis genitrici. Cissoides autem sunt curvæ, quarum ordinatæ æquantur ordinatis Hyperbolarum secundi generis — ordinatis Parabolæ similis genitrici *prop. 9. 11.*
- IV. Atque idem convenit Conchoidibus & Cissoidibus genitis.

ex Parabolis secundi generis cujuscunque gradūs fuerint. prop. 10. 12.

- V. Conchoïdes & Cissoides genitæ ex Parabolis secundi generis cujuscunque gradus fuerint, Polo in vertice Parabolæ constituto, basi autem axi parallelâ sunt (Conchoïdes quidem) curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis lineæ quæ vel recta est vel Parabolica alicujus gradus † ordinatis Parabolæ similis genitrici. Cissoides autem sunt curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis lineæ quæ similiter recta est vel Parabolica alicujus gradūs — ordinatis Parabolæ similis genitrici. *Scholio prop. 10. & prop. 12.*

- VI. Conchoïdes & Cissoides genitæ ex Parabolâ Polo in axe constituto, basi autem parallelâ axi, sunt (Conchoïdes quidem) curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis in segmento Hyperbolæ communis † ordinatis Parabolæ similis genitrici.

Cissoides autem sunt curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis in segmento Hyperbolæ communis — ordinatis Parabolæ similis genitrici. *prop. 13. 14.*

De Conchoidibus & Cissoidibus Hyperbolicis.

- I. Conchoïdes & Cissoides genitæ ex Hyperbolâ, Polo in curva constituto, basi autem unâ ex asymptotis, sunt (Conchoïdes quidem) aliæ Hyperbolæ; Cissoides autem sunt lineæ rectæ. *prop. 15. 16.*
- II. Conchois genita ex Hyperbola, Polo in curva constituto, basi autem uni asymptoto parallelâ, in uno casu est linea recta, in aliis omnibus est Hyperbola. *prop. 17.*
- III. Conchoïdes & Cissoides genitæ ex Hyperbola Polo in centro constituto, basi autem parallelâ uni asymptoto sunt, (Conchoïdes quidem), curvæ quarum ordinatæ æquantur ordinatis alterius Hyperbolæ secundi generis † ordinatis Hyperbolæ similis genitrici. Cissoides autem sunt curvæ quarum ordinatæ æquantur ordi-

natis Hyperbolæ alterius secundi generis — ordinatis
Hyperbolæ similis genitrici. *prop. 18. 20.*

IV. Atque idem convenit Conchoidibus & Cissoidibus geni-
tis ex Hyperbolis secundi generis cujuscunque gradus
fuerint. *prop. 19. 21.*

*De Conchoidibus & Cissoidibus ex figuris Homogeneis
quibuscunque.*

I. Homogearum Figurarum Analogia. *prop. 22.*

II Conchoides genitæ ex Figuris Homogeneis sunt etiam fi-
guræ Homogeneæ. *prop. 23.*

III. Cissoides genitæ ex Figuris Homogeneis sunt etiam Ho-
mogeneæ. *prop. 24.*

De Conchoidibus & Cissoidibus Ellipticis.

I. Conchoides Ellipticæ Polum habentes in centro, vel in
extremo axis, basin autem axi perpendicularem, Ho-
mogeneæ sunt Conchodi Nicomedæ & semicirculari.
prop. 25.

II. Cissoides autem Ellipticæ polum habentes in centro vel in
extremo axis, basin verò axi perpendicularem, Ho-
mogeneæ sunt Cissoidibus ex semicirculo genitis co-
dem Polo, eadémque basi. *prop. 26.*

De Conchoidum Conchoidibus & Cissoidum Cissoidibus.

I. Conchoides Conchoidum, eodem Polo eadémque basi
genitæ ac prima Conchois, sunt Conchoides ipsius
figuræ genitricis primæ Conchoidis. *prop. 28.*

II. Cissois Cissoidis est ipsamet linea genitrix primæ Cissoidis.
prop. 29.


III. Chitosan-Collagen hydrogel films for drug delivery system — synthesis
Hydrogels have unique feature of Chitosan due to
IV. Chitosan-Collagen hydrogel films for drug delivery system — synthesis
Chitosan-Hydrogel film

De compositione & utilitate in humanis hominibus.

I. Hippocratis Galenii Antonii Avicennae et al.
II. Compositiones variae ex libris hominibus quae etiam si
hunc hominum, tam et
III. Chirurgice operum ex libro hominibus tractatis Ho-
mologicae, p. 34.

De compositione & utilitate in animalibus.

I. Cognitio de medicina animalium p. 200, ac in
animalium sive, p. 201 animalis subscriptione capitulo, Ho-
mologicae, p. 202, p. 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 617, 618, 619, 619, 620, 621, 622, 623, 623, 624, 625, 626, 627, 627, 628, 629, 629, 630, 631, 632, 633, 633, 634, 635, 635, 636, 637, 637, 638, 639, 639, 640, 641, 641, 642, 643, 643, 644, 645, 645, 646, 647, 647, 648, 649, 649, 650, 651, 651, 652, 653, 653, 654, 655, 655, 656, 657, 657, 658, 659, 659, 660, 661, 661, 662, 663, 663, 664, 665, 665, 666, 667, 667, 668, 669, 669, 670, 671, 671, 672, 673, 673, 674, 675, 675, 676, 677, 677, 678, 679, 679, 680, 681, 681, 682, 683, 683, 684, 685, 685, 686, 687, 687, 688, 689, 689, 690, 691, 691, 692, 693, 693, 694, 695, 695, 696, 697, 697, 698, 699, 699, 700, 701, 701, 702, 703, 703, 704, 705, 705, 706, 707, 707, 708, 709, 709, 710, 711, 711, 712, 713, 713, 714, 715, 715, 716, 717, 717, 718, 719, 719, 720, 721, 721, 722, 723, 723, 724, 725, 725, 726, 727, 727, 728, 729, 729, 730, 731, 731, 732, 733, 733, 734, 735, 735, 736, 737, 737, 738, 739, 739, 740, 741, 741, 742, 743, 743, 744, 745, 745, 746, 747, 747, 748, 749, 749, 750, 751, 751, 752, 753, 753, 754, 755, 755, 756, 757, 757, 758, 759, 759, 760, 761, 761, 762, 763, 763, 764, 765, 765, 766, 767, 767, 768, 769, 769, 770, 771, 771, 772, 773, 773, 774, 775, 775, 776, 777, 777, 778, 779, 779, 780, 781, 781, 782, 783, 783, 784, 785, 785, 786, 787, 787, 788, 789, 789, 790, 791, 791, 792, 793, 793, 794, 795, 795, 796, 797, 797, 798, 799, 799, 800, 801, 801, 802, 803, 803, 804, 805, 805, 806, 807, 807, 808, 809, 809, 810, 811, 811, 812, 813, 813, 814, 815, 815, 816, 817, 817, 818, 819, 819, 820, 821, 821, 822, 823, 823, 824, 825, 825, 826, 827, 827, 828, 829, 829, 830, 831, 831, 832, 833, 833, 834, 835, 835, 836, 837, 837, 838, 839, 839, 840, 841, 841, 842, 843, 843, 844, 845, 845, 846, 847, 847, 848, 849, 849, 850, 851, 851, 852, 853, 853, 854, 855, 855, 856, 857, 857, 858, 859, 859, 860, 861, 861, 862, 863, 863, 864, 865, 865, 866, 867, 867, 868, 869, 869, 870, 871, 871, 872, 873, 873, 874, 875, 875, 876, 877, 877, 878, 879, 879, 880, 881, 881, 882, 883, 883, 884, 885, 885, 886, 887, 887, 888, 889, 889, 890, 891, 891, 892, 893, 893, 894, 895, 895, 896, 897, 897, 898, 899, 899, 900, 901, 901, 902, 903, 903, 904, 905, 905, 906, 907, 907, 908, 909, 909, 910, 911, 911, 912, 913, 913, 914, 915, 915, 916, 917, 917, 918, 919, 919, 920, 921, 921, 922, 923, 923, 924, 925, 925, 926, 927, 927, 928, 929, 929, 930, 931, 931, 932, 933, 933, 934, 935, 935, 936, 937, 937, 938, 939, 939, 940, 941, 941, 942, 943, 943, 944, 945, 945, 946, 947, 947, 948, 949, 949, 950, 951, 951, 952, 953, 953, 954, 955, 955, 956, 957, 957, 958, 959, 959, 960, 961, 961, 962, 963, 963, 964, 965, 965, 966, 967, 967, 968, 969, 969, 970, 971, 971, 972, 973, 973, 974, 975, 975, 976, 977, 977, 978, 979, 979, 980, 981, 981, 982, 983, 983, 984, 985, 985, 986, 987, 987, 988, 989, 989, 990, 991, 991, 992, 993, 993, 994, 995, 995, 996, 997, 997, 998, 999, 999, 1000, 1001, 1001, 1002, 1003, 1003, 1004, 1005, 1005, 1006, 1007, 1007, 1008, 1009, 1009, 1010, 1011, 1011, 1012, 1013, 1013, 1014, 1015, 1015, 1016, 1017, 1017, 1018, 1019, 1019, 1020, 1021, 1021, 1022, 1023, 1023, 1024, 1025, 1025, 1026, 1027, 1027, 1028, 1029, 1029, 1030, 1031, 1031, 1032, 1033, 1033, 1034, 1035, 1035, 1036, 1037, 1037, 1038, 1039, 1039, 1040, 1041, 1041, 1042, 1043, 1043, 1044, 1045, 1045, 1046, 1047, 1047, 1048, 1049, 1049, 1050, 1051, 1051, 1052, 1053, 1053, 1054, 1055, 1055, 1056, 1057, 1057, 1058, 1059, 1059, 1060, 1061, 1061, 1062, 1063, 1063, 1064, 1065, 1065, 1066, 1067, 1067, 1068, 1069, 1069, 1070, 1071, 1071, 1072, 1073, 1073, 1074, 1075, 1075, 1076, 1077, 1077, 1078, 1079, 1079, 1080, 1081, 1081, 1082, 1083, 1083, 1084, 1085, 1085, 1086, 1087, 1087, 1088, 1089, 1089, 1090, 1091, 1091, 1092, 1093, 1093, 1094, 1095, 1095, 1096, 1097, 1097, 1098, 1099, 1099, 1100, 1101, 1101, 1102, 1103, 1103, 1104, 1105, 1105, 1106, 1107, 1107, 1108, 1109, 1109, 1110, 1111, 1111, 1112, 1113, 1113, 1114, 1115, 1115, 1116, 1117, 1117, 1118, 1119, 1119, 1120, 1121, 1121, 1122, 1123, 1123, 1124, 1125, 1125, 1126, 1127, 1127, 1128, 1129, 1129, 1130, 1131, 1131, 1132, 1133, 1133, 1134, 1135, 1135, 1136, 1137, 1137, 1138, 1139, 1139, 1140, 1141, 1141, 1142, 1143, 1143, 1144, 1145, 1145, 1146, 1147, 1147, 1148, 1149, 1149, 1150, 1151, 1151, 1152, 1153, 1153, 1154, 1155, 1155, 1156, 1157, 1157, 1158, 1159, 1159, 1160, 1161, 1161, 1162, 1163, 1163, 1164, 1165, 1165, 1166, 1167, 1167, 1168, 1169, 1169, 1170, 1171, 1171, 1172, 1173, 1173, 1174, 1175, 1175, 1176, 1177, 1177, 1178, 1179, 1179, 1180, 1181, 1181, 1182, 1183, 1183, 1184, 1185, 1185, 1186, 1187, 1187, 1188, 1189, 1189, 1190, 1191, 1191, 1192, 1193, 1193, 1194, 1195, 1195, 1196, 1197, 1197, 1198, 1199, 1199, 1200, 1201, 1201, 1202, 1203, 1203, 1204, 1205, 1205, 1206, 1207, 1207, 1208, 1209, 1209, 1210, 1211, 1211, 1212, 1213, 1213, 1214, 1215, 1215, 1216, 1217, 1217, 1218, 1219, 1219, 1220, 1221, 1221, 1222, 1223, 1223, 1224, 1225, 1225, 1226, 1227, 1227, 1228, 1229, 1229, 1230, 1231, 1231, 1232, 1233, 1233, 1234, 1235, 1235, 1236, 1237, 1237, 1238, 1239, 1239, 1240, 1241, 1241, 1242, 1243, 1243, 1244, 1245, 1245, 1246, 1247, 1247, 1248, 1249, 1249, 1250, 1251, 1251, 1252, 1253, 1253, 1254, 1255, 1255, 1256, 1257, 1257, 1258, 1259, 1259, 1260, 1261, 1261, 1262, 1263, 1263, 1264, 1265, 1265, 1266, 1267, 1267, 1268, 1269, 1269, 1270, 1271, 1271, 1272, 1273, 1273, 1274, 1275, 1275, 1276, 1277, 1277, 1278, 1279, 1279, 1280, 1281, 1281, 1282, 1283, 1283, 1284, 1285, 1285, 1286, 1287, 1287, 1288, 1289, 1289, 1290, 1291, 1291, 1292, 1293, 1293, 1294, 1295, 1295, 1296, 1297, 1297, 1298, 1299, 1299, 1300, 1301, 1301, 1302, 1303, 1303, 1304, 1305, 1305, 1306, 1307, 1307, 1308, 1309, 1309, 1310, 1311, 1311, 1312, 1313, 1313, 1314, 1315, 1315, 1316, 1317, 1317, 1318, 1319, 1319, 1320, 1321, 1321, 1322, 1323, 1323, 1324, 1325, 1325, 1326, 1327, 1327, 1328, 1329, 1329, 1330, 1331, 1331, 1332, 1333, 1333, 1334, 1335, 1335, 1336, 1337, 1337, 1338, 1339, 1339, 1340, 1341, 1341, 1342, 1343, 1343, 1344, 1345, 1345, 1346, 1347, 1347, 1348, 1349, 1349, 1350, 1351, 1351, 1352, 1353, 1353, 1354, 1355, 1355, 1356, 1357, 1357, 1358, 1359, 1359, 1360, 1361, 1361, 1362, 1363, 1363, 1364, 1365, 1365, 1366, 1367, 1367, 1368, 1369, 1369, 1370, 1371, 1371, 1372, 1373, 1373, 1374, 1375, 1375, 1376, 1377, 1377, 1378, 1379, 1379, 1380, 1381, 1381, 1382, 1383, 1383, 1384, 1385, 1385, 1386, 1387, 1387, 1388, 1389, 1389, 1390, 1391, 1391, 1392, 1393, 1393, 1394, 1395, 1395, 1396, 1397, 1397, 1398, 1399, 1399, 1400, 1401, 1401, 1402, 1403, 1403, 1404, 1405, 1405, 1406, 1407, 1407, 1408, 1409, 1409, 1410, 1411, 1411, 1412, 1413, 1413, 1414, 1415, 1415, 1416, 1417, 1417, 1418, 1419, 1419, 1420, 1421, 1421, 1422, 1423, 1423, 1424, 1425, 1425, 1426, 1427, 1427, 1428, 1429, 1429, 1430, 1431, 1431, 1432, 1433, 1433, 1434, 1435, 1435, 1436, 1437, 1437, 1438, 1439, 1439, 1440, 1441, 1441, 1442, 1443, 1443, 1444, 1445, 1445, 1446, 1447, 1447, 1448, 1449, 1449, 1450, 1451, 1451, 1452, 1453, 1453, 1454, 1455, 1455, 1456, 1457, 1457, 1458, 1459, 1459, 1460, 1461, 1461, 1462, 1463, 1463, 1464, 1465, 1465, 1466, 1467, 1467, 1468, 1469, 1469, 1470, 1471, 1471, 1472, 1473, 1473, 1474, 1475, 1475, 1476, 1477, 1477, 1478, 1479, 1479, 1480, 1481, 1481, 1482, 1483, 1483, 1484, 1485, 1485, 1486, 1487, 1487, 1488, 1489, 1489, 1490, 1491, 1491, 1492, 1493, 1493, 1494, 1495, 1495, 1496, 1497, 1497, 1498, 1499, 1499, 1500, 1501, 1501, 1502, 1503, 1503, 1504, 1505, 1505, 1506, 1507, 1507, 1508, 1509, 1509, 1510, 1511, 1511, 1512, 1513, 1513, 1514, 1515, 1515, 1516, 1517, 1517, 1518, 1519, 1519, 1520, 1521, 1521, 1522, 1523, 1523, 1524, 1525, 1525, 1526, 1527, 1527, 1528, 1529, 1529, 1530, 1531, 1531, 1532, 1533, 1533, 1534, 1535, 1535, 1536, 1537, 1537, 1538, 1539, 1539, 1540, 1541, 1541, 1542, 1543, 1543, 1544, 1545, 1545, 1546, 1547, 1547, 1548, 1549, 1549, 1550, 1551, 1551, 1552, 1553, 1553, 1554, 1555, 1555, 1556, 1557, 1557, 1558, 1559, 1559, 1560, 1561, 1561, 1562, 1563, 1563, 1564, 1565, 1565, 1566, 1567, 1567, 1568, 1569, 1569, 1570, 1571, 1571, 1572, 1573, 1573, 1574, 1575, 1575, 1576, 1577, 1577, 1578, 1579, 1579, 1580, 1581, 1581, 1582, 1583, 1583, 1584, 1585, 1585, 1586, 1587, 1587, 1588, 1589, 1589, 1590, 1591, 1591, 1592, 1593, 1593, 1594, 1595, 1595, 1596, 1597, 1597, 1598, 1599, 1599, 1600, 1601, 1601, 1602, 1603, 1603, 1604, 1605, 1605, 1606, 1607, 1607, 1608, 1609, 1609, 1610, 1611, 1611, 1612, 1613, 1613, 1614, 1615, 1615, 1616, 1617, 1617, 1618, 1619, 1619, 1620, 1621, 1621, 1622, 1623, 1623, 1624, 1625, 1625, 1626, 1627, 1627, 1628, 1629, 1629, 1630, 1631, 1631, 1632, 1633, 1633, 1634, 1635, 1635, 1636, 1637, 1637, 1638, 1639, 1639, 1640, 1641, 1641, 1642, 1643, 1643, 1644, 1645, 1645, 1646, 1647, 1647, 1648, 1649, 1649, 1650, 1651, 1651, 1652, 1653, 1653, 1654, 1655, 1655, 1656, 1657, 1657, 1658, 1659, 1659, 1660, 1661, 1661, 1662, 1663, 1663, 1664, 1665, 1665, 1666, 1667, 1667, 1668, 1669, 1669, 1670, 1671, 1671, 1672, 1673, 1673, 1674, 1675, 1675, 1676, 1677, 1677, 1678, 1679, 1679, 1680, 1681, 1681, 1682, 1683, 1683, 1684, 1685, 1685, 1686, 1687, 1687, 1688, 1689, 1689, 1690, 1691, 1691, 1692, 1693, 1693, 1694, 1695, 1695, 1696, 1697, 1697, 1698, 1699, 1699, 1700, 1701, 1701, 1702, 1703, 1703, 1704, 1705, 1705, 1706, 1707, 1707, 1708, 1709, 1709, 1710, 1711, 1711, 1712, 1713, 1713, 1714, 1715, 1715, 1716, 1717, 1717, 1718, 1719, 1719, 1720, 1721, 1721, 1722, 1723, 1723, 1724, 1725, 1725, 1726, 1727, 1727, 1728, 1729, 1729, 1730, 1731, 1731, 1732, 1733, 1733, 1734, 1735, 1735, 1736, 1737, 1737, 1738, 1739, 1739, 1740, 1741, 1741, 1742, 1743, 1743, 1744, 1745, 1745, 1746, 1747, 1747, 1748, 1749, 1749, 1750, 1751, 1751, 1752, 1753, 1753, 1754, 1755, 1755, 1756, 1757, 1757, 1758, 1759, 1759, 1760, 1761, 1761, 1762, 1763, 1763, 1764, 1765, 1765, 1766, 1767, 1767, 1768, 1769, 1769, 1770, 1771, 1771, 1772, 1773, 1773, 1774, 1775, 1775, 1776, 1777, 1777, 1778, 1779, 1779, 1780, 1781, 1781



DE CONCHOIDIBUS

EXERCITATIO GEOMETRICA.


DEFINITIONES.

ESTO (Fig. 1,) Angulus rectus A DX, & quæcunque Figura A BK. Ex punto A ad singula puncta E lineæ BK intelligantur duci rectæ AE quæ occurant in F rectæ DX, & ultra DX. producantur in G, ita ut singulæ FG singulis AE sibi respondentibus sint æquales; sit etiam DC æqualis ipsi AB.

Linea CGG transiens per omnia puncta C, G hoc modo inventa vocetur *Conchois* lineæ BK. Figura etiam aut spatiunt CDXG est *Conchois*, cuius *Polus* A. *Axis* CD. *Basis* DX. *Figura genitrix* ABK.

Hinc patet unamquamque lineam sive rectam sive curvam suam habere Conchoidem, imo ex quacunque linea generari posse infinitas Conchoides, variando nimirum aut Polum aut Basin quod infinitis modis fieri potest.

Constat etiam unamquamque lineam sive rectam sive curvam Conchoidem esse alterius lineæ aut etiam infinitarum. sit v. g. curva CGG, extra quam sumpro ad libitum punto A, & inter A & C G ductâ utrumque rectâ DX, si intelligantur singuli radii AC, AG occurere in D, F, rectâ DX, atque ex punto A sumi AB, AE æquales ipsi DC, FG manifestum est curvam CGG fore Conchoidem lineæ BEK.



PARS PRIMA.

METHODO GENERALES AD
Dimensionem Conchoidum omnium, earum Rotun-
da tam circa basin quam circa axem, Centra gravi-
tatis, & Tangentes.

PROPOSITIO I.

Esto (fig. 2.) sector circuli ABE & alter AFI in eodem angulo A. Intelligatur singulorum radiorum AB, AC, AD, AE, sectoris ABE quadrata applicari in punctis respondentibus F, G, H, I ad arcum FI extensum in lineam rectam.

Dico summam quadratorum AB, AC, AD, AE hoc modo applicatorum ad arcum FI, æquari solidο recto cuius basis est sector ABE, altitudo autem dupla AF radii sectoris AFI.

DEMONSTRATIO.

Quoniam radii AB, AC, AD, AE, æquales sunt, manifestum est ex quadratis illorum applicatis ad arcum FI extensum in lineam rectam (five ad rectam æqualem arcui FI) generari Parallelepipedum cuius altitudo est ipse arcus FI, basis autem quadratum AB. Sive quod idem est, Parallelepipedum cuius altitudo AB, basis autem Rectangulum sub AB & arcu FI. Quoniam verò radii AB, AF sunt inter se ut arcus similes BE, FI, Rectangulum sub AB & arcu FI æquatur Rectangulo sub AF & arcu BE; Ergo solidum genitum ex quadratis AB, AC, AD, AE applicatis ad arcum FI æquatur Parallelepipedo cuius altitudo AB, basis autem Rectangulum sub AF & arcu BE. Sive, quod idem est, Parallelepipedo cuius altitudo AF, basis autem Rectangulum sub AB, BE. Est autem illi Parallelepipedo æquale solidum rectum cuius altitudo dupla AF, basis autem sector ABE dimidium Rectanguli sub AB & arcu BE. Ergo solidum genitum ex quadratis AB, AC, AD, AE applicatis ad arcum FI (hoc est summa quadratorum illorum ad illum arcum applicatorum) æquatur solidο recto cuius altitudo dupla AF, basis autem est sector ABE. Quod erat demonstrandum.

Sive se^ctor ABE major sit se^cto AFI, sive minor, sive etiam ipsi equalis, perinde est, atque demonstratio est eadem.

PROPOSITIO II.

ESTO (fig. 3.) quæcunque Figura ABE contenta duabus rectis AB, AE & linea BE sive recta sive curva. Sit etiam in eodem angulo A se^ctor circuli AFI.

Dico summam quadratorum omnium AB, AC, AD, AE radiorum Figuræ ABE, applicatorum ad arcum FI in punctis F, G, H, I respondentibus, æquari solido recto cuius basis est ipsamet Figura ABE, altitudo autem dupla AF radii se^ctoris AFI.

DEMONSTRATIO.

Intelligatur arcus FI divisus in punctis F, G, H, in quotcumque numero partes æquales: tum radiis AB, AC, AD ductis per illa puncta describantur se^ctores circulares ABL, ACL, ADL.

Summa quadratorum radiorum uniuscujusque se^ctoris ABL, ACL, ADL applicatorum ad arcus FG, GH, HI respondentes, æquatur solido recto cuius basis est unusquisque se^ctor, altitudo dupla radii AF. (prop. 1.) Ergo omnes summæ quadratorum radiorum omnium se^ctorum simul sumptæ æquantur solido recto, cuius basis est composita ex omnibus se^ctoribus ABL, ACL, ADL simul sumptis, altitudo autem dupla AF. Atqui per indefinitam divisionem arcus FI in partes æquales radii omnes se^ctorum simul sumpti abeunt in radios omnes figuræ ABE, ac proinde summæ quadratorum radiorum se^ctorum abeunt in summam quadratorum radiorum figuræ ABE. Aliunde vero summa se^ctorum ABL, ACL, ADL definit etiam in figuram ABE. Ergo summa quadratorum radiorum figuræ ABE applicatorum ad arcum FI æquatur solido recto cuius basis est ipsa figura ABE, altitudo autem dupla AF. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO III.

ESTO (fig. 4.) Conchois BE, cuius Polus A, Figura genitrix ACD, Axis BF, Basis FH qua^cecet in H, h radios Conchoidis AE, Ae. Centro A, radio AF, describatur se^ctor circuli AFI occurrentis in I, i, rectis AE, Ae.

Ex singulis punctis D, d curvæ CD ducantur rectæ DG, dg perpendicularēs ipsis AD, Ad, & occurrentes in G, g rectæ AB. Intelligatur singulas Hypotenusas AG, Ag erigi super arcum FI in punctis I, i respondentibus. Ex illis ita erectis perpendiculariter ad planum AFI, generabitur figura quædam Cylindrica cujus basis erit arcus FI. Hoc posito.

Dico sectorem Conchoidicū ABE æquari Figuræ genitrici ACD † Triangulo AFH † Figuræ Cylindricæ prædictæ genitæ ex hypotenussis AG, Ag, erectis super arcum FI.

DEMONSTRATIO.

Solidum rectum cujus basis sektor Conchoidicus ABE, altitudo dupla AF, æquatur (*prop. 2.*) summæ quadratorum AB, Ae, AE radiorum Conchoidis applicatorum ad arcum FI. hoc est triplici-summa 1. Quadratorum AF, Ab, AH. 2. Quadratorum FB, he, HE five illis æqualium ex natura Conchoidis AC, Ad, AD. 3. Rectangularium AFB, Abe, AHE (five æqualium sub AF, Ae; sub Ab, Ad; sub AH, AD) bis sumptorum, applicando tam Quadrata quam Rectangularia prædicta ad eundem arcum FI.

Atqui Prima summa, Quadratorum AF, Ab, AH applicatorum ad arcum FI æquatur solido recto cujus basis Triangulum AFH, altitudo dupla AF (*prop. 2.*) Similiter secunda summa, Quadratorum AC, Ad, AD applicatorum ad arcum FI æquatur Solido recto cujus basis est figura genitrix ACD, altitudo dupla AF. Tertia denique duplex summa Rectangularium sub AF, AC; sub Ab, Ad; sub AH, AD applicatorum ad arcum FI æquatur solido recto cujus basis est Figura Cylindrica genita ex Hypotenussis AG, Ag erectis supra arcum FI, altitudo autem dupla AF. ut ostendetur Lemmate sequenti.

Ergo solidum rectum cujus basis sektor Conchoidicus ABE, altitudo dupla AF, æquatur tribus solidis rectis quorum bases sunt 1. Triangulum AFH. 2. Figura genitrix ACD. 3. Figura Cylindrica prædicta. Altitudo autem eadem dupla AF. five unico solido recto cujus basis est Triangulum AFH † Figura genitrix ACD † Figura Cylindrica prædicta, altitudo autem eadem dupla AF.

Solida autem recta ejusdem altitudinis sunt ut bases. Ergo sektor Conchoidicus ABE æquatur Triangulo AFH † Figuræ genitrici ACD † Figuræ Cylindricæ prædictæ genitæ ex Hypotenussis AG, Ag erectis super arcum FI. Quod erat demonstrandum.

LEMMA.

LEMMA.

Relicuum est ut ostendamus duplē summam Rectangulorum sub $\angle A F$, AC ; sub $A b$, Ad ; sub $A H$, AD applicatorum ad arcum $F I$ æquari solidō rectō cuius basis æqualis est. Figuræ prædictæ Cylindricæ genitæ ex Hypotenūsis AG , Ag erectis super arcum $F I$, altitudo autem dupla AF .

Hoc autem sic demonstrabitur.

Intelligatur Figuram prædictam Cylindricam genitam ex Hypotenūsis AG , Ag , AC erectis super arcum $F I$ expandi in figuram planam, extenso nimirum arcu $F I$ in lineam rectam. Manifestum est Hypotenūsa AG , Ag , AC perpendiculariter insistentes arcui fore ordinatas illius figuræ planæ in punctis I , i , F . respondentibus, & solidum rectum cuius basis sit illa figura plana, altitudo AF , nihil esse aliud quam summam Rectangulorum sub altitudine AF , & singulis ordinatis AG , Ag , AC . His positis.

Quoniam (*hyp.*) DG perpendicularis est ad AD . Triangula Rectangula ADG , AFH sunt similia, quare AG , AD :: AH , AF . ergo Rectangulum sub AG , AF æquatur Rectangulo sub AH , AD . Similiter ostendetur Rectangulum sub Ag , AF æquari rectangulo sub $A b$, Ad , ergo summa Rectangulorum sub AF , AC ; sub $A b$, Ad ; sub $A H$, AD applicatorum ad arcum $F I$ extensum in lineam rectam, in punctis F , i , I , æquatur summa Rectangulorum sub AF , AC ; sub AF , Ag ; sub AF , AG applicatorum eidem arcui $F I$ in iisdem punctis F , i , I .

Ostensum est autem summam Rectangulorum sub AF , AC , sub $A F$, Ag ; sub AF , AG , æquari solidō rectō cuius basis est figura plana æqualis Cylindricæ genitæ ex Hypotenūsis AG , Ag , AC , altitudo autem AF . Ergo summa Rectangulorum sub AF , AC ; sub $A b$, Ad ; sub $A H$, AD applicatorum ad arcum $F I$ in punctis respondentibus F , i , I æquatur eidem solidō rectō, cuius basis æqualis est figuræ Cylindricæ genitæ ex Hypotenūsis AG , Ag , AC , altitudo vero AF .

Ac proinde duplicando quantitates, duplex summa Rectangulorum sub AF , AC ; sub $A b$, Ad ; sub $A H$, AD applicatorum ad arcum $F I$, æquatur solidō rectō bis sumpto cuius basis est figura Cylindrica prædicta, altitudo autem AF ; sive unico solidō rectō cuius basis est figura Cylindrica prædicta, altitudo autem dupla AF . Quod erat ostendum.

*Methodus generalis ad dimensionem Rotundorum quae
gignuntur ex Conchoidibus circa basin revolutis.*

PROPOSITIO IV.

Esto (fig. 5.) Conchois BE, cuius Polus A, Figura genitrix ACD, Basis FH, Axis BF. super BF descripta sit figura FBN similis similiterque posita genitrici ACD.

Si ex quocunque punto E Conchoidis BE, ducatur ordinata EM quæ occurrat in N, linea BN.

Dico AM esse ad FM ut EM ad MN.

DEMONSTRATIO.

Iungantur AE, FN, atque ex punto E demittatur in FH perpendicularis EK, & ex D in AC perpendicularis DI.

Quoniam EK, AB sunt parallelae, angulus HEK æqualis est angulo DAI, est autem ex natura Conchoidis HE æqualis AD, ergo Triangula rectangula EHK, ADI in omnibus æqualia sunt. Atque ita AI æqualis est EK. Est autem EK æqualis FM in Rectangulo EF, ergo AI, FM æquales sunt. Cum ergo AC, FB sint æquales ex natura Conchoidis, etiam CI, BM æquales sunt. Jam vero quoniam figuræ ACD, FBN æquales & similes sunt similiterque positæ (hyp.) est autem CI, æqualis BM, manifestum est ordinatas ID, MN æquales esse. Cum igitur Triangula rectangula AID, FMN latera AI, FM, & ID, MN inter se æqualia habeant, angulos A, F etiam æquales habent. Ergo AD sive AE parallela est ipsi FN. Atque ita in Triangulis AME, FMN, AM est ad FM ut EM ad MN. Quod erat demonstrandum.

Corollarium I. CI, BM sunt æquales ut constat ex demonstrationis decursu.

Corollarium II. Quadrilaterum FNEH est Parallelogrammum, ostensum est enim FN, HE esse Parallelas; sunt autem & FH, NE etiam parallelæ. ergo, &c.

PROPOSITIO V.

Iisdem positis. Ex Polo A (fig. 5.) ducatur AL parallela FH Basi Conchoidis.

Dico Rotundum genitum ex segmento Conchoidico BME rotato circa Basin FH, æquari Rotundo genito ex figura BMN rotata circa rectam AL.

DEMONSTRATIO.

EX propos. præced. AM, FM :: EM, MN est autem AM ad FM ut circumf. radii AM ad circumf. radii FM. ergo circumf. radii AM est ad circumf. radii FM ut EM ad MN. atque ita Rectangulum sub circumf. radii AM & MN (hoc est superficies cylindrica genita ex MN circa AL rotata) æquatur Rectangulo sub circumf. radii FM, & EM. (hoc est superficie cylindricæ genitæ ex EM circa FN.) Cùm igitur hoc semper eveniat quæcunque ordinata ducatur inter B, M, sequitur ex methodo Indivisibilium, Rotundum ex figura BMN circa AL, æquari Rotundo ex segmento Conchoidico BME circa FH. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Eodem modo ostendetur Rotundum ex figura aut spatio Conchoidico integro FBGK (contento axe BF, Conchoide BE, & basi FK) circa basim suam FK rotato æquari Rotundo genito ex figura FBNP æquali & simili genitrici ACL, circa AL revoluta.

Methodus generalis ad Dimensionem Rotundorum quæ gignuntur ex Conchoidibus circa axem revolutis.

PROPOSITIO VI.

Iisdem positis. (*fig. 5.*) Intelligatur quadratum uniuscujusque AE radii Conchoidis applicari ad axem BF in puncto M respondentem.

Dico si cubetur summa horum quadratorum sic ad axem applicatorum, reduci ad Sphæram Rotundum genitum ex segmento Conchoidico BME circa axem BM rotato.

DEMONSTRATIO.

QUadratum uniuscujusque AE æquatur Quad. AM + Quadr. ME. Ergo summa Quadratorum AE applicatorum in M æquatur summa Quadr. AM + summa Quadr. ME applicatorum in M. Cùm autem rectæ AM applicatae in M sint ordinatae Trianguli, summa Quadratorum earumdem rectarum AM cubatur. Subtracta ergo hac summa ex summa Quadr. AE quæ cubatur etiam (*hyp.*) cubabitur reliqua summa Quadratorum ME & consequenter ad sphæram reducetur summa circulorum ex radiis ME, hoc est Rotundum genitum ex segmento BME circa BM. Quod erat demonstrandum.

Corollarium 1. Quoniam singula quadrata AE, æquantur Quadr.

A H + quadr. HE + Rectang. AH E bis. Si cubetur triplex summa 1. Quadr. AH. 2. Quadr. HE vel AD æqualium. 3. Rectang. AHE bis vel AH, AD æqualium, applicatis tam his Quadratis quām Rectangulis in punctis M, vel I (idem enim est. cū BM, CI æquales sint prop. 4. Coroll. 1.) Habebitur cubatura Rotundi ex segmento BME circa BM.

Corollarium II. Si Rotundum ex figura genitricē CID circa CI reductur ad Sphæram, cubabitur summa quadratorum ID, additāque summā quadratorum AI applicatorum in I quæ etiam cubatur, (cū AI applicatæ in I sint ordinatæ Trianguli) habebitur cubatura summa quadratorum AD applicatorum in I. Quare si habeantur hæc tria. 1. Si Rotundum ex CID circa CI reductur ad sphæram. 2. Si summa Quadratorum AH applicatorum in I cubetur. 3. Si summa Rectangulorum A D applicatorum etiam in I cubetur, Habebitur Rotundum ex segmento Conchoidico BME circa axem BM sive hujusmodi Rotundum reducetur ad sphæram.

Methodus generalis ad invenienda Conchoidum Centrum gravitatis.

PROPOSITIO VII.

Ilsdem positis (fig. 5.) sit recta XZ parallela Basi FH, transiens per centrum gravitatis segmenti Conchoidici BME; & TV eidem FH parallela transiens per centrum gravit. figuræ BMN similis & æqualis genitrici CID.

Dico ut segmentum BME est ad figuram BMN ita esse AT ad FX.

DEMONSTRATIO:

Rotundum ex BME circa FH æquatur Rotundo ex BMN circa AL (prop. 5.) Est autem Rotundo ex BME circa FH æquale solidum rectum cuius basis BME, altitudo circumferentia radii FX (*Tacquet. lib. 5. Cylindric. & Annul.*) & Rotundo ex BMN circa AL æquale est solidum rectum cuius basis BMN, altitudo circumf. radii AT. ergo hujusmodi solida recta æquantur inter se, ac proinde bases habent altitudinibus reciprocas. Quare BME est ad BMN ut reciprocè circumferentia radii AT ad circumf. radii FX sive ut AT ad FX. Quod erat demonstrandum.

Corollarium I. Hinc datâ quadratura figurarum BME, BMN autem

gum

rum inter se ratione ; datâ insuper rectâ TV quæ transeat per centrum gravit. figuræ BMN , habetur recta XZ parallela basi FH , transiens per centrum gravit. Segmenti Conchoidici BME , ac proinde distantia illius centri à basi FH.

Corollarium. 2. Sit ex altera parte segmentum BMO æquale & simile segmento Conchoidico BME. Manifestum est punctum X in quo XZ parallela bâsi FH & transiens per centrum gravit. segmenti BME , secat BM , esse centrum gravitat. totius figuræ BOE. Quare si haberatur 1. Quadratura figurarum BME , BMN aut earum inter se ratio. 2. Recta TV parallela FH transiens per centrum gravit. figuræ BMN , habebitur etiam punctum X centrum grav. figuræ BOE.

Corollarium. 3. Similiter datâ quadraturâ tam Conchoidis integræ BGKF quam figuræ BFP similis generici ACL , aut utriusque proportione , datâ item parallelâ basi FH quæ transeat per centrum gravit. figuræ BFP , habebitur recta parallela basi FK transiens per centrum grav. totius Conchoidis BGKF. 2. Iisdem datis inveniatur centrum grav. figuræ spatiive BORKG.

PROPOSITIO. VIII.

Iisdem positis (fig. 5.) si quadretur Segmentum BME , & simul reducatur ad sphæram Rotundum ex eodem Segmento BME circa BM. Dico haberi rectam Ss parallelam BM quæ transit per centrum gravitatis Segmenti BME.

DEMONSTRATIO.

ESTO quocunque Rectangulum $aebf$, cuius centrum grav. sit d , ex d in ae perpendicularis dc . Rotundum ex segmento BME circa BM est ad Cylindrum ex Rectangulo ab circa ae in ratione composita BME ad Rectang. ab & circumf. radii MS, ad circumf. radii $c d$. (*Tasquet lib 5. Cylind. & Annul.*) Quoniam autem (*hyp.*) reducitur ad sphæram Rotundum ex BME circa BM, ejus Rotundi ad Cylindrum ex ab circa ae ratio nota est. Ergo & ratio composita Segmenti BME ad Rectang. ab , & circumf. radii MS ad circumf. radii $c d$. Cùm ergo segmenti BME quod quadratur (*hyp.*) ad rectangulum ab ratio nota sit, etiam altera ratio nota est nimirum circumferentia radii MS ad circumf. radii $c d$. sive ratio MS ad $c d$. Est autem $c d$ nota. Ergo & MS, ac proinde punctum S , & Ss parallela BM. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. 1. Demonstratio allata perinde probat pro quacunque Figura. Atque ita notandum est Theorema sequens,

Theorema Universale pro Centro gravitatis cuiuscunque Figuræ.

Datâ figurâ BME quæcumque sit quadraturâ, dato item Rotundo ex ea genito circa quamcunque rectam BM. Habetur recta parallela BM transiens per centrum gravitatis figuræ BME.

Corollarium. 2. Conversa quoque vera est, atque statui potest alterum Theorema.

Theorema Universale pro Rotundis ex quacunque Figura genitis.

Datâ quadraturâ Figuræ B M E quæcumque ea sit, datâ item rectâ S s parallela B M quæ transeat per centrum grav. Figuræ B M E, Rotundum ex eadem Figura B M E circa B M reducitur ad sphæram.

Datâ enim quadraturâ Figuræ B M E habetur ejus ratio ad rectangulum ab. Datâ item rectâ S s parallela BM, habetur MS, ergo & ratio MS ad c d notam, sive circumferentia radii MS ad circumf. radii c d. Ex his autem duabus rationibus componitur ratio Rotundi ex BME circa BM ad Cylindrum ex ab circa ae. Ergo Rotundi ad Cylindrum ac proinde ad Sphærām ratio nota est.

*METHODUS GENERALIS AD
inveniendas Tangentes Conchoidum.*

PROPOSITIO. IX.

Esto (fig. 6.) Conchois FM cuius Polus A, Figura generatrix ABC, Basis DE, Axis DF, radius quicunque AI occurrens in G, H, curvæ genitrici BC, & basi DE. Ex punctis G, I sint Tangentes GV, IE, occurrentes in V, E rectis AC, DE perpendicularibus ad AE.
Dico AV, HE :: AG, AI.

DEMONSTRATIO.

Sumpto alio puncto quocunque M in Conchoide jungatur AM quæ occurrat in K, L curvæ genitrici BC & Basi Conchoidis DE. Per I, M, & G, K ducantur secantes IMP, GKO quæ occurrant in P, O re-

estis DE, AV. Præterea per puncta L, M ducantur LN, RS parallelae AI & occurrentes in N, R rectæ IR parallelae DE, & in L, S ipsi DE. Denique jungatur NM, quæ producta occurrat DE in Q. His positis.

I. Lineæ AO, LQ sunt æquales. Nam in Triangulis AGK, LNM duo latera AG, AK duobus LN (sive HI,) LM sunt æqualia ex natura Conchoidis, & anguli A, L illis comprehensi æquales etiam sunt propter parallelas AI, LN (*hyp.*) ergo reliquus angulus AGK reliquo LNM æqualis est. Jam in Triangulis AGO, LNZ cùm latera AG, LN sint æqualia & angulus G angulo N, & angulus GAO, angulo NLQ propter parallelas AG, LN & AO, LQ. Sequitur basin AO basi LQ æqualem esse.

II. Jam Recta LQ est ad SQ ut LN ad SM sive ut HI ad SM, sive ut HP ad SP. Ergo permutando LQ est ad HP ut SQ ad SP.

III. Propter parallelas IR, SP, SQ est ad SP ut RN ad RI, sive ut SL ad SH, sive ut LM ad AM.


IV. Quoniam igitur LQ, HP :: SQ, SP (ut ostensum est num. 2.) & SQ, SP :: LM, AM (ut ostensum est num. 3.) sequitur LQ, HP :: LM, AM. Est autem LQ æqualis AO (ut ostensum est num. 1.) & LM æqualis est AK ex natura Conchoidis. Ergo AO, HP :: AK, AM.

V. Cùm igitur habeatur semper hæc Analogia AO, HP :: AK, AM. quantumvis sumatur punctum M in Conchoide propinquum puncto I. Sequitur abeunte puncto M in punctum I, & consequenter puncto K in punctum G, cùm subsecans AO abeat in subtangentem AV; & subsecans HP in subtangentem HE, & AK in AG, & denique AM in AI, sequitur inquam ex methodo desinentium AO, HE :: AG, AI. Quod erat demonstrandum.

Scholion. Adverte propositionem esse universaliter veram, sive utraque linea, & genitrix BC & Conchois ab ea genita FM sit curva ut exprimitur in figura, sive una illarum curvæ sit altera recta: illud solum notandum rectam lineam sui ipsius quasi Tangentem habendam esse.

Corollarium. Ex hac propositione manifestum est si habeatur tangens lineæ genitricis. Haberi quoque tangentes omnium Conchoidum quæ ab ea efformari possunt.

Sit enim GV tangens genitricis BC in G, si fiat ut AG ad AI ita AV ad aliam HE, jungaturque IE, tanget IE Conchoidem FM in I.



PARS SECUNDA.

DE CONCHOIDE NICOMEDA.

Esto (Fig. 4.) Conchois antiqua & Nicomedea BZ, cuius Polus A, axis BF, Basis sive Regula FX. Ejus proprietas est quod omnes BF, he, HE inter basin & curvam interceptae sint aequales inter se.

Ac proinde si centro A, radio AC aequali ipsi FB describatur quadrans circuli ACK, cum singuli radii Ad, AD aequales sint AC sive FB, sive he, HE, erit Quadrans circuli ACK. Figura genitrix Conchoidis BZ.

Curvam BZ semper accedere ad suam Basin FX, hancque illi esse asymptoton, notum est Geometris, neque in eo demonstrando necesse est immorari.

Propositum est nobis Methodos anteà traditas pro universis Conchoidibus huic speciatim Conchoidi quæ nobilissima est applicare, ejusque Dimensionem, Rotunda tam circa basin, quam circa axem, Centrum denique gravitatis, & Tangentes investigare. Porro Conchoidis nomine semper in hac secunda parte intelligemus Conchoidem Nicomedeam.

De dimensione Conchoidis.

PROPOSITIO X.

Intelligatur (Fig. 4.) singulas secantes AF, A b, AH erigi in punctis C, d, D, respondentibus supra arcum CD, perpendiculariter ad planum circuli ACK. Ex illis ita erectis generabitur figura Cylindrica quæ vocetur figura Secantium.

Dico sectorem Conchoidicum ABE aequalem esse Triangulo AFH + Sectori circulari ACD + Figuræ Secantium praeditæ.

DEMON-

DEMONSTRATIO.

EX singulis punctis, D , d arcus CD ductæ intelligentur DG , dg circulum tangentes, ac proinde perpendiculares radiis AD , $A d$. Occurrantque in G , g rectæ AC . Et centro A radio AF describatur alter arcus circuli FI occurrens in I , i secantibus AH , $A b$.

Ostensum est in prop. 3. Sectorem Conchoidicum ABE æquari Triangulo AFH † Figuræ genitrici ACD † Figuræ Cylindricæ genitæ ex Hypotenuse AG , Ag , AC erectis supra arcum FI in punctis respondentibus I , i , F . Ut igitur ostendatur eundem Sectorem Conchoidicum ABE æquari Triangulo AFH † Sectori circulari ACD † Figuræ secantium genitæ ex secantibus AH , $A b$, AF erectis supra arcum CD , superest solùm probandum Figuram Cylindricam prædictam genitam ex Hypotenuse æqualē esse Figuræ prædictæ Secantium. Hoc autem facile demonstrabimus in hunc modum.

1. Adverte quæcunque ducatur secans $A b$ inter. AC , AD , arcus CD , FI similiter secari in d , i .

2. Triangula $A dg$, $A b F$ Rectangula atque angulum A communem habentia similia sunt, quare $A g$, $A b :: A d$, AF . Ut autem radius $A d$ ad radium AF ita arcus CD ad arcum FI , ergo $A g$ est ad $A b$ ut arcus CD ad arcum FI .

3. Igitur ex methodo indivisibilium summa Hypotenesarum Ag , AG , applicatarum ad arcum FI aut quod idem est erectarum supra arcum FI , est ad summam Secantium $A b$, $A H$ erectarum supra arcum CD , in ratione composita arcum FI , CD , & unius Hypotenusa AG , ad unam Secantem $A H$. Atque haec duæ rationes componunt rationem æqualitatis, cum sit AG ad $A H$ ut arcus CD ad arcum FI ut ostensum est num. 2. Ergo prædictæ duæ summa Hypotenesarum & Secantium, sive quod idem est Figura prædicta Cylindrica genita ex Hypotenuse, & Figura prædicta Secantium, æquales sunt inter se Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc constat ad quadraturam Conchoidis ABE , præter quadraturam Sectoris circularis ACD , habendam esse quadraturam Figuræ Secantium prædictæ. In hac igitur invenienda, quæ non parum difficilis est, sequentes novem propositiones impendemus.

PROPOSITIO X I.

Sint (Fig. 7.) tres Figuræ ABC , ABE , ABF quarum prima ABC sit semisegmentum circuli cuius centrum D . Aliæ verò duæ ABE , ABF sint tales ut quælibet ordinata $B E$, $b f$ sit

ad ordinataim sibi respondentem BF, $b f$, ut BC, $b c$ ordinatae circuli ad radium CD.

Dico summam omnium ordinatarum BE, $b e$ erectarum in punctis C, c, respondentibus, perpendiculariter ad planum ABC, constituere Figuram Cylindricam aequalē Figuræ ABF.

DEMONSTRATIO.

Sit AB divisa in punctis b, in quocunque partes aequales, atque ex punctis C, c, ducantur tangentes CH, $c b$ quae occurant in G, g ordinatis $b c$, $b c$ & in H, b rectæ AB productæ versus A. Compleantur etiam rectangula BI, $b i$ circumscripta figuræ ABF.

Quoniam angulus DCH factus à tangente C H rectus est, Triangula BCD, BCH rectangula similia sunt, quare, BH, CH :: BC, CD. Est autem BH, CH :: $B b$, CG propter parallelas BC, $b G$. Et BC, CD :: BE, BF. Ergo $B b$, CG :: BE, BF. Ergo Rectangulum sub $B b$, BF sive Rectang. BI aequalatur Rectangulo sub BE erecta in C & tangentia CG. Similiter ostendetur Rectangula $b i$, $b i$ aequali Rectangulis sub $b e$, $b e$ erectis in c, c, & tangentibus cg, cg respondentibus.

Atqui per divisionem continuam AB in plures partes, summa Rectangulorum BI, $b i$ definit in figuram ABF; & summa tangentium CG, cg in arcum AC, (ut ostendit Fermatius in Dissert. de Linearum curvarum comparatione cum rectis) ac proinde summa Rectangulorum sub BE, $b e$ & tangentibus CG, cg definit quoque in figuram Cylindricam genitam ex omnibus ordinatis BE, $b e$ erectis supra arcum AC.

Ergo ex methodo inscriptorum & circumscriptorum Figura A BF aequalis est Figuræ Cylindricæ genitæ ex ordinatis BE, $b e$ erectis in C, c supra arcum AC. Quod erat demonstrandum.

Scholion. Hac propositio tradit pulcherrimam utilissimamque methodum cuicunque figura plana assignandi figuram Cylindricam aequalē, & Figurā Cylindrica planam.

PROPOSITIO XII.

IN Quadrante circuli ABC (fig. 8.) sit ducta tangens BD, & secantes Ad, AD quae occurant arcui BC in e, E, punctis, ex quibus ductæ ef, EF perpendicularares ad AB, producantur in h, H, ita ut fh, FH sint aequales secantibus Ad, AD respondentibus. Producatur etiam DB in G ita ut BG aequalis sit AB.

Dico omnia puncta H, b esse ad eamdem Hyperbolam descriptam per punctum G, asymptotis AB, AI rectum angulum continentibus.

DEMONSTRATIO.

Triangula Rectangula ABD, AFE sunt similia, ergo AB, AD :: AF, AE vel AF, AB. Sed AB, AD sunt aequales BG, FH (hyp.) ergo BG, FH :: AF, AB. Quare punctum H est ad Hyperbolam descriptam per G centro A, asymptotis AB, AI per punctum G. Idem ostendetur de punctis b. ergo, &c. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XIII.

Iisdem positis (fig. 8.) Intelligantur omnes Tangentes BD, Bd erigi in punctis E, e respondentibus, perpendiculariter ad planum ABC. Figura Cylindrica quam constituent supra arcum BC vocetur *Figura Tangentium*.

Dico Figuram illam Tangentium aequalem esse Segmento Hyperbolico BFHG.

DEMONSTRATIO.

Tangentibus BD, Bd sumantur in FH, fb aequales FL, fl; Quoniam BD, AD :: FE, AE, sunt autem BD, AD aequales FL, FH (hyp.) erunt FL, FH :: FE, AE. Similiter ostendetur esse fl, fb :: fe, Ae. Igitur (prop. II.) summa ordinatarum FL, fl sive aequalium BD, bd erectarum in punctis E, e constituit figuram Cylindricam aequalem Segmento Hyperbolico BFHG. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XIV.

Iisdem positis (fig. 8.) ex punctis E, e demittantur in AC perpendiculares EM, em. Sitque curva A n N talis ut quaelibet ordinata m n sit quarta proportionalis radio AB, secanti A d, & tangentis B d respondentibus punctis m, e.

Dico Figuram AMN aequalem esse Segmento Hyperbolico BFHG.

DEMONSTRATIO.

Quoniam AB , $A d :: Bd, mn$; est autem AB , $A d :: em$, At propter similitudinem Triangulorum ABd , Aem . Ergo qualibet tangens Bd est ad ordinatam respondentem mn , ut em ordinata circuli ad radium Ae . Quare (*prop. II.*) Figura AMN æquatur Figura Tangentium Bd , BD erectarum super arcum BE ; est autem hæc figura Tangentium æqualis segmento Hyperbolico $BFHG$ (*Prop. 13.*) ergo Figura AMN eidem segmento Hyperb. $BFHG$ æqualis est. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XV.

Ilsdem positis (*fig. 8.*) in BA producta sumatur AO æqualis AB ; sitque curva OpP talis ut ejus quælibet ordinata mp , sit tertia proportionalis radio AB , & secanti $A d$ respondentis. Dico Figuram $AMPO$ æqualem esse Figuræ Secantium AB , $A d$, AD erectarum super arcum BE in punctis B , e , E respondentibus.

DEMONSTRATIO.

Quoniam (*hyp.*) AB radius est ad quilibet secantem $A d$, (hoc est em ad radium Ae) ut secans $A d$ ad ordinatam mp respondentem, Figura AMP (*prop. II.*) æqualis est Figuræ secantium AB , $A d$, AD erectarum super arcum BE in punctis B , e , E . Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XVI.

Ilsdem positis (*fig. 8.*) Dico summam Rectangulorum $Am p$, AMP , æquari solidi recto cuius altitudo AB , basis autem Figura AMN .

DEMONSTRATIO.

Ad hoc solùm ostendendum est quodlibet Rectangulum $Am p$ æquari Rectangulo sub AB , mn . Quod sic probabitur. Ex natura curvæ AN (*prop. 14.*) habemus hanc Analogiam AB , $Ad :: Bd, mn$. & ex natura curvæ OpP (*prop. 15.*) habemus hanc aliam Analogiam AB , $A d :: Ad, mp$. ergo $Bd, mn :: Ad, mp$, & permutando Bd, Ad , aut Am , Ae , aut $A m$, $AB :: mn, mp$. ac proinde Rectangulum $Am p$ æquatur Rectangulo sub AB , mn . Quod erat demonstrandum.

PROPO-

PROPOSITIO XVII.

Iisdem positis (fig. 8.) Per punctum O, asymptotis CA, Cc
angulum rectum continentibus, descripta sit Hyperbola
Or R quæ fecet in r, R rectas mp. M P. Sitque CI diameter
circuli BC.

Dico summam Rectangulorum IAO, Im p, IM P æquari
solido recto cujus altitudo AB, basis segmentum Hyperboli-
cum AM RO.

DEMONSTRATIO.

Ad hoc probandum est solummodo quocunque Rectangulum Imp
æquari Rectangulo sub AB, mr. Id autem sic ostendetur.

Ratio mr, mp componitur ex duabus his.

mr, AO; AO, mp.

Prima autem ratio mr, AO eadem est cum ratione AC, Cm ex
propriate Hyperbolæ Or R.

Secunda verò ratio AO, mp hoc est AB, mp est eadem quæ quadratorum AB. Ad, (cùm tres A B, Ad, mp sint proportionales ex gen-
erat. curvæ OP prop. 15.) & quad. AB ad quadr. Ad est ut quad.
em ad quadr. Ae sive ut Rectangulum Im C (æquale quadrato em) ad
quadratum AC. sive in ratione composita Im AC, & m C, AC. Ergo
cum ratio mr, mp componatur ex duabus 1. mr, AO, 2. AO, mp;
substituendo loco 1. mr A O æqualem AC, Cm. & loco 2. AO, mp,
duas Im AC, m C, AC. ratio mr, mp, composita invenitur ex tribus,

1. AC. Cm.

2. Im. AC.

3. m C. AC.

Prima autem & tertia se mutuo elidunt, quare ratio, mr, mp æqualis
est secundæ Im. AC. Unde Rectangulum sub Im, mp æquatur Rec-
tangulo sub AC aut AB & mr. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XVIII.

Iisdem positis (fig. 8.) sit Am æqualis BF.

Dico Figuram secantium AB, Ad, AD erectarum supra
arcum BE æquari segmento Hyperbolico M R rm.

DEMONSTRATIO.

Quoniam rectæ AB, BG, BF æquales sunt (hyp.) rectis CA,
AO, Am, manifestum est segmentum Hyperbolico BGHE.

simile atque æquale esse segmento Hyperbolico A O r m.

Præterea cùm Rectangulum sub IA , m p sit differentia Rectangulo-
rum sub I m , m p , & sub A m , m p manifestum est summam Rectan-
gulorum sub IA , m p esse differentiam summæ Rectangulorum I m p ,
& Rectangulorum A m p .

Est autem summa Rectangulorum I m p æqualis (prop. 17.) solido
recto cuius altitudo A B , basis Segmentum Hyperbolicum A O R M .

Et summa Rectangulorum A m p æquatur (prop. 16.) solido recto
cuius altitudo A B , basis Figura A M N . Hoc est ipsi æquale (prop. 14.)
segmentum Hyperb. B F H G , aut segmentum A O r m .

Ergo summa Rectangulorum IA , m p sive solidum rectum cuius al-
titudo I A vel A B , basis Figura A O P M est differentia duorum soli-
dorum rectorum , quorum altitudo A B , bases autem segmenta Hy-
perbolica A O R M , A O r m .

Atqui differentia horum Solidorum rectorum ejusdem altitudinis AB ,
est etiam solidum rectum cuius altitudo eadem A B , basis M R r m
differentia basium A O R M , A O r m .

Ergo solidum rectum cuius altitudo A B , basis Figura A O P M .
æquatur solido cuius eadem altitudo A B , basis segmentum Hyperbolici-
cum M R r m .

Unde sequitur Figuram A O P M æquari segmento Hyperbolico
M R r m .

Est autem (prop. 15.) figura A O P M æqualis Figuræ Secantium
A B , A d , A D erectarum super arcum B E . Ergo hæc Figura secan-
tium æquatur Segmento Hyperbolico M R r m . Quod erat demon-
trandum .

PROPOSITIO XIX.

Ilsdem positis (fig. 8.) sumatur in AB recta AV , major aut
minor quam AB , & per V ducatur V X parallela tangentis
B D , occurrensque in x , X secantibus A d , A D . Intelligatur
modo rectas omnes secantes A V , A x , A X erigi super ar-
cum B E in punctis , B , e , E respondentibus , ex iis generabitur
figura nova secantium major aut minor quam quæ ex rec-
tis AB , A d , A D genita est .

In rectâ A O sumatur A Q æqualis AV , & per Q centro
C , asymptotis C I , C e descripta sit Hyperbola Q s S quæ oc-
currat in s , S , rectis m r , M R .

Dico novam hanc figuram secantium genitam ex rectis AV ,

Ax, AX erectis supra arcum BE æqualem esse segmento Hyperbolico M S s m.

DEMONSTRATIO.

Quoniam propter parallelas BD, VX rectæ AV, Ax, AX proportionales sunt rectæ AB, Ad, AD, manifestum est ex methodo inditibilium, Figuram genitam ex secantibus AV, Ax, AX erectis supra arcum BE in punctis B, e, E, esse ad Figuram genitam ex secantibus AB, Ad, AD erectis supra eundem arcum & in iisdem punctis, ut AV, est ad AB.

Præterea in Hyperbola Q, S ordinatæ AQ, ms sunt ut Cm, CA sive ut AO, mr in Hyperbola OR, unde ordinatæ utriusque Hyperbolæ sunt inter se proportionales, ergo segmentum Hyperbolicum MS s m est ad segmentum Hyperbol. M R r m ut MS ad MR. sive ut AQ ad AO vel AV ad AB (cum AQ AV, & AO, AB sint æquales ex hyp.)

Cum igitur ostensum sit etiam ut AV ad AB, ita esse figuram ex secantibus AV, Ax, AX ad figuram ex secantibus, AB, Ad, AD. Figuræ ex secantibus sunt inter se ut segmenta Hyperbolica prædicta, est autem Figura ex secantibus AB, Ad; AD æqualis segmento Hyperbolico M R r m (prop. 18.) ergo Figura ex secantibus AV, Ax, AX est etiam æqualis segmento Hyperbolico M S s m. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XX.

Ilisdem positis (fig. 8.) Esto Conchois TZ cuius Polus A, axis BT, Basis BD, figura genitrix sector circuli ABE.

Dico sectorem Conchoidicum ATZ æquari Triangulo ABD + sectori circulari ABE + segmento Hyperbolico MR rm.

DEMONSTRATIO.

Sector Conchoidicus ATZ æquatur (prop. 10.) Triangulo ABD + sectori circulari ABE, + Figuræ secantium genitæ ex AB, Ad, AD erectis supra arcum BE. Est autem (prop. 18.) prædicta Figura secantium æqualis segmento Hyperbolico M R r m. Ergo sector Conchoidicus ATZ æquatur Triangulo ABD + sectori circulari ABE + segmento Hyperbolico M R r m. Quod erat demonstrandum.

Corollarium I. Subtracto communi Triangulo ABD, figura Con-

choidica BTZD æquatur sectori circulari ABE + segmento Hyperbolico M R r m.

Corollarium II. Sit alia Conchois-tz, cuius Polus A, axis V t, Basis V X, Figura genitrix sector circuli ABE. Ostendetur eodem modo sectorem Conchoidicum A t Z æquari Triangulo AVX + sectori circulari genitori ABE, + segmento Hyperbolico M S s m. Demonstratio est eadem, nisi quod ex prop. 19. supponitur segmentum Hyperb. M S s m æquari Figuræ genitæ ex secantibus AV, Ax, AX erectis supra arcum BE. Sublato item communii Triangulo A V X, Figura Conchoidica V t Z X ostendetur æqualis sectori circulari A B E + segmento Hyperb. M S s m.

Corollarium III. Ex hac propositione & Corollariis præcedentibus constat Conchoidis quadratura pendere à circuli & Hyperbolæ quadratura. Quod etiam ex sequenti propositione apparebit.

PROPOSITIO. XXI.

Sint (fig. 9.) duæ Conchoides DC, DE quarum axis communis DZ, Polus idem A, Figuræ genitrices, duo sectores circuli ABF, ABG, Bases ZX, ZY.

Suppositis duobus arcibus æqualibus BF, BG, ex Polo A ducentur rectæ AFC, AG E occurrentes Conchoidibus in C, E punctis, à quibus demittantur in XY perpendiculares CX, EY, & ex F, G in HI perpendiculares FM, GN completis quadrantibus ABH, ABI.

Jam producatur BA versus L, ut sit AL æqualis AZ distantiæ Poli A à basi XY. Tum centro I, asymptotis IH, Ii angulum rectum continentibus describatur per L Hyperbola OLP quæ occurrat in O, P, rectis FM, GN productis.

Dico Figuram Conchoidicam XCDEY contentam sub perpendicularibus CX, EY, Conchoide CDE & basi XY, æquari Figuræ BFOPG compositæ ex segmento circulari BFMNG, & segmento Hyperbolico MOPN.

DEMONSTRATIO.

EX punto G in AB ductâ perpendiculari GK, ipsi BK sumatur in AI æqualis AQ, & per Q ducatur QR ordinata Hyperbolæ OP. I. Quoniam arcus BF, BG sunt æquales (*hyp.*) & ex F, G demissæ FM, GN perpendiculares in HI, patet rectas HM, IN æquales esse, & HN, IM.

Rursus

Rursus quoniam BK æqualis est AQ (*hyp.*) etiam AK sive GN. æqualis est IQ. Sunt autem ex proprietate circuli tres HN, NG, NI proportionales, ergo illis æquales IM, IQ, IN sunt etiam proportionales, unde segmenta Hyperbolica MORQ, QRPN sunt æqualia ut demonstrat Gregor. à S. Vincentio prop. 109. de Hyperbola.

II. Jam quoniam arcus BF, BG sunt æquales, ac proinde sectores circulares ABF, ABG ex quibus geniti sunt sectores Conchoidici ADC, ADE, manifestum est has Conchoïdes, DC, DE esse æquales & similes, figuræ item Conchoidicas DCXZ, DEYZ. Propter æqualitatem etiam linearum AF, SC Triangula rectangula AFM, SCX sunt æqualia, atque eodem modo Triangula AGN, TEY. His ita probatis.

III. Jam facile demonstrabitur propositio. Nam ex Coroll. I. propos. 20. si AB sit æqualis AZ, & ex Coroll. 2. si AB sit minor vel major quam AZ, Figura Conchoidica DETZ æquatur sectori circulari ABG + segmento Hyperbolico NPRQ, ergo addendo ex una parte Triangulum ETY, & ex altera Triangulum AGN æquale, Figura Conchoidica DEYZ æquatur segmento circulari ABGN + segmento Hyperboleo NPRQ.

Ostensum est autem (*num. I.*) segmentum Hyperbolicum MOPN esse duplum segmenti NPRQ, & manifestum est segmentum circulare FMNG esse duplum segmenti circularis ABGN, ergo tota Figura FBGPO est dupla Figuræ Conchoidicæ DEYZ, ac proinde æqualis Figuræ Conchoidicæ CXYE. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXII.

Dimensio Conchoidis tradita à P. Lalovera demonstratur.

Ilsdem positis (*fig. 9.*) Esto DZ axis Conchoidis DE. Centro Z radio DZ describatur quadrans circuli ZD *b* occurrens in *g* ordinatæ Conchoidis E *q*, & in axe ZD producتو sumatur D *m* æqualis *g q*. Ex puncto D sit D *d* perpendicularis ad DZ & æqualis AZ distantia Poli A à base ZY. Centróque Z, asymptotis ZD, ZX per punctum *d* describatur Hyperbola *r o* ad quam ex *q*, *m* sint ordinatæ *q r*, *m o*.

Dico Segmentum Conchoidis D *q* E æquari Segmento Hyperbolico *m o r q*, aucto Segmento circulari D *q g*, & imminuto Rectangulo sub AZ, *q g*.

Pulcherrimum hoc Theorema tradidit P. Lalovera in Appendice 2. ad.jecta ad lib. de Cycloide num. 8. Quā autem viā illud demonstraret non indicat, existimamus tamen usum ut solebat Libra Archimedea principiū. Cūm igitur illud indemonstratum reliquerit, nos ita facile ex præcedentibus demonstrabimus.

D E M O N S T R A T I O.

I. **Q**uoniam quadrans circuli ZD h æqualis est Conchoidis genitori. **A**DI, atque ex Polo A ducta AGE, & ex G, E perpendiculares GK, E q ad rectam AD, rectæ AK, Z q sunt æquales (prop. 4. Coroll. 1.)

Cūm igitur AQ sit æqualis BK (hyp.) ac proinde IQ ipsi AK, erit IQ æqualis Z q. Est autem & IA æqualis ZD, & AM, ipsi AN sive KG, sive q g, sive D m (hyp.) ac proinde IA + AM hoc est IM æquatur ZD + D m hoc est ipsi Z m. Denique AL, D d æquales eidem AZ (hyp.) sunt etiam æquales inter se.

II. Consideremus modò duo Segmenta Hyperbolica M O R Q, morq; quoniam ad æquales IA, ZD distantias à centris I, Z, ordinatæ AL, D d æquales sunt ut modò probatum est, etiam ad æquales IQ, Z q, & IM, Z m distantias, ordinatæ QR, qr, & MO, mo æquales sunt, & segmentum MORQ segmento morq æquale ac simile est. Ergo cùm segmentum MORQ segmento NPRQ æquale sit (ut ostendimus in prop. 21. num. 1.) etiam segmentum morq eidem segmento NPRQ est æquale.

Est autem (prop. 20. Coroll. 1. 2.) segmentum Hyperb. N P R Q + sector circularis ABG, æquale Figuræ Conchoidicæ DETZ. Ergo segmentum MORQ sive morq illi æquale + sector circularis A B G aut ZDg æqualis, æquantur Figuræ Conchoidicæ D E T Z.

III. Ergo subtracto utrinque cōmuni sectore circulari ZDg, segmentum Hyperb. morq, æquatur Figuræ Conch. DEg + Parallelogrammo ETZg (ostensum est enim in prop. 4. coroll. 2. quadrilaterum ETZg esse parallelogramnum) Cūm autem in eadem prop. 4. sit ostensum esse AZ, Z q :: Eg, g q, Rectangulum sub AZ, g q æquatur Rectangulo sub Z q, Eg sive parallelogrammo ETZg. Ergo segmentum Hyperb. morq æquatur Figuræ Conchoidicæ D E g + Rectangulo sub AZ, g q. & auferendo utrinque Rectangulum illud sub AZ, g q, segmentum Hyperb. morq — Rectangulum sub AZ, g q æquatur Figuræ Conchoidicæ DEg. Denique addendo utrinque semisegmentum circulare Dgg, Segmentum Hyperb. morq — Rectang. sub AZ, g q + semisegmentum circulare D g q æquantur Figuræ Conchoidicæ D E g. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO. XXIII.

In qua juxta nostra principia demonstrantur ea quæ D.

Barrovv tradidit circa dimensionem Conchoidis,

& Figuras ei connexas.

D. Isaacus Barrovv summi ingenii vir & de Geometria optimè meritus in Lectionibus Geometricis pag. 110. & sequentibus, Appendicula I. Figuras Tangentium, & Secantium, de quib[us] in hac secunda parte nos egimus examinavit, quod quidem haud scio an antè illum ullus fecisset, & Conchoidis dimensionem ex iis etiam deduxit, quemadmodum nos. Sed diverso planè modo diversissime demonstrata sunt h[ic] referre, & quām egregiè cum nostris cohærent ostendere.

Theor. I.

Summa Secantium AD (*fig. 8.*) ad arcum BE pertinens & ad axem BF applicatarum, æquatur segmento Hyperbolico BGHF. *Barrovv. num. 1.*

Hoc facile est, & demonstratum à nobis prop. 12.

Theor. II.

Summa Tangentium BD (*Fig. 8.*) ad arcum BE pertinens & applicatarum ad rectam æqualem arcui BE æquatur spatio Hyperbolico BGHF, *Barrovv. num. 2.*

Demonstratum est antè *prop. 13.* ubi ostendimus Figuram Cylindricam Tangentium sive genitam ex Tangentibus BD supra arcum BE erectis æquari segmento Hyperbolico BGHF. Manifestum est enim illam Figuram Cylindricam, si arcus BE extendatur in lineam rectam, æqualem esse summæ Tangentium applicatarum ad rectam æqualem arcui BE, imo eadem est Figura modò convoluta, modò expansa.

Theor. III.

Summa secantium AD arcū BE ad basin AM applicatarum, æquatur duplo sectoris ABE. *Barrovv. num. 3.*

Id quidem non demonstravimus, quoniam eo nihil nobis opus erat ad dimensionem Conchoidis quæ nobis proposita erat, sed facile demonstrari potest ex universali principio tradito in prop. II. Cùm enim ordinata circuli EM sit perpetuò ad radius AE, ut radius AB ad secantem AD. Manifestum est ex prop. II. Figuram Cylindricam genitam ex radio AB supra singula arcus BE puncta erecto, (hoc est duplum sectoris ABE) æquari figuræ genitæ ex secantibus AD ad rectam AM in punctis M respondentibus B, applicatis.

Theorema IV.

SUMMA Tangentium BD ad arcum BE pertinentium & ad basin AM applicatarum æquatur semissi quadrati subtensem BE. *Barrov. num. 4.*

Hoc etiam cùm noui indigeremus non demonstravimus, demonstrari verò potest ex prop. II. in hunc modum. Cùm sit perpetuò ordinata circuli EM ad radius AB sive AE, ut AM ad Tangentem BD, patet ex prop. II. summam Tangentium BD applicatarum in M punctis respondentibus æquari Figuræ Cylindricæ genitæ ex omnibus AM sive sinibus FE erectis in E supra arcum BE. Rursus ex eadem prop. II. manifestum est Figuram sinuum genitam ex omnibus sinibus FE erectis in E supra arcum BE æquari Summæ radiorum AE applicatorum ad rectam BF (eo quod sit FE, ad radius AE, ut FE ad radius AE.) hoc est Rectangulo sub radio AB & BF, sive dimidio rectanguli sub tota diametro BO & BF, sive dimidio quadrati subtensem BE.

Ergo summa Tangentium BD applicatarum in M ad rectam AM æquatur semissi quadrati subtensem BE. Quod orat ostendendum.

Theorema V.

ACCEPTA AY æquali AM (*Fig. 8.*) & ex Y ducta ad AY perpendiculari Yy quæ occurrat in y Hyperbolæ RO descriptæ centro C asymptotis CI, Cc angulum rectum continentibus per O, (positâ AO æquali AB) solidum rectum seu ut vocat Barrovius Cylindricum cuius altitudo radius AB, basis segmentum Hyperbolicum MRyY duplum est summæ quadratorum secantium AD applicatorum ad basin AM in punctis M respondentibus. *Barrov. num. 5.*

Idem nos sic demonstrabimus. Sit curva OP ut descripta est in prop. I⁵, talis nimirum ut quælibet ordinata MP sit tertia proportionalis ad radius

radium AB & secantem AD respondentem. Erit igitur summa quadratorum secantium AD applicatorum in M æqualis solido recto cuius altitudo AB, basis autem Figura AOPM. Sive illi æqualis (*prop. 15.*) Figura secantium AD erectarum super arcum BE, sive Figuræ illi secantium æquale (*prop. 18.*) segmentum Hyperbolicum M R r m. Est autem segmenti Hyperbolici M R r m duplum segmentum Hyperb. M R y Y ut ostensum in propos. 21. num. 1. ergo solidum rectum cuius altitudo AB, basis segmentum Hyperbolicum M R y Y est duplum summæ quadratorum secantium AD applicatorum ad rectam AM. Quod erat ostendendum.

Theorema V I.

SPatium Hyperbolicum M R y Y (*fig. 8.*) duplum est figuræ secantium AD erectarum super arcum BE. *Barrov v. num. 6.*

Hoc ingeniosè deduxit Barrovius ex præcedenti, nos alia via pro gressi demonstravimus. In propos. enim 18. Ostendimus Figuram secantium æquari segmento seu spatio Hyperbolico M R r m, & prop. 21. num. 1. Segmentum Hyperbolicum M R y Y esse duplum segmenti M R r m. unde patet segmentum M R y Y duplum esse Figuræ secantium super arcu BE erectarum.

Theorema V I I.

SUmma Quadratorum omnium secantium AD applicatorum ad arcum BE in rectam lineam extensem æquatur Parallelepipedo cuius basis Rectangulum BAM, altitudo maxima secans A D. *Barrov v. num. 7.*

Hujus propositionis demonstrationem omisit Barrovius quam habebat quoniam inquit *alind schema discursumque pra reliquis plerisque longiusculum exposcit, neque rem tamii video.* Nos eam breviter & facilem modo demonstrabimus.

Summa quadratorum secantium AD (quæ radii sunt Trianguli ABD) applicatorum ad arcum BE, æquatur (*propof. 2.*) solido recto cuius basis ipsum Triangulum ABD, altitudo verò dupla ipsius AB. hoc est Parallelepipedo cuius basis est rectangulum sub AB, BD, altitudo verò AB. Reliquum est igitur ut ostendamus tale parallelepipedo æquari parallelepipedo cuius basis Rectangulum sub AB, AM, altitudo AD. sive horum bases esse cum altitudinibus reciprocas; hoc autem manifestum est. Nam Rectangulum sub AB, BD est ad Rectangulum sub AB, AM, ut BD ad AM, hoc est ut AD ad AE (in triangulis similibus ABD, AEM) hoc est ut AD ad AB.

Theorema VIII.

Esto (fig. 8.) curva Bb talis ut singulæ ordinatæ Fb ad a . Exem AB sint æquales Tangentibus B D respondentibus. occurratque in b rectæ FE , atque ex b in AC demittatur perpendicularis b a . Figura $ABba$ est dimidium segmenti Hyperbolici MRY . *Barrovv. num. 8.*

Hoc sic demonstrabimus ex nostris principiis.

I. Sumptâ AO æquali AB , Polo O , axe AB , basi Aa , intelligatur descripta Conchois BK quæ occurrat in K rectæ FE . Jungaturque OK quæ erit parallela ipsi AE , (*prop. 4.*) & secabit basin in puncto a , cùm propter similitudinem Triangulorum OAA , ABD , & latera OA , AB æqualia, bases Aa , BD , sive (*hyp.*) Aa , Fb , sint æquales. Parallelogrammum igitur $AEKa$ Rectangulo $AFba$ æquatur, cùm sit utriusque eadem basis Aa .

II. Rursùs quoniam ex proprietate Conchoidis, OA , $AF :: EK$, FE ; permutoando OA , $EK :: AF$, $FE :: AB$, BD . unde cùm OA , AB æquentur, etiam EK , BD æquales sunt, ergo Fb æqualis BD , (*byp.*) æquatur etiam ipsi EK . Cùm ergo hoc eveniat quæcunque sit ordinata FE . Figura BFb æquatur Figuræ BEK .

Est autem ut diximus Rectangulum $AFba$ etiam æquale Parallelogrammo $AEKa$, ergo Figura BFb + Rectangulum $AFba$ sive tota Figura $ABba$ æquatur Figuræ BEK + Parallelogrammo $AEKa$.

III. Demonstratum est autem in prop. 22. num. 3. Figuram BEK arcu circuli & Conchoide ordinatâque comprehensam, unâ cum Parallelogrammo $AEKa$ æquari segmento Hyperbolico MRY , quod dimidium est segmenti MRY (ut ibidem ostensum est num. 2.) ergo Figura $ABba$ segmenti Hyperbolici MRY , dimidium est. *Quod erat ostendendum.*

Theorema IX.

Iisdem positis, centro A , axe BO , describatur Hyperbola æquilatera O_7 , cuius asymptoti A_3 , A_4 , & quæ occurrat in puncto 7 rectæ b a productæ.

Dico Figuram $ABba$, sive Figuram BFb (quæ summa est Tangentium BD applicatarum ad BF) + Rectang. $AFba$ duplam esse sectoris Hyperb., AO_7 , (junctâ rectâ A_7) *Barrovv. n. 10.*

Pulcherrimum hoc Theorema ingeniosissimè demonstravit Barrovius, & quod magni fieri debet independenter à Figuris Tangentium & secantium, unde novam invenit viam ad dimensionem Conchoidis. Nescio

an viderit illud sine novis principiis, ex præmissis deduci posse. Nos demonstrabimus suppositis Lemmatibus sequentibus ad hoc necessariis.

L E M M A I.

Sint (fig. 10.) duæ Hyperbolæ DE, OP descriptæ eodem centro A, iisdemque asymptotis AL, AM, Sintque carum semiaxes AF, AG, in eadem recta linea constituti.

Sint jam duæ rectæ CD, BE parallelæ asymptoto AM, occurrentes Hyperbolis in D, E, & O, P.

Dico segmenta BCDE, BCOP esse inter se ut quadrata semiaxi AF, AG.

D E M O N S T R A T I O.

EX F, G verticibus Hyperbolarum ducantur FH, GI parallelæ eidem asymptoto AM, occurrâtque PH, Hyperbolæ OP in K. Manifestum est segmenta Hyperbolica BCDE, BCOP esse inter se ut FH, ad KH. Est euim FH, CD :: AC, AH :: HK, CO. Ergo permutando FH, HK :: CD, CO. & ita ostendetur omnes alias ordinatas BE, BP, &c. Segmentorum BCDE, BCOP esse inter se ut FH, HK unde ex methodo indivisibilium segmentum BCDE est ad segmentum BCOP ut FH ad HK.

Jam FH ad HK est in ratione composita FH, GI, (hoc est AH, AI in Triangulo AFH) & GI, HK (hoc est rursum AH, AI ex proprietate Hyperbolæ) ergo FH est ad HK ut quadratum AH ad quadratum AI sive ut quadratum AF ad quadratum AG.

Ostendimus autem segmentum BCDE esse ad segmentum BCOP ut FH ad HK, ergo segmentum BCDE est ad segmentum BCOP ut quadratum AF ad quadratum AG. Quod erat demonstrandum.

L E M M A I I.

Ilsdem positis (fig. 10.) sit alia Hyperbola æquilatera op, descripta centro a, asymptotis as, ax, cuius semiaxis sit ag, sintque in asymptoto as abscissæ ar, as proportionales abscissis AB, AC. & ex r, s, ducantur, rt, su parallelæ asymptoto ax.

Dico segmentum BCDE esse ad segmentum rs ut quadratum semiaxis AF ad quadratum semiaxis ag.

DEMONSTRATIO.

Sumptā in AF rectā AG æquali ag, per G, centro A, asymptotis SAL, AM Hyperbolæ DE describatur Hyperbola O P, occurrentis CD, BE in O, P, & rectis AB, AC sumantur in as æquales ab, ac. & ex punctis b, c ducantur ordinatæ bp, co.

Quoniam Hyperbolæ OP, op sunt æquilateræ (*hyp.*) & semiaxes AG, ag habent æquales, atque sumptæ sunt abscissæ AB, AC. æquales abscissæ ab, ac, manifestum est segmenta BCOP, bc op esse similia & æqualia. Est autem ex præced. Lemmate segmentum BCDE ad segmentum BCOP ut quadratum AF ad quadr. AG, ergo idem segmentum BCDE est ad segmentum bc op ut quadr. AF ad quadr. AG Cùm autem sit (*hyp.*) ab ad ac ut BA AC sive ar ad as, segmenta bc op, rsut sunt æqualia (*Greg. à S. Vincent. de Hyperbola prop. 112.*) ergo segmentum BCDE est ad segmentum rsut ut quadr. AF ad quadr. AG, sive quoniam AG, ag sunt æquales (*Hyp.*) ut quadratum semi- axis AF ad quadr. semiaxis ag. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Idem probaretur tum in hoc Lemmate, tum in primo, quamvis Hyperbolæ non essent æquilateræ, dummodo anguli asymptotici A, a, essent æquales.

His duobus Lemmatibus suppositis ueniamus modo ad demonstrationem Theorematis IX anteâ propositi.

Demonstratur Theorema IX. præcedens.

Ostendendum est Figuram ABba esse duplam Sectoris Hyperbolici AO7. (fig. 8.)

Ex punctis O, 7, ducantur rectæ O'3, 7 2 parallelae asymptoto A4 & occurrentes alteri asymptoto A3 in 3, 2. recta vero 7 2 occurrat A0 in punto 5. Præterea ex punto 7, ducatur recta 4 9 parallela asymptoto A3 & occurrens rectæ A0 in 9. ducatur etiam in Hyperbola O7, ordinata 7 8. His positis.

I. Sector Hyperbolicus AO7 æquatur segmento Hyperbolico 23O7. Nam ex proprietate Hyperbolæ O7 abscissæ A2, A3 sunt ut reciprocè ordinatæ 3 O, 2 7. Quare Triangulum A3O æquatur Triangulo A27. unde sublato communi Triangulo A25 & addito Trilineo O57, sector Hyperbolicus AO7 æquatur segmento 23O7. Hinc sequitur ostendendum esse Figuram ABba esse duplam segmenti 22O7.

II. Figura ABba dimidia est segmenti Hyperbolici MRYY ut ostensum est Theor. VIII. præcedenti. Est autem segmentum MRY duplum segmenti M R r m ut ibidem dictum est in demonstratione, ergo figura ABba est æqualis segmento M R r m. Ostendendum igitur restat segmentum M R r m esse duplum segmenti 23O7.

III. Quoniam (*hyp.*) AO est æqualis AB sive AC , in Triangulo Rectangulo ACO , quadratum CO duplum est quadrati AO . Est autem CO (*hyp.*) semiaxis Hyperbolæ OR , & AO semiaxis Hyperbolæ O_7 . Quare si ostenderimus abscissas CM , Cm esse inter se ut abscissas A_2 , A_3 , cum segmenta Hyperbolica hoc posito sint (*Lemm. 2. præc.*) ut quadrata semiaxiū CO , AO , sequetur segmentum $M R rm$ duplum esse segmentū $2 3 O_7$. Quare superest tantum ostendendum abscissas CM , Cm , esse ut abscissas A_2 , A_3 . Hoc autem demonstrabimus ostendendo tam CM , Cm , quām A_2 , A_3 , esse ut AO ad A_9 .

IV. Ac primò ostendamus CM , Cm esse ut AO ad A_9 . Adverte cùm Hyperbola O_7 sit æquilatera (*hyp.*) angulisque $3 A_4$ idcirco rectus, ejus dimidium $3 A_9$ sive alternum $8 9$ esse semirectum, ac proinde in Triangulo rectangulo $7 8 9$, latera $7 8$, $8 9$ sunt æqualia. Deinde quoniam (*hyp.*) A_m sumpta est æqualis BF , Cm æquatur AF sive ME , unde CM est ad Cm ut CM ad ME , sive ut ME ad ML . [si **C I** sit diameter circuli CB .] Sive ut ME ad AC . $\dagger AM$. Est autem ME ad AC sive AE , ut AB ad AD sive O_a sive a_7 (æqualem O_a ex proprietate Hyperbolæ æquilateræ O_7) sive A_8 . Et eadem ME est ad AM ut AB ad BD , sive 8_7 , sive 8_9 . Cùm ergo ME sit ad AC ut AB ad A_8 , & ME ad AM ut AB ad 8_9 , sequitur ME esse ad $AC \dagger AM$ (hoc est CM ad Cm ut dictum est) sicut AB ad $A_8 \dagger 8_9$, hoc est AB sive AO ad A_9 .

V. Ostendamus modò quod reliquum est etiam abscissas A_2 , A_3 esse inter se ut AO , A_9 . Hoc autem est facile. Nam ex proprietate Hyperbolæ O_7 cuius asymptoti sunt A_3 , A_4 . A_2 est ad A_3 ut reciprocè $3 O_7$ sive illi æqualem A_4 . Ut autem $3 O_7$ ad A_4 ita AO ad A_9 in Triangulis similibus $A_3 O_7$, $A_4 O_9$. Ergo A_2 , A_3 :: AO , A_9 . Quod erat demonstrandum.

Theorema X.

Figura BFb genita ex tangentibus BD applicatis ad BF æquatur Figuræ BEK contentæ arcu circuli BE & Conchoide BK descriptæ Polo O , (sumptis A_B , AO æqualibus) basi A_4 , axe AB .

Unde spatiorum ejusmodi Conchoidalium dimensiones inveniuntur. *Barrov. num. II. 12.*

Figuram BFb æquari Figuræ BEK antē ostendimus Theor. VIII. num. 2. eadēque via quā Barrovius quæ statim sese offert, nempe quoniam singulæ ordinatæ Fb , EK eidem tangentī BD atque adeò inter se sunt æquales.

Hinc autem sequi dimensionem spatiorum Conchoidalium manifestum est; Cùm sit demonstratum Figuram $BFB \dagger Rectang. AFba$ esse dimidium segmenti Hyperbolici $MRyY$: (Theor. 8.) aut etiam duplum sectoris Hyperbolici $AO7$.

Hactenus p̄æclara Doctissimi Barrovii inventa circa Conchoidum dimensionem, Figurásque ei connexas Secantium ac Tangentium, atque ea cùm nostra methodo egregiè cohærere demonstravimus. Nunc ad alia progrediamur.

PROPOSITIO XXIV.

Locus Conchoidicus infinitus est, sive spatiū sub Conchoide DE (fig. 9.) ejusque asymptoto ZY in infinitum productis majus est quacunque figura data.

Vallisius hoc ingeniosè demonstravit Mechan. part. 2. prop. 30. sed facilius rem absolvisset, si segmentorum Conchoidicorum dimensionem notam habuisset. Ex multis autem modis qui se offerunt ad hoc demonstrandum, sequentem eligimus ut breviores.

DEMONSTRATIO.

Ostensum est in propos. 21. Figuram Conchoidicam $CXYE$ æquari segmento circulare $BFMNG \dagger$ segmento Hyperbolico $MOPN$. Per accessum autem continuum punctorum F, G, H, I , Figura Conchoidica $CXYE$ abit in spatiū contentum sub Conchoide duplici DC, DE & basi XY in infinitum productis.

Ex altera autem parte, segmentum circulare $BFMNG$ abit in semi-circulum HBI , & segmentum Hyperbolicum $MOPN$ in locum Hyperbolicum comprehensum ordinata Hb , abscissa HI , asymptoto infinita Ii , & curva Hyperbolica bP pariter infinita versus P .

Cùm igitur locus ille Hyperbolicus infinitus sit quoad areā seu major quacunque figura data, ut satis Geometris notum est, sequitur spatiū Conchoidicum inter Conchoidem duplicem & asymptotos contentum cùm æquetur semicirculo & loco illi Hyperbolico, infinitum esse quoad aream, ergo & dimidium contentum sub DZ axe, & curva DE , atque asymptoto ZY in infinitum productis, infinitum etiam est. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXV.

Circulus, Hyperbola, & Conchois eam inter se connexionem habent, ut si earum una quadretur, aliæ duæ simul sumptæ quadrentur & vicissim.

DEMONSTRATIO.

HOc ex præcedentibus satis manifestum est. Paulò tamen aliter & clarissimè id demonstremus. Ex puncto D (fig. 9.) fit DV. tangens Conchoidem DE in D, & occurrentis radio Conchoidis AE in V.

Figura Conchoidica ZDET æquatur (prop. 20. Coroll. 1. 2.) Sectori circuli ABG + segmento Hyperbolico NPRQ ergo addendo utrinque Figuram Conchoidicam DEV, trapezium DZTV æquatur sectori circuli ABG + segmento Hyperbolico NPRQ + Figuræ Conchoidicæ DEV. Quare si trium harum figurarum quadretur una, quadrabuntur aliæ duæ simul sumptæ, & si quadrantur duæ quadrabitur tertia. Quod erat demonstrandum.

Dimensio Solidorum Rotundorum ex Conchoide genitorum circa Basin.

PROPOSITIO. XXVI.

Lemma ad sequentem.

Esto (fig. 5.) quadrans circuli BFP, ejusque segmentum BMN, & radius BF productus in A, denique per A, AL parallela FP.

Dico datâ circuli quadraturâ haberi seu reduci ad Sphæram Rotundum genitum ex segmento BMN circa AL revoluto.

DEMONSTRATIO.

EX N demittatur in FP perpendicularis NY. Ex Archim. reducitur ad sphæram tam Rotundum ex segmento FBNY circa FY, quam Cylinder ex Rectangulo FN circa eamdem FY. Ergo & Rotundum ex segmento BMN circa eamdem FY. Jam datâ circuli quadraturâ, quadratur sector FBN, ergo & segmentum BMN. Quoniam igitur datâ circuli quadraturâ reducitur ad sphæram Rotundum ex BMN circa FP, & BMN segmentum quadratur, datâ eadem circuli quadraturâ habetur recta TV parallela FP sive AL, transiens per centrum grav. segmenti BMN. (prop. 8. Coroll. 1.) Rursus quoniam habetur recta TV parallela AL, transiens per centrum grav. segmenti BMN, & ipsius segmenti quadratura, reducetur ad sphæram Rotundum ex eodem segmento BMN circa AL (Prop. 8. Coroll. 2. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Similiter datâ circuli quadraturâ ostendetur Rotundum ex quadrante integro BFP circa AL reduci ad sphäram.

PROPOSITIO XXVII.

Esto (fig. 5.) segmentum Conchoidis BME, cuius Polus A, axis BF, basis FK,
Dico datâ circuli quadraturâ reduci ad sphäram Rotundum ex BME circa basin FK.

DEMONSTRATIO.

Centro F, radio FB, descriptus sit quadrans circuli FBP, qui secet in N reclam ME ordinatam Conchoidis. Rotundum ex EME circa FK æquatur Rotundo ex BMN circa AL (prop. 5.) sed Rotundum ex BMN circa AL reducitur ad Sphäram datâ circuli quadraturâ. Ergo eâdem datâ Rotundum ex BME reducitur ad sphäram. Quod erat demonstr.

PROPOSITIO XXVIII.

Ilsdem positis, Dico Rotundum ex loco integro FBGK circa asymptotum infinitam FK etiam reduci ad sphäram datâ circuli quadraturâ.

DEMONSTRATIO.

Eadem est. Ostendetur enim tale Rotundum æquari Rotundo ex quadrante BFP circa AL, & hoc reduci ad sphäram datâ circuli quadraturâ.

Scholion. Spatium Conchoidicum FBGK infinitum est, ut ostendimus prop. 24. revolutum tamen circa asymptotum generat Solidum finitum. Hoc mirantur qui Geometriæ arcana ignorant, Geometrae autem sciunt idem in aliis infinitis locis asymptoticis reperiri, ac præsertim in Hyperbolico,


Dimensio Rotundorum ex Conchoide genitorum circa Axem.

PROPOSITIO XXIX.

Lemma ad sequentia.

Rotundum ex segmento Hyperbolico circa asymptotum rotato reducitur ad sphäram.

DEMONS-



De Conchoidibus




fig. 1.




fig. 2.




fig. 3.




fig. 4.




fig. 5.




fig. 6.




fig. 7.




fig. 8.




fig. 9.



fig. 10.

DEMUNS

DEMONSTRATIO.

Sit Hyperbola DE, (fig. 11.) cuius centrum A, asymptoti AC, AF, sumptis in ea duobus punctis D, E, ducantur DC, EB ordinatae ad asymptotum AC. Ostendendum est Rotundum ex segmento BCDE circa AC reduci ad sphæram. ~~autem Hyperbolam quadratam.~~

Ex D, E, ducantur DI, EF parallelæ asymptoto AC, & inter I, F sumpto quocunque punto H, ducatur HG parallela eidem AC & occurrens Hyperbolæ, in G.

Rectæ DI, GH circa AC rotatæ generant superficies Cylindricas quæ sunt inter se in ratione composita AI, AH; DI, GH, hoc est ut Rectangula AID, AHG. Sunt autem hæc Rectangula æqualia ex proprietate Hyperbolæ, ergo & superficies illæ Cylindricæ ex DI, GH circa AC. Illis etiam eodem modo probabitur æqualis superficies Cylindrica genita ex EF circa AC, ergo summa omnium superficierum Cylindricarum ex DI, GH, EF circa AC (hoc est solidum Rotundum ex segmento DEFI circa AC) æquatur superficie Cylindricæ unius verbi gratia, ex DI ductæ per FI, hoc est Cylindro cuius basis foret æqualis superficie Cylindricæ ex DI circa AC, altitudo autem FI. Ergo solidum rotundum ex segmento DEFI circa AC reducitur ad sphæram,

Et addito Cylindro ex Rectangulo AD circa eamdem AC, Rotundum ex figura ACDEF circa AC reducitur ad sphæram. Atque ex hoc auferendo Cylindrum ex Rectangulo AFEB circa eamdem AC, reliquum, hoc est Rotundum ex segmento BCDE circa AC etiam reducitur ad sphæram. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXX.

Esto (fig. 12.) Conchois BD, cuius Polus A, basis GR, axis BG (cujus quadratum BEFG) radii Conchoidis AD, Ad, ordinatae DC, de, quæ producantur in I, i, ita ut CI, ci sint æquales radiis AD, Ad; sit præterea BH æqualis & perpendicularis AB. & per H centro F, asymptotis EE, FS descripta sit Hyperbola HK.

Dico puncta I, i esse ad Hyperbolam HK.

DEMONSTRATIO.

Sumptâ AN æquali BG. Centro A radio AN descriptus sit quadrans circuli ANO, occurrentis in Q rectæ AD. ex Q in AN sit perpendicularis QP. Secet etiam AD asymptotum GR in M, & CI rectam BF in L.

Quoniam AP æquatur GC (*prop. 4. Coroll. 1.*) & AB (*hyp.*) ipsi BH, & GB ipsi BE, reliqua AG reliqua EH æqualis est. Deinde quoniam AD (*hyp.*) æquatur CI, & MD ex natura Conchoidis ipsi GB, aut BE, aut CL, reliqua AM reliqua LI æqualis est. Cùm igitur AG, AM ipsis EH, LI æquales sint, erit AG, AM :: EH, LI. Sed AG, AM :: AP, A Q :: AP, AN :: GC, GB :: FL, FE. ergo EH, LI :: FL, FE. Quare punctum I est ad Hyperbolam HK. Idem ostendetur de punto i. ergo &c. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXXI.

Ilsdem positis (*Fig. 12.*) si segmentum Conchoidis BCD volvatur circa axem BC.

Dico Rotundum inde genirum reduci ad sphæram datâ Hyperbolæ quadraturâ.

DEMONSTRATIO.

Ex propos. 29. Rotundum ex segmento Hyperbolico EHIL circa asymptotum EF reducitur ad sphæram, ac proinde cubatur summa quadratorum IL, *i.e.*, HE. Cubatur autem & summa quadratorum CL, *i.e.*, BE ordinatarum Rectanguli BELC. Denique datâ Hyperbolæ quadraturâ quadraturâ segmentum EHIL, ac proinde cubatur solidum rectum cuius basis EHIL, altitudo BE, sive quod idem est, cubatur summa Rectengulorum ILC, *i.e.*, HEB. Ergo & eadem summa rectangulorum bis sumpta.

Quoniam igitur cubatur 1. summa quadr. IL, *i.e.*, HE; 2. Summa quadrat. LC, *i.e.*, EB. 3. summa Rectang. ILC, *i.e.*, HEB bis sumptâ (datâ Hyperb. quadraturâ) cùdem datâ cubabitur summa quadratorum IC, *i.e.*, HB. sive æqualium (*prop. 30.*) AD, Ad, AB. applicatorum ad axem BC.

Ergo (*prop. 6.*) datâ Hyperbolæ quadraturâ Rotundum ex segmento Conchoidis BCD, circa axem BC, reducitur ad sphæram. Quod erat demonstrandum.

De Centro Gravitatis Conchoidis.

PROPOSITIO XXXII.

Esto (*fig. 13.*) circa communem axem BG, duplex Conchoides æqualis & similis BC, BD, quarum Polus A, bases ER, EF.

Dico datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ haberi centrum gravitatis Figuræ Conchoidicæ B C D.

D E M O N S T R A T I O .

Datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ quadraturâ segmentum Conchoidicum BGD (*prop. 25.*) Deinde datâ solius circuli quadraturâ reducitur ad spharam Rotundum ex eodem segmento BGD circa basin EF (*prop. 27.*)

Ergo datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ habetur recta XZ parallela EF, transiens per centrum gravit. segmenti Conchoidici BGD. (*prop. 8. Coroll. i.*) atque ita habetur punctum X in quo hujusmodi recta secat axem BG.

Est autem idem punctum X centrum gravit. Figuræ BCD compositæ ex duabus Conchoidibus æqualibus & similibus BCG, BDG. Ergo datâ Circuli & Hyperb. quadraturâ habetur X centrum grayit. BCD. Quod erat demonstrandum.

P R O P O S I T I O . X X I I .

Iisdem positis (*fig. 13.*) centro E describatur quadrans circuli EBF æqualis generatori Conchoideos, & occurrat ordinata GD in H. Producatur etiam EB in O, ita ut BO sit æqualis GH, sit item BI perpendicularis ad BE, & æqualis AE distantiæ Poli A à basi Conchoidis EF. Præterea centro E, asymptotis EO, ER per I descripta sit Hyperbola quæ occurrat in M, N rectis GM, ON parallelis ER. Denique supponamus rectam VY parallelam EF & occurrentem axi BE in V, transire per centrum gravitatis segmenti circularis BGH.

Dico AV esse ad EX ut segmentum Hyperbolicum GMNO + segmentum circulare BGH — Rectangulum sub AE, GH ad segmentum circulare BGH.

D E M O N S T R A T I O .

Segmentum Conchoidicum BGD est ad segmentum circulare BGH ut AV ad EX (*prop 7.*) Est autem segmentum Conchoidicum BGD (*prop. 22.*) æquale segmento Hyperb. GMNO + segm. Circul. BGH — Rectang. sub AE, GH. Ergo ut AV ad EX ita segment. Hyperb. GMNO + segment. circul. BGH — Rectang. sub AE, GH ad segmentum circulare BGH. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXXIV.

*Demonstratur Theorema quod Doctissimus P. Lalovera
invenit & indemonstratum reliquit circa centrum
gravitatis Conchoidis.*

Iisdem positis (fig. 13.) intelligatur recta AB esse Libra Archimedea suspensa ex punto E, pendatque liberè ut jacet ex brachio EB segmentum circulare BGH; ex punto autem A extremitate brachii EA pendens figura L æquiponderet segmento BGH. Sitque ut antè XZ transiens per centrum grav. segmenti Conchoidici BGD.

Dico AE esse ad EX ut segmentum Hyperb. GMNO † segmentum circul. BGH — Rectang. sub AE, GH, ad segmentum Circul. BGH † Figuram L.

*Præclarum hoc Theorema refertur in lib. de Cycloide. Append.
2. num. 8.*

DEMONSTRATIO.

Quoniam Figura L (hyp.) æquiponderat segmento circulari BGH, Librâ A B suspensa ex E, transitque V Y per centrum gravitatis segmenti BGH, AE est ad EV, ut reciprocè segmentum Circuli BGH ad figuram L. Ergo AE ad AE † EV sive ad AV, ut segmentum circuli BGH ad idem segmentum BGH † L.

Jam segmentum Conchoid. BGD est ad segmentum circulare BGH † figur. L in ratione composita ex his duabus.

1. Segmenti Conchoid. BGD ad circulare BGH.

2. Segmenti circul. BGH ad idem BGH † L.

Est autem prima ratio eadem quæ AV, EX (prop. 7.) & 2. ratio eadem quæ AE, AV ut modò ostendimus, rationes autem AE, AV; AV, EX componunt rationem AE, EX.

Ergo AE est ad EX ut segmentum Conchoid. BGD (hoc est prop. 22. segmentum Hyperb. GMNO † segm. circul. BGH — Rectang. AE, GH) est ad segmentum circul. BGH † L. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXXV.

Iisdem positis (fig. 13.) Dico datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ non solum haberi centrum gravit. totius Figuræ Con-

choicidæ BCD, ut demonstratum est *prop. 32.* sed etiam ejus dimidiæ nempe segmenti BGD.

D E M O N S T R A T I O.

DAtà circuli & Hyperb. quadraturâ, habetur recta XZ parallela asymptoto EF, transiens per centrum gravit. segmenti Conchoid. BGD ut ostensum est predicta *prop. 32.* in cursu demonstrationis.

Deinde datâ solius Hyperbolæ quadraturâ, reducitur ad sphæram Rotundum ex eodem segmento BGD circa axem BG (*prop. 32.*) & datâ quadraturâ circuli atque Hyperbolæ idem segmentum BGD quadratur (*prop. 25.*) arque ita datâ circuli & Hyperb. quadraturâ habetur recta SZ parallela axi BG, transiens per centrum gravit. ejusdem segmenti BGD (*prop. 8. Coroll. 1.*)

Quoniam igitur dati circuli atque Hyperb. quadraturâ habentur duæ rectæ XZ, SZ transeuntes per centrum gravitatis segmenti BGD, iisdem datis habetur punctum Z illius segmenti centrum gravitatis. *Quod erat demonstrandum.*

De Tangentibus Conchoidis.

P R O P O S I T I O X X X V I.

Plures novæque constructiones traduntur ad inveniendam Conchoidis Tangentem, atque ab aliis traditæ partim emendantur, partim ex nostris principiis demonstrantur.

Esto (fig. 14.) Conchois CD, cuius Polus A, Axis BC, Basis seu asymptotus BT, datum in Conchoide punctum D, ex quo oporteat Tangentem ducere.

Prima Construētio.

JUngatur AD, quæ Basis BT fecet in E, tum in AC sumptâ AF æquali axi BC, describatur quadrans circuli AFG qui fecet rectam AD in H, & ex H ducatur circulum Tangens HL, quæ occurrat in L rectæ AG. Denique fiat ut AH ad AD, ita AL ad quartam EX sumptam versus T.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

Demonstratio patet ex prop. 9. cum circuli quadrans AFG sit figura genitrix Conchoidis CD.

Secunda Construcio.

JUngatur AD quæ occurrat asymptoto in E, sitque DQ perpendicularis ad AD, quæ occurrat in Q rectæ AG, parallelæ asymptoto BT, & rectæ AQ sumatur æqualis EX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

DEMONSTRATIO.

Triangula Rectangula AHL, ADQ cum similia sint, AH, AD :: AL, AQ; sive cum AQ, EX æquentur (*byp.*) AH, AD :: AL EX. Ergo (*prop. 9.*) DX tanget Conchoidem in D.

Tertia Construcio.

JUngatur AD & ex D ducatur DV perpendicularis ad AC, & fiat ut DV ad AD ita AD ad EX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

DEMONSTRATIO.

IN Triangulis similibus AHL, ADV (propter parallelas AQ, DV) IAH, AL :: DV, AD :: AD, EX (*byp.*) & permutando AH, AD :: AL, EX. Ergo, &c.

Quarta Construcio.

JUngatur AD, quæ occurrat asymptoto in E, sitque ut BE ad AE ita AD ad EX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

DEMONSTRATIO.

AE, BE (*byp.*) :: EX, AD. Sed AE, BE :: AL, AH (propter similitud. Triang. ABE, AHL) ergo EX, AD :: AL, AH, & invertendo AH, AL :: AD, EX. & permutando AH, AD :: AL, EX. ergo, &c.

51
*Quinta Construc*tion*io.*

EX puncto D sit DV perpendicularis ad axem AC, & DO perpendicularis ad AD, quæ occurrat in O asymptoto BT. fiatque ut BV ad BA ita EO ad OX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

D E M O N S T R A T I O.

Quoniam BV, BA (*hyp.*) : : EO, OX : : componendo AV, BV : : EX, EO : sed AV, BV : : AD, ED : : AQ, EO. Ergo EX, EO : : AQ, EO. Quare EX æquatur AQ, Ergo (*Constr. 2.*) DX tangit Conchoidem in D.

*Sexta Construc*tion*io.*

Jungatur AD, ex D ducatur DV perpendicularis ad AC, & DI perpendicularis ad BX. Tum fiat ut IE ad DE ita AD ad EX.

Juncta DX tangit Conchoidem in D.

D E M O N S T R A T I O.

IE, ED : : DV, AD, sed IE, ED : : AD, EX (*hyp.*) ergo DV, AD : : AD, EX. Quare (*3. Construct.*) DX tangit Conchoidem.

*Septima Construc*tion*io.*

Juncta AD, quæ occurrat BX in E. ducatur DV perpendicularis ad AC, & ex E, ES perpendicularis ad DV, jungaturque AS, & angulo ASD fiat æqualis angulus ADX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

D E M O N S T R A T I O.

Quoniam anguli ASD, ADX sunt æquales (*hyp.*) & alterni SDA, DEX; Triangula ADS, DEX, sunt similia, & DS, DA : : DE, EX. Est autem DS, æqualis EI, ergo EI, DA : : DE, EX, & permutando EI, DE : : AD, EX. Ergo (*6. construct.*) DX tangit Conchoidem in D.

Ottava Constructio.

Jungatur AD, quæ occurrit in E asymptoto BX, & ducatur DV perpendicularis ad axem BC. Fiatque ut quadratum AV + Rectangulum DV, BE ad quadratum DV, ita BV ad VK.

Juncta DK tanget Conchoidem in D.

D E M O N S T R A T I O.

Quoniam KV, VB: : Quadr. DV, Quadr. AV + Rectang. DV, BE. Componendo KV, KB: : Quadr. DV, Quadr. DV + Quadr. AV + Rectang. DV, BE.

Sit ex D recta DX tangens Conchoidem & occurrentis asymptoto BT in X. DV, AD: : AD, EX (3. constr.) ergo DV, EX: : Quadr. DV, Quadr. AD.

Præterea DV, BE: : Quadr. DV, Rectang. DV, BE. Ergo DV, EX + BE sive DV, BX: : Quadr. DV, Quadr. AD + Rectang. DV, BE. Est autem Quadr. AD æquale Quadr. DV + Quadr. AV. ergo DV, BX: : Quadr. DV, Quadr. AV + Rectang. DV, BE.

Atqui antè sic ostendimus esse etiam KV ad KB; ergo DV, BX: : KV, KB. Quare KBX est Triangulum cuius hypotenusa KDX. Tangit autem DX (*hyp.*) ergo & KD tangit Conchoidem in D. Quod erat demonstrandum.

Nona Constructio est Barroviana.

Barrovius in Lectione Geometrica VIII. num. 12. Theorema quodam universale demonstrat ex quo dcluditur sequens Constructio pro Tangente Conchoidis.

Jungatur AED, ex qua auferatur AH æqualis ED, ex H ducatur HM perpendicularis ad AH, & occurrentis BT in M. & ex D recta DO parallela HM, occurrentis BT in O. Si recte MO sumatur æqualis OX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

Hanc constructionem ex nostro principio universali ita facile demonstrabimus.

DEMONS-

DEMONSTRATIO.

Quoniam angulus AHM rectus est (*hyp.*) HM tangit circulum FG, ergo MH, & HL etiam tangens constituant lineam rectam. Rursus propter HM, DO parallelas (*hyp.*) anguli AHL, EDO sunt æquales, sunt autem latera AH, ED æqualia (*hyp.*) & anguli A, E æquales propter parallelas AL, EO. Ergo Triangula AHL, DEO æqualia sunt in omnibus. Quare AL, EO æquales sunt. Jam verò propter similitudinem Triangularum EHM, EDO ob parallelas HM, DO. HE, ED :: ME, EO. Ergo componendo HD, DE :: MO, EO, sunt autem MO, OX æquales (*hyp.*) ergo HD, ED :: OX, EO. sive HD, AH :: OX, EO, & componendo EX, EO, :: AD, AH. Est autem EO ut diximus æqualis AL. ergo EX, AL :: AD, AH. quare (*constr. 1.*) juncta DX tangit Conchoidem in D.

Decima Constructio est Fermatiana.

*Fermatius (Oper. Varior. pag. 47.) scribens ad Robervalium
hanc ei constructionem è Schedis ut ait praproperè excerptam
mittit absque demonstratione.*

Junctâ AD, & demissâ perpendiculari DI, sit Rectangu-
lum DIT æquale Rectangulo DAE + quadrato DI, & fiat
ut BI ad IT ita DI ad IX. Juncta DX tanget Conchoidem
in D.

Ego cùm hanc constructionem demonstrare vellem, reperi erratum
quoddam in eam irrepsisse, credo Typographi vitio, neque enim tantum
Virum fugere potuisset, qui etiam methodum optimam & universalem
tradidit pro tangentibus omnium curvarum. Igitur loco quadrati DI,
legendum est Rectangulum AV, DI, sive Rectangulum AVB, & sic
restituenda Constructio.

Junctâ AD, & demissâ perpendiculari DI, sit Rectangulum
DIT æquale Rectangulo DAE + Rectangulo AV, DI vel
AVB, & fiat ut BI ad IT, ita DI ad IX.

Juncta DX tanget Conchoidem in D.

DEMONSTRATIO.

EX E sit ER perpendicularis ad AE, & occurrentis in R rectæ AL.
Triangula AVD, AER Rectangula & habentia alternos angulos
ADV, EAR æquales sunt similia, ergo AD, VD :: AR, AE. Quare



Rectangulum AD, AE æquatur Rectangulo VD, AR.

Rursus cum HL tangat circulum atque ita angulus AHL rectus sit, Triangula AHL, AVD sunt similia; quare cum demissâ HN perpendiculari ad AG, Triangula AHL, HNL sunt similia, etiam Triangula AVD, HNL similia sunt; quare AV, VD :: NL, NH, atque ita Rectangulum AV, NH, sive AV, DI, sive AV, BV æquatur Rectangulo VD, NL.

Quoniam igitur Rectangulum AD, AE ostensum est æquale Rectangulo VD, AR; & Rectangulum AV, BV Rectangulo VD, NL; duo Rectangula simul AD, AE; AV, BV æquantur duobus simul VD, AR; VD, NL, sive Rectangulo sub VD & AR + NL.

Sunt autem (*ex hyp.*) duo Rectang. simul AD, AE; AV, BV æqualia Rectangulo DIT, sive Rectangulo BIX (quoniam *hyp.* BI, IT :: DI, IX) ergo Rectangulum sub VD & AR + NL æquatur Rectangulo BIX. atque ita cum latera VD, BI sint æqualia, etiam AR + NL æquabitur ipsi IX. ergo addendo utrinque rectas æquales AN, EI; AR + NL + AN, hoc est AR + AL æquabitur EI + IX hoc est rectæ EX.

A puncto D in AD sit perpendicularis DQ quæ occurrat in O rectæ BT, & in Q rectæ AR. Quoniam ER, DQ sunt perpendicularares eidem AD, parallelæ sunt inter se, sunt autem EO, RQ etiam parallelæ, quare in parallelogrammo ERQO, EO æquatur RQ, est autem EO æqualis AL properæ similitudinem Triangulorum EDO, AHL & æqualitatem laterum AH, ED: ergo AL æquatur RQ, & AR + AL æquatur AR + RQ sive AQ. Ostensum est autem AR + AL æquari EX, ergo AQ eidem EX æqualis est. quare (*2. construct.*) DX tangit Conchoidem in D. Quod erat demonstrandum.

Undecima Construētio est Cartesiana.

Cartesius lib. 2. Geometriae hanc tradit constructionem ad inventandam rectam DY qua sit perpendicularis ad curvam Conchoidem CD in puncto D, sive ad tangentem DX.

Junctâ AD, & demissâ DI perpendiculari ad BT, sumatur in J AD ipsi DI æqualis DZ, ex Z ducatur ZY parallela DI sive AB, & æqualis AE.

Junctâ DY est perpendicularis ad tangentem DX; unde si ipsi DY hoc modo inventæ ducatur perpendicularis DX, erit DX tangens Conchoidem in D.

Hoc autem sic ex præcedentibus demonstrabimus.

DEMONSTRATIO.

SI DX tangat Conchoidem in D , & sit DZ æqualis DI , & ZY paralela DI æqualis AE . Ostendendum est junctam DY esse perpendicularem ad DX .

Quoniam (7. Construct.) positâ DX tangente, ductâque DV ordinata Conchoidis & ES perpendiculari ad DV , junctaque AS , angulus ASD æquatur Angulo ADX , subtractis utrinque angulis rectis ESD , ADO , reliqui anguli ASE , ODX sunt æquales.

Consideremus jam Triangula AES , DZY . Latus DZ (hyp.) æquatur DI sive lateri SE . Et latus ZY (hyp.) lateri AE , angulus etiam DZY æqualis est angulo AES , nam qui illis deinceps sunt AZY , DES alterni æquales sunt ob parallelas (hyp.) ZY , DI vel ZY , ES . Cùm igitur Triangula DZY , AES duo latera duobus lateribus æqualia habeant , angulósque illis lateribus comprehensos , etiam reliquos angulos ZDY , ASE æquales habent .

Est autem probatum angulum ASE æquari angulo ODX . ergo angulus ZDY angulo ODX æqualis est . atque ita addito communi angulo YDO , totus angulus YDX , toti ADO æquatut . est autem ADO rectus [hyp.] ergo angulus YDX rectus est . Quod erat demonstrandum .

SCHOOLION.

Non difficile est multas alias ex precedentibus constructiones elicere , neque nos in omnibus illis quas retulimus recensendis ac demonstrandis tantum immorati essemus , nisi duplarem ex eo utilitatem capi posse visideremus , una est quod inde intelligi potest quam recte conveniat methodus nostra cum iis quibus celeberrimi Geometra usi sunt , altera autem & precipua , quod ex multiplici constructione ad inveniendas tangentes , variae earum etiam innescunt proprietates , quarum cognitio ad multa in signia Theorematata , praesertim vero ad curvarum ipsarum dimensionem utilissima est .



DE CONCHOIDIbus.

PARS TERTIA.

DE CONCHOIDE SEMICIRCULARI.

Esto (fig. 15.) Conchois FG , cuius axis DF. Basis DS , Polum A , Figura genitrix ACB semicirculus diametri AB . Conchois FG vocatur *Conchois semicircularis*.

Ex ipsa generatione manifestum est 1. curvam FG nunquam coincidere cum base DS , cum omnia puncta F , g , G sint ultra rectam DS . 2. Curva FG accedit semper ad basin DS . Cùm enim semicirculus ACB sit illius figura genitrix, erit quælibet chorda AC ducta à polo A in semicirculo æqualis respondentí EG . Si ergo ex punctis C , G demittantur in AI , DS parallelas perpendicularares CR , GS erunt illæ æquales propter æqualitatem Triangulorum Rectangulorum ACR , EGS . Cùm ergo CR minuatur infra quamcunque magnitudinem datam puncto C sumpto propriùs indefinitè ad punctum A . etiam perpendicularis GS minuitur infra quamcunque magnitudinem datam , ac proinde DS recta in infinitum producta est asymptotos curvæ FG in infinitum productæ.

Hoc posito, Quæ in secundâ parte circa Conchoidem antiquam & Nostre comedeam præstítimus, in hac tertia parte, circa novam hanc Conchoidem facere in animo est , atque illi applicare methodos generales initio traditas pro omnibus Conchoidibus.

Igitur 1. dabimus dimensionem segmentorum spatiique integri Conchoidis semicircularis. 2. Rotunda circa basin ex ea genita ad sphæram revocabimus. 3. Idem præstabimus circa Rotunda circa axem. 4. Centrum gravitatis in hac Conchoide investigabimus. 5. Variis modis ejus Tangentem determinabimus.

Et Coronidis loco agemus de alia quadam Figura huic Conchoidi valde affini , & quæcunque Doctissimus P. Lalovera circa illam Figuram invenit atque indemonstrata reliquit demonstrabimus.

Hoc est hujus tertiaris partis de Conchoidibus argumentum.

Dimenſio

Dimensio Conchoidis semicircularis.

PROPOSITIO XXXVII.

Esto (fig. 15.) Conchois semicircularis FG, cuius Polus A, semicirculus generator ACB, axis DF, basis DE.

Inter AB, AD sit media proportionalis AM, & centro A radio AM describatur quadrans circuli AMO secans rectam ACG in N, atque omnes rectas A e g, quæ inter AF, AG duci possunt, in n.

Dico Sectorem Conchoidicum AFG æquari Triangulo ADE † figuræ genitrici ABC † duplo sectoris AMN,

DEMONSTRATIO.

Radio AD describatur arcus circuli DH qui occurrat in H rectæ AG.

Quoniam (hyp.) AB, AM :: AM, AD :: Arcus MN, Arcus DH. Rectangulum sub AB & arcu DH æquatur Rectangulo sub AM & arcu MN, sive duplo sectoris AMN.

Ex punctis C, c, intelligantur ad lineas AC, Ac perpendiculares quæ omnes convenient in punto B, cum anguli ACB, AcB in semicirculo sint recti. Hoc posito.

Ex principio generali tradito in prop. 3, Sector Conchoidicus AFG æquatur Triangulo ADE † figuræ genitrici ABC † Figuræ Cylindricæ quam generarent omnes rectæ AB erectæ in omnibus punctis arcus DH, hoc est Rectangulo sub AB & arcu DH sive ut antè ostendimus duplo sectoris AMN. Quod erat demonstrandum.

Corollarium 1. Auferendo utrinque commune Triangulum ADE, superest Figura Conchoidica DFGE æqualis figuræ genitrici ABC † duplo sectoris AMN.

Corollarium 2. Cum datâ circuli quadraturâ, quadretur tam Figura ABC quam duplum sectoris circularis AMN, patet datâ circuli quadraturâ, quadrari sectorum Conchoidicum AFG, ac proinde quodcunque segmentum Conchoidis semicircularis.

PROPOSITIO XXXVIII.

Iisdem positis. Dico totum spatium Conchoidicum DFGS contentum axe DF, curva FG & asymptoto DS in infinitum productis æquari semicirculo ACB † duplo quadrantis AMO.

DEMONSTRATIO.

Sumendo punctum C quām proximē libuerit puncto A, semper figura Conchoidica DFGE æquatur figuræ ABC † duplo sectoris AMN, ergo quando punctum C convenient cum puncto A, cū etiam punctum N inveniatur in O, & punctum E infinitè distet à D, sequitur totum spatium Conchoidicum DFGS æquari semicirculo ACB † duplo quadrantis AMO. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXXIX.

Determinare rationem quam habet totum spatium Conchoidicum ad semicirculum genitorem.

Iisdem positis (fig. 15.) sit AQ quarta pars AB diametri semicirculi genitoris.

Dico ut AD † AQ ad AQ ita esse spatium seu locum Conchoidicum DFGS ad semicirculum genitorem ACB.

DEMONSTRATIO.

Sit P centrum semicirculi ACB, ac proinde radius AP duplus rectæ AQ quæ quarta est pars diametri AB. Quoniam (hyp.) tres AB, AM, AD sunt proportionales, quadrans circuli AMO est ad quadratum ABI ut AD ad AB.

Deinde quoniam AB radius quadrantis ABI, est diameter semicirculi ACB, quadrans ABI duplus est semicirculi ACB. Est igitur quadrans ABI ad semicirculum ACB ut AB ad AP.

Cūm igitur sit Quadrans AMO ad quadrantem ABI ut AD ad AB, & quadrans ABI ad semicirculum ACB ut AB ad AP. Ex æquo quadrans AMO est ad semicirculum ACB ut AD ad AP. atque ita duplum quadrantis AMO est ad semicirculum ACB ut AD ad AQ dimidiam ipsius AP. & componendo duplum quadrantis AMO † semicirc. ACB (sive spatium Conchoid. DFGS prop. præc.) est ad semicirculum ACB, ut AD † AQ ad AQ. Quod erat demonstrandum.

Corollarium 1. Si AB, AD æquales sint, spatium DFGS quintuplum est semicirculi ACB genitoris, nam AD sive AB † AQ quarta pars AB continet quinque AQ.

Corollarium 2. Si habeatur in numeris ratio AD, AB, facile est affigere in numeris rationem spatii Conchoidici ad semicirculum genitorem.

Ecce Canonem universalem.

Sit AD ad AB ut x ad unitatem. Ut 4 x + 1 est ad 1. ita spatium Conchoide. DFGS est ad semicirculum ACB genitorem.

Ita si AD est tripla AB. x æquarur 3. ergo ut 13 ad 1. ita spatium DFGS est ad semicirculum ACB. Et sic de cæteris.

Dimensio solidorum Rotundorum ex Conchoide semicirculari circa Basin revoluta.

PROPOSITIO. XL.

Esto (fig. 16.) Conchois semicircularis FG cuius Polus A, semicirculus genitor ACB, Axis DF, basis DS, ordinata quæcunque GT.

Dico datâ circuli quadraturâ haberi seu reduci ad sphæram Rotundum ex segmento Conchoidico FGT circa Basin DS.

DEMONSTRATIO.

Diametro DF describatur semicirculus DVF, occurrens in V ordinata GT. Quoniam ex natura Conchoidis, AB, DF æquales sunt, semicirculus DVF æqualis est semicirculo genitori ACB. ex A ducatur AO parallela asymptoto DS.

Ex principio generali tradito in prop. 5. Rotundum ex segmento Conchoidico FGT circa basin DS æquatur Rotundo genito ex segmento FVT circulari circa AO. Atqui (prop 26.) datâ circuli quadraturâ habetur Rotundum ex segmento circulari FVT circa AO, ergo Rotundum ex segmento Conchoid. FGT circa Basin DS. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XLI.

Isdem positis (fig. 16.) Dico Rotundum ex spatio integrō Conchoidico DFGS circa asymptotum DS æquari semicylindro cuius basis est DVF æqualis semicirculo genitori ACB, altitudo autem circumferentia radii AI intercepti inter Polum A & I centrum semicirculi DVF.

DEMONSTRATIO.

Ex Coroll. prop. 5. Rotundum ex spatio Conchoidico DFGS circa asymptotum DS æquatur Rotundo ex semicirculo DVF circa AO. Quoniam autem recta AI est distantia rectæ AD à centro gravitatis semicirculi DVF, Rotundum ex DVF circa AO æquatur solido recto sive

semicylindro cuius basis semicirculus DVF, altitudo autem circumferentia radii AI (*Tacquet lib. 5. Cylindr. & Annul.*) ergo, &c. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc patet. 1. Rotundum ex spatio Conchoidico DFG₃ circa asymptotum DS finitum esse. 2. Idem Rotundum haberi datâ circuli quadraturâ, nam illâ datâ habetur rectâ æqualis circumferentia radii AI, ac proinde altitudo semicylindri illi Rotundo æqualis, cuius basis DVF semicirculus notus.

Dimensio solidorum Rotundorum ex Conchoide semicirculari circa axem revolutâ.

PROPOSITIO XLII.

Esto (fig. 17. Conchois semicircularis FG, cuius Polus A, semicirculus generator ACB, Axis DF, Basis DE, semicirculus DVF æqualis genitori ACB.

Ex punto F sit FR perpendicularis ad DF & æqualis AD distantia Poli à basi, productaque ED versus K, centro D, asymptotis DF, DK descripta intelligatur Hyperbola secundi generis RSY in qua abscissæ sint ut reciprocè quadrata ordinatarum.

Ex Polo A ad Conchoidem FG ducatur quæcunque recta AG occurrens basi DE in E, & ex G ordinetur in Conchoide, GT ad axem DF, producaturque GT donec TS sit æqualis AE.

Dico punctum S esse ad Hyperbolam RY.

DEMONSTRATIO.

Occurrat GT circulo DVF in V, junganturque FV, DV. Ex prop. 4. AT, DT :: GT, VT. Ergo AG, DV sunt parallelae, & angulus DAE æqualis angulo FDV. Est autem & angulus DVF in semicirculo æqualis recto ADE. Etgo Triangula ADE, DVF sunt similia, & quadr. AE, quadr. AD :: quad. DF, quadr. DV :: DF, DT. (ex propriet. circuli) Est autem (*hyp.*) AE æqualis TS, & AD, FR. Ergo quad. TS, quadr. FR :: DF, DT. quare punctum S sit ad Hyperbolam RY. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO. XLIII.

Ilsdem positis (*fig. 17.*) sit in FR sumpta FO æqualis DF, & in TS, TQ æqualis EG.

Dico punctum Q esse ad Parabolam DO, cuius vertex D, axis DF.

DEMONSTRATIO.

QUadrilaterum DVGE est parallelogrammum (*prop. 4. Coroll. 2.*) quare EG, DV sunt æquales. Sunt autem ex proprietate circuli quadrata DF, DV, ut rectæ DF, DT, ergo quadrata FO, TQ æqualium ipsis DF, EG, sive DF, DV sunt inter se, ut rectæ DF, DT. Quare punctum Q est ad Parabolam DO, cuius vertex D, axis DF. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO. XLIV.

Ilsdem positis (*fig. 17.*) sit FM media proportionalis inter AD, DF, compleatürque Rectangulum FMHD, sítque TN media proportionalis inter AE, EG.

Dico punctum N esse ad lineam rectam MH.

DEMONSTRATIO.

TRiangula ADE, DFV similia sunt, & EG æqualis DV, ut ostendit in duabus propos. præcedentibus, igitur AE, AD :: DF, DV. ac proinde Rectangulum AE, DV aut Rectangulum AEG æquatur Rectangulo AD, DF. Sunt autem (*hyp.*) quadrata FM, TN æqualia Rectangulis ADF, AEG (cùm FM sit media proportionalis inter AD, DE, & TN inter AE, EG) ergo quadrata FM, TN æquantur inter se, ac proinde & rectæ FM, TN, unde punctum N est in recta MH. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Ex tribus propositionibus præcedentibus sequitur quadratum AG quod æquatur quadrato AE + quadrato EG + duplo Rectanguli AEG, æquari etiam quadrato TS ordinatæ in Hyperbola RY + quadrato TQ ordinatæ in Parabola DO + duplo quadrati TN ordinatæ in Rectangulo FDHM.

PROPOSITIO. XLV.

DAtâ Hyperbolæ quadraturâ cubatur summa quadratorum TS, FR ordinatarum Hyperbolæ RS secundi generis.

Q

DE MONSTRATIO.

CEntro D, asymptotis DF, DK, describatur per R Hyperbolæ communis RX occurrentis TS in X,

Ex natura Hyperbolæ secundi generis RY, quadratum FR quadratum TS :: DT, DF :: FR, TX (propter Hyperbolam communem FX) sed ut FR, TX ita sumptâ altitudine communis FR, quadratum FR ad Rectangulum FR, TX; ergo quadratum FR, quadratum TS :: quadratum FR, Rectangulum FR, TX. quare quadratum TS æquatur Rectangulo sub FR, TX. ergo summa quadratorum TS æquatur summæ Rectangularium FR, TX. sive solido recto cuius basis segmentum FRXT hyperbolæ communis, altitudo FR. Datâ autem Hyperbolæ communis quadraturâ cubatur solidum rectum cuius illud segmentum est basis, ergo datâ Hyperbolæ communis quadraturâ cubatur summa quadratorum TS ordinatarum segmenti Hyperbolici secundi generis. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Ostensum est summam quadratorum TS ordinatarum in segmento Hyperb. secundi generis FRST, æquari solido recto cuius altitudo FR, basis autem FRXT segmentum Hyperbolicum primi generis; similiter ostendetur summam quadratorum omnium TS ordinatarum totius spatii FRYKD secundi generis, æquari solido recto cuius altitudo FR, basis autem est spatium Hyperbolicum primi generis FRXKD. Hoc autem solidum rectum est infinitum, cùm ejus basis spatium nempe asymptoticum Hyperbolæ communis infinitum sit quoad aream, ut satis Geometris notum est. Quare summa quadratorum omnium TS ordinatarum in spatio Hyperbolico secundi generis FRYKD, est etiam solidum absolute infinitum.

PROPOSITIO XLVI.

Iisdem positis (fig. 17.) Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ, haberi Rotundum genitum ex segmento FTG Conchoidis semicircularis rotato circa axem FT.

DE MONSTRATIO.

QUADRATUM AG (prpp. 44. Coroll.) æquatur quadrato TS + duplo quadrati TN + quadrato TQ. Datâ autem hyperbolæ quadraturâ cubatur summa quadratorum TS (prop. 45.) aliunde verò cubatur absolute summa bis sumpta quadratorum TN, cùm TN sint ordinatae Rectanguli. Denique cubatur etiam summa quadratorum TQ, cùm enim TQ sint ordinatae ad Parabolam, portio Conoidis Parabolici geniti ex

FOQT circa axem FT reducitur ad sphæram (*Archim.*) Ergo data Hyperbolæ quadraturâ summa quadratorum omnium AG respondentium segmento FTG & applicatorum in T cubatur. Cubatâ autem summa quadratorum AG applicatorum in T, habetur Rotundum ex FTG circa FT (*prop. 6.*) ergo data Hyperbolæ communis quadraturâ habetur sive reducitur ad sphærani Rotundum ex segmento FTG circa axem FT rotato. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XLVII.

Ilsdem positis. Rotundum circa axem FD (*fig. 17.*) ex tota Conchoide semicirculari DFGL, solidum est absolutè infinitum sive majus quâcunque sphæra.

DEMONSTRATIO.

Tale Rotundum nihil est aliud quàm summa circulorum quorum radii sunt omnes ordinatæ GT à vertice F ad basin DL. Summam autem illam circulorum constabit esse infinitam, si summa quadratorum earumdem ordinatarum GT ad F usque ad D constitutæ solidum infinitum. Hoc autem sic ostendetur. Summa quadratorum GT ab F ad D æquatur summæ quadratorum AG respondentium — summæ quadratorum AT. Est autem summa quadratorum AG applicatorum ad axem DF æqualis summæ quadratorum TS + duplo summæ quadratorum TN + summæ quadratorum TQ (*prop. 44. Coroll.*) & summa quadratorum TS, ab F usque ad D est solidum absolutè infinitum (*prop. 45. Coroll.*) unde summa quadratorum AG applicatorum in T secundum totum axem DF est ut ita dicam plusquam infinita, ergo si ab ea detrahatur summa quadratorum AT ab F usque ad D quæ finita est (cum AT applicatæ in T ab F usque ad D generent Trapezium) manifestum est reliquam summam nempe quadratorum GT ab F usque ad D fore absolutè infinitam. Quod erat demonstrandum.

De Centro gravitatis Conchoidis semicircularis.

PROPOSITIO XLVIII.

Esto (*fig. 16.*) Conchois semicircularis FG, ejus Pôlus A; Axis DF, Baxis DS, segmentum Conchoidis EGT, & illi simile & æquale alterum FKT.

Dico data circuli quadraturâ haberi centrum gravitatis Figure FKG.

DEMONSTRATIO.

Datâ circuli quadraturâ, quadratur segmentum FGT (*prop. 37. co-*
roll. 2.)

Deinde reducitur ad sphæram Rotundum ex eodem segmento FGT circa basin DS (*prop. 40.*) ergo datâ circuli quadraturâ habetur recta *m n* parallela basi DS, transiens per centrum gravit. segmenti FGT (*prop. 8. Coroll. 1.*)

Est aurem punctum *m* in quo recta *m n* secat axem DF, centrum gravitatis Figuræ FKG compositæ ex duabus FKT, FGT æqualibus & similibus.

Ergo datâ circuli quadraturâ habetur punctum *m* centrum gravit. Figuræ FKG. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XLIX.

Iisdem positis (*fig. 16.*) Dico datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ haberi centrum gravit. segmenti Conchoidis FGT.

DEMONSTRATIO.

Datâ circuli quadraturâ, quadratur segmentum FGT (*prop. 37. co-*
roll. 2.) Deinde datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur Rotundum ex eodem segmento FGT circa axem FT (*prop. 46.*)

Ergo (*prop. 8. coroll. 1.*) datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ, habetur recta parallela axi, transiens per centrum gravit. segmenti FGT.

Datâ autem circuli quadraturâ, habetur alia recta parallela basi DE transiens per centrum gravit. ejusdem segmenti FGT (*prop. 48.*)

Ergo datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ, habentur duæ rectæ transentes per centrum gravit. segmenti Conchoidici FGT, ac proinde concursus illarum rectarum, sive centrum gravit. ejusdem segmenti FGT. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO L.

Iisdem positis (*fig. 16.*) Dico dari posse absolutè linéam Basim parallelam quæ transit per centrum gravit. spatii DFGS contenti sub Conchoide semicirculari & asymptoto in infinitum productis.

Atque itâ dari posse absolutè centrum gravitatis spatii contenti sub dupli Conchoide FK, FG & asymptotis.

DEMONSTRATIO.

DEMONSTRATIO.

Habetur (*prop. 39.*) proportio totius spatii sive loci Conchoidici sub FG, DS & axe DF contenti ad circulum genitorem ACB ^{semicircum-} aut illi æqualem DVF. Sit igitur spatium illud Conchoidicum ad semi-circulum DVF, ut AI (jungens polum A & centrum I) ad D α . Recta α parallela basi DS transibit per centrum gravit. spatii Conchoid. DFGS contenti sub DF, & FG, DS in infinitum productis (*prop. 7.*)

Coroll. 3.

Habebitur ergo punctum α in quo $\alpha\zeta$ secat axem DF, & cum Conchoidea FK, FG sint ex hypoth. æquales & similes, manifestum est punctum α esse centrum spatii Conchoidici utriusque simul sumpti. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO. L I.

Iisdem positis (*fig. 16.*) Dico spatium sive locum Conchoidicum DFGS contentum sub FG curva & asymptoto DS in infinitum productis centrum gravitatis habere infinitè distans ab axe DF, ac proinde nullum habere.

DEMONSTRATIO.

Rotundum ex Conchoide integra DFGS circa axem DF absolutè infinitum est sive majus quacunque sphæra. (*prop. 47.*)

Est autem tale Rotundum (*Tacq. lib. 5. Cyl.*) æquale solidō rectō cuius basis est Conchois integra DFGS, altitudo autem circumferentia cuius radius est distantia illius centri gravit. ab axe DF. ergo tale solidum rectum infinitum est. quare cum ejus basis nempe Conchois DFGS sit finita (*prop. 38.*) altitudo nempe circumferentia cuius radius est distantia centri gravit. ab axe DF est infinita. Ergo distantia illa infinita est, ac proinde centrum gravitatis nullibi est. Quod erat demonstrandum.

De Tangentibus Conchoidis semicircularis.

PROPOSITIO LII.

Variae Constructiones ad inveniendam Tangentem Conchoidis semicircularis.

Esto (*fig. 18.*) Conchois semicircularis FG, cuius Polus A, Axis DF, Basis DX, semicirculus genitor ACB, datum in Conchoide punctum G ex quo oporteat Tangentem ducere.

R

Prima Constrūctio.

Jungatur AG occurrentis in C, semicirculo genitori ACB, & in E Basi DX, ex C sit tangens circuli CL quæ occurrat in L rectæ AM parallela DX. Fiat ut AC ad AG ita AL ad EX. Juncta GX tanget Conchoidem in G.

Demonstratio patet ex principio generali tradito & demonstrato in propos. 8.

Secunda Constrūctio.

Junctâ AG, angulo GAM fiat æqualis angulus AGM, & rectæ AM sumatur æqualis EX.

Juncta GX tanget Conchoidem in G.

Nam Tangentes circuli AL, CL æquales sunt, ergo anguli LAC, LCA æquales sunt, est autem angulus LAC angulo AGM æqualis (*hyp.*) ergo & angulus ACL angulo AGM æqualis est. unde rectæ CL, GM sunt parallelæ, & AC, AG :: AL, AM. sed AM, EX æquales sunt (*hyp.*) ergo AC, AG :: AL, EX. quare juncta GX tangit Conchoidem in G (*constrūct. I.*)

Tertia Constrūctio.

Junctâ AG, ex G ordinetur ad Conchoidem recta GH, & fiat ut GH ad AG ita dimidia AG ad EX.

Juncta GX tanget Conchoidem in G.

Producatur LC tangens circulum ACB, donec occurrat in I rectæ BK cumdem circulum tangentem in B. Triangula CAL, CIK sunt similia, quare cum AL, CL sint æquales, etiam CI, IK æquales sunt. At CI, BI tangentes sunt æquales, ergo BI, IK æquales sunt, & BK dupla est IK.

Jam angulus ACB in semicirculo cum sit rectus, Triangulum BCK simile est Triangulo ABK, ergo & Triangulo AHG. ergo GH, AG :: CK, BK, & sumptis consequentium dimidiis, GH, dimid. AG :: CK, IK; est autem CK, IK :: AC, AL (ob similitudinem Triangulorum CIK, CAL; ergo GH est ad dimidiad AG ut AC ad AL. Est autem (*hyp.*) GH, ad AG ut dimidia AG ad EX, & permutando GH est ad dimidiad AG ut AG ad EX. ergo AC est ad AL ut AG ad EX, & permutando AC, AG :: AL, EX; quare (*constrūct. I.*) recta GX tangit Conchoidem in G. Quod erat demonstrandum.

Plures alias constructiones facile eßet adjicere atque ex præcedentibus
eruere, verum haſſufficient quæ breves facilèſque ſunt.

PROPOSITIO LIII.

In qua ex iis quæ demonstrata ſunt de Conchoide ſemi-circulari, demonstrantur quæcunque Doctissimus P. Lalovera invenerat circa novam aliquam Figuram quam proponit ad finem libri ſubtiliſſimi de Cycloide, in Appendix 2. num. v.

E Sto (fig. 19.) Semicirculus BFC, cujus diameter BC producatur in A ita ut AB, BC ſint æquales: ſitque curvæ CD talis proprietas, ut quæcunque illius ordinata DE ſit ad EF ordinatam ſemicirculi BFC, ut AB ad BE. Per B ducatur indeſita reſta XZ perpendicularis ad AB.

Circa Figuram BCDX P. Lalovera ſequentia invenit Theorematα.

I. Curva CD accedit ſemper ac propiùs quoquinque intervallo dato ad rectam BX, nunquam tamen cum illa concurrit.

II. Si ex altera parte deſcribatur curva CG ſimilis & æqualis CD, Spatiū contentū inter curvam DCG & asymptotum XZ quadruplum eſt circuli diametri BC.

III. Sit BI quarta pars ipsius BC. Dico punctum I. eſſe centrum gravitatis ſpatii DCGZX contenti inter curvam DCG infinitam ex utraque parte & asymptotum XZ.

IV. Datā quadraturā circuli, habetur quadratura & centrum gravitatis cuiuscunq; ſegmenti CDG.

Hæc ſunt Theorematα quæ P. Lalovera inveniſſe ſe ait & indemonſtrata reliquit, nos demonſtrabimus in hunc modum.

Theorema I.

O Stendendum eſt curvam CD in infinitum accedere ad rectam BX, nunquam tamen cum illa coincidere.

I. Curvam CD ſemper accedere ad rectam BX manifestum eſt, quælibet enim perpendicularly ex D cadens in BX æquatur BE respondentis, minuitur autem BE in infinitum, ſumpto E propiùs ad punctum B. ergo & perpendicularly, ex punto D in BX minuitur etiam infra quæcunque magnitudinem datam,

2. Curvam autem CD non concurrere cum BX sic ostendetur.

Ex hypothesi AB, BE :: DE, EF; & permutando AB, DE :: BE, EF. est autem ex proprietate circuli BE, EF : EF, EC. ergo AB, DE :: EF, EC. Quoniam igitur ratio EF, EC evadit minor quacunque data, puncto E sumpto semper proprius ad punctum B, similiter ratio AB, DE evadit minor quacunque data, ergo cum AB sit eadem, recta DE evadit major quacunque data, quod falsum esset si curva CD conveniret in aliquo puncto cum recta BX. non igitur curva CD conuenit cum recta BX. Quod erat ostendendum.

Theorema I.I.

Iisdem positis ostendendum est spatium DCGZX contentum curva DCG utrinque infinita & asymptoto XZ esse quadruplum circuli cuius diameter BC.

Sit ALB semicirculus diametri AB, quoniam AB, BC sunt æquales (*hyp.*) semicirculi ALB, BFC sunt etiam æquales.

Intelligatur jam Conchois semicircularis CH, cuius Polus A, asymptotus BZ, axis BC, semicirculus genitor ALB, productaque DF occurrat. Conchoidi CH in H.

Ex proprietate Conchoidis CH [*prop. 4. Coroll. 2.*] AE, BE :: EH, EF, ergo dividendo AB, BE :: FH, EF. Est autem ex natura curvae CD; AB, BE :: DE, EF; ergo FH, EF :: DE, EF, quare FH, DE æquales sunt. Cum igitur hoc eveniat quæcunque DH ducatur parallela XZ, sequitur ex methodo indivisibilium summam omnium DE hoc est spatium BCDX æquari summam omnium FH hoc est spatio BFCHZ.

Quoniam autem Conchois CH talis est ut AB æqualis sit BC (*hyp.*) totum spatium Conchoidicum BCHZ quintuplum est semicirculi generis ALB vel illi æqualis BFC [*prop. 39. coroll. 1.*] ac proinde spatium BFCHZ est quadruplum semicirculi BFC. ergo spatium BCDX quod æquale est spatio BFCHZ est etiam quadruplum semicircul BFC, & sumptis duplis terminorum, spatium DCGZX contentum curva DCG & asymptoto XZ est quadruplum circuli diametri BC. Quod erat, &c.

Theorema III.

SI BI sit quarta pars diametri BC. Ostendendum est punctum SI esse centrum gravitatis totius spatii DCGZX contenti curva DCG & asymptoto XZ.

Quoniam [*hyp.*] semper est AB, BE :: DE, EF, aut AB, BE :: DG dupla

dupla DE, EF bis, ex principiis Archimedis in libro de Parabola, sequitur si intelligatur libra AC suspensa ex B, spatio DCGZX ut jacet pendenti ex brachio BC, æquiponderate semicirculum 'BFC bis sumpsum, sive circulum diametri BC pendentem ex punto A extremo brachii AB. Quare ex principiis ejusdem Archimedis, spatium DCGZX est ad circulum diametri BC ut reciprocè AB ad BI (posito quod I sit centrum gravitatis spatii DCGZX) Est autem ex Theoremate præcedenti spatium DCGZX quadruplum circuli diametri ABC, ergo AB seu BC est quadrupla rectæ BI. Quod erat demonstrandum.

Theoremm. IV.

Datâ circuli quadraturâ, ostendendum est Iisdem positis haberi quadraturam & centrum gravitatis, cujuscunque segmenti CDG.

1. Si quadretur circulus, quadrabitur & segmentum Conchoidicum CEH, quadrabitur enim sector Conchoidicus ACH (*prop. 37. Coroll. 2.*) ergo ablato Triangulo AEH, quadrabitur segmentum CEH. Præterea si quadretur circulus, quadrabitur & segmentum circulare CEF, quare si quadretur circulus quadrabitur & figura CFH, sive illi æqualis CED (quoniam ut ostendimus in Theor. 2. rectæ DE, FH sunt semper æquales) ergo si quadretur circulus quadrabitur figura DCG dupla ipsius CDE. Quod erat primum.

2. Quoniam est perpetuò AB, BE:: DE, EF. Ex principiis Archimedis, Figuræ CDE ut jacet pendenti ex CE, librâ AC suspensa ex B, æquiponderabit segmentum circulare CEF suspensum ex punto A. Ergo sicut datâ circuli quadraturâ quadratur segmentum CDE, atque ita habetur illius ratio ad segmentum circulare CEF, ita habebitur ratio AB ad BO (posito quod O sit punctum in quo recta parallela BX & transiens per centrum gravit. figuræ CDE secat axem CE.) Est autem idem punctum O centrum gravitatis figuræ CDG (cùm duæ CDE, CGE sint similes & æquales (*hyp.*) Ergo datâ circuli quadraturâ habetur centrum gravitatis Figuræ CDG. Quod erat demonstrandum.

S C H O L I O N.

Demonstravimus igitur Theoremata à P. Lalovera inventa circa figuram CDE, vel CDG. Ex his autem deducitur, Rotundum ex figura CDE vel etiam ex toto spatio CDXB circa asymptotum BX haberi datâ circuli quadraturâ. Verum difficilius est Rotundum circa axem ex eodem segmento CDE. Hoc autem quod Lalovera non attigit, atque inde consequens centrum gravitatis segmenti CDE, duabus Propositionibus explicabimus.

PROPOSITIO LIV.

Iisdem positis (fig. 19.) Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ, reduci ad sphærâ Rotundum ex segmento CDE circa axem CE rotato.

DEMONSTRATIO.

Occurrat AH rectæ BZ in K. & jungatur BF, est igitur quadrilaterum BFHK parallelogrammum (*prop. 4. Coroll. 2.*) & rectæ FH BK sunt æquales; est autem FH æqualis DE, ut ostensum est in *prop. præc. Theor. 2.* ergo BK est æqualis DE. & quadratum BK æquale quadrato DE. Est autem quadratum BK æquale quadrato AK — quadrato AB. ergo quadratum DE æquatur quad. AK — quad. AB. Intelligantur singulæ AK applicari in punctis E respondentibus & AB in C (sumptis CM, EN æqualibus ipsis AB, AK) curva MN erit Hyperbola secundi generis in qua abscissæ sunt ut reciprocè quadrata ordinatarum (*prop. 42.*) & summa quadratorum EN ordinatarum in segmento CM, NE cubatur datâ Hyperbolæ quadraturâ (*prop. 45.*) ergo summa quadratorum AK applicatarum in E (hoc est summa quadratorum AB + summa quadratorum BK) cubatur data Hyperbolæ quadraturâ. Cubatur autem ut patet summa quadratorum AB applicatarum in E, hæ enim generant rectangulum, ergo datâ Hyperb. quadraturâ summa quadratorum BK sive DE æqualium cubatur. ergo & summa circulorum quorum radii DE reducitur ad Cylindrum aut Sphærâ. Est autem summa illorum circulorum Rotundum ex figura CDE circa axem AE, ergo datâ Hyperb. quadraturâ habetur Rotundum ex figura CDE, circa CE. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO LV.

Iisdem positis. Dico datâ Circuli & Hyperbolæ quadraturâ, haberi centrum gravit. cuiuscunque segmenti CDE (fig. 19.)

DEMONSTRATIO.

DAtâ circuli quadraturâ quadratur figurâ CDE (*prop. 53. Theor. 3.*) Præterea datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur Rotundum ex eadem figura CDE circa axem CE (*prop. præc.*) ergo (*prop. 8. Coroll. 1.*) datâ circuli, & Hyperbolæ quadraturâ habetur recta axi CE parallela transiens per centrum gravit. figurâ CDE.

Datâ autem circuli quadraturâ habetur punctum O centrum gravitatis figuræ CDG (*prop. 53. Theor. 4.*) Si ducatur autem per O parallela XZ illa transit per centrum gravitatis figuræ CDE ut patet cum duas figuræ CDE, CGE sint æquales & similes, ergo datâ circuli quadraturâ habetur recta parallela XZ transiens per centrum gravitatis figuræ CDE.

Cum ergo datâ circuli & hyperbolæ quadraturâ habcantur duas rectas transentes per centrum gravitatis figuræ CDE, habebitur etiam centrum gravitatis ejusdem Figuræ. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Spatii vero integri CDXB centrum gravitatis infinitè distare ab axe CE ac proinde nullum esse ostendetur. Nam summa quadratorum DE, ordinatarum in toro illo spatio est solidum infinitum (*prop. 45. Coroll.*) ergo Rotundum ex illo spatio circa axem BC est infinitum. ergo cum spatium ipsum finitum sit (*prop. 53. Theor. 2.*) distantia centri gravitatis illius spatii ab axe BC est infinita. Quod ostendetur eodem modo quo *prop. 51. præcedens.*





DE CONCHOIDI BUS.

PARS QUARTA.

DE CONCHOIDE HYPERBOLICA.

Esco (fig. 20.) Hyperbola BC Circularis sive cuius axes sint æquales, sitque illius ~~centrum~~^{axis transversus AB}, vertex B, tangens BE. Producatur AB in F ita ut AB, BF sint æquales, & per omnia puncta E intelligentur duci ex A rectæ AEC occurrentes Hyperbolæ in C, sintque singulæ EG æquales respondentibus AC radiis Hyperbolæ.

Curva FGG vocabitur *Conchois Hyperbolica* cuius Polus A, Basis BE, Axis BF, Figura genitrix hyperbolica ABC.

Placet huic Conchoidi applicare methodos generales traditas in prima parte pro Conchoidibus omnibus, quemadmodum præstitum est circa Conchoidem Nicomedam & Conchoidem semicircularem. Itaque illius Conchoidis exhibebimus. 1. Dimensionem. 2. Rotunda circa Basin. 3. Rotunda circa Axem. 4. Centrum gravitatis. 5. Tangentem. Postremo demonstrabimus ea quæ Lalovera inventa & indemonstrata tradidit circa novam aliquam Figuram quæ magnam cum hac Conchoide Hyperbolica affinitatem habet.

PROPOSITIO LVI.

Proprietates quadam Circuli & Hyperbolæ.

1. **E**sco (fig. 21.) Hyperbola circularis BF, cuius axes AB, CED, centrum E. Diametro AB descriptus sit semicirculus ADB, & in quadrante BD sumpto punto G, ex illo ducatur tangens circulum GH, quæ occurrat in H, AB producatur, atque ex H ordinetur in Hyperbola HF.

Dico duas HG, HF æquales esse.

DEMONSTRATIO.

DEMONSTRATIO.

Quoniam (*Hyp.*) hyperbola BF circularis est five axes AB, CD habens æquales, Parametrum habet axi AB æqualem (*Conic.elem.*) ut autem axis AB ad suam Parametrum, ita Rectangulum AHB ad quadratum ordinatæ HF, ergo Rectangulum AHB æquatur quadrato HF. Jam ex proprietate circuli idem Rectangulum AHB æquatur quadrato Tangentis GH. Ergo quadrata GH, HF æquantur, ac proinde rectæ GH, HF. Quid erat demonstrandum.

2. **I** Isdem positis. Jungatur AF. Dico illam transire per punctum G.

DEMONSTRATIO.

Ex G sit in AB perpendicularis GK. Quoniam GH tangit circulum, tres EH, EB, EK sunt proportionales. Ergo EH + EB hoc est AH est ad EB + EK hoc est ad AK, ut EB ad EK, hoc est ut FG ad EK, hoc est ut GH ad GK. (propter similit. Triangulor. EGK, GHK.) Est autem GH æqualis FH (*num. i.*) ergo AH, AK :: FH, GK, quare recta AF transit per G. Quod erat demonstrandum.

3. **I** Isdem positis. Ex punto B ducatur BL tangens circuli ADB, & Hyperbolæ BF, quæ occurrat in L radio EG producto.

Dico EH, EL æquales esse.

DEMONSTRATIO.

Triangula EBL, EGH Rectangula & habentia communem angulum E, & latera EB, EG æqualia æquantur in omnibus, ergo rectæ EH, EL sunt æquales.

4. **I** Isdem positis. Ex punto F sit ad AF perpendicularis FL quæ occurrat in I rectæ AB productæ.

Dico rectas BH, HI æquales esse.

DEMONSTRATIO.

Quoniam angulus AFI rectus est, & FH perpendicularis ad AI, Rectangulum AHI æquatur quadrato FH. Est autem quadratum FH (*num. i. in demonst.*) æquale Rectangulo AHB, ergo Rectangula AHI, AHB æquantur inter se, ac proinde rectæ BH, HI sunt æquales. Quod erat demonstrandum.

5. **I**isdem positis. Dico rectam AI esse duplam rectæ EL.

D E M O N S T R A T I O .

Est enim AB dupla EB , & BI dupla BH (*num. 4.*) ergo AI dupla est EH , est autem EH æqualis EL (*num. 3.*) ergo AI dupla est EL. Quod erat demonstrandum

6. **I**isdem positis. Centro A , radio AB describatur quadrans circuli ABM occurrens in O rectæ AG.

Dico duos arcus BG , BO æquales esse,

D E M O N S T R A T I O .

Quoniam AB radius circuli BM duplus est AE radii circuli BD , manifestum est semicircumferentiam ADB esse æqualem arcui BM. Est autem arcus BG ad semicircumf. ADB ut angulus BAG ad angulum rectum BAM , & ut idem angulus BAG aut BAO est ad angulum rectum BAM ita est arcus BO ad arcum BM. ergo arcus BG æquatur arcui BO. Quod erat demonstrandum.

P R O P O S I T I O L V I I .

Iisdem positis (*fig. 27.*) Intelligantur singulæ AI hypotenuse Trianguli Rectanguli AFI(ductis AF ad omnia puncta curvæ BF , & FI ad illas perpendicularibus) erigi in punctis O respondentibus supra arcum BO perpendiculariter ad planum ABM. Ex omnibus AI ita erectis generabitur Figura aliqua Cylindrica cuius basis arcus BO.

Dico hujusmodi figuræ Cylindricæ exhiberi posse segmentum Hyperbolæ æquale.

D E M O N S T R A T I O .

Omnes rectæ EL erectæ in punctis G respondentibus supra arcum BG generant figuram quam vocavimus Figuram secantium, quamque *propof. 18.* ostendimus æquari segmento Hyperbolæ determinato. Est autem quælibet recta AI dupla EL sibi respondentis [*prop. præc. num. 5.*) ergo summa omnium AI erectarum supra arcum BG est dupla summæ omnium EL erectarum supra eundem arcum BG , ac proinde dupla segmenti Hyperbolici determinati. Quoniam autem arcus BG , BO sunt æquales (*prop. 56. num. 6.*) summa erectarum AI erectarum in G supra cum BG æquatur summæ earumdem AI erectarum in O supra arcum

BO (*method. Indivis.*) ergo summa rectarum AI erectarum in punctis O respondentibus supra arcum BO dupla est segmenti Hyperbolici determinati. Quod erat demonstrandum.

Dimensio Conchoidis Hyperbolice.

PROPOSITIO LVIII.

Iisdem positis. Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ quadrari sectorem Conchoidicum ARS.

DEMONSTRATIO.

EX propos. 3. Sector Conchoidicus ARS æquatur Triangulo ABP † Figuræ Hyperbolicæ genitrici ABF † Figuræ Cylindricæ genitrix ex hypotenuse AI erectis in punctis O respondentibus, supra arcum BO. Est autem (*prop. præc.*) hæc figura Cylindrica æqualis segmento Hyperbolico determinato. Ergo sector Conchoidicus ARS æquatur Triangulo ABP † figuræ Hyperbolicæ ABF † alteri segmento Hyperbolico determinato. Datâ autem quadraturâ hyperbolæ tam figura hyperbolica ABF quam segmentum hyperbolicum quadrantur, ergo data hyperbolæ quadraturâ, quadratur sector Conchoidicus ARS. Quod erat, &c.

Corollarium. Ex punto S ducatur ST ordinata Conchoidis Hyperbolicæ RS. Quoniam datâ hyperbolæ quadraturâ quadratur sector Conchoidicus ARS, eadem datâ quadrabitur segmentum Conchoidis Hyperbolicæ RST.

Dimensio Rotundorum ex Conchoide Hyperbolica circa Basin.

PROPOSITIO LIX.

Lemmata ad propos. sequent.

LEMMA I.

Esto (*fig. 22.*) Hyperbola circularis AQ cuius axis transuersus BA, centrum C, per C, recta CK perpendicularis ad BA. Ordinata TQ. Dico Rotundum ex segmento ATQ circa CK reduci ad sphæram.

DEMONSTRATIO.

Compleatur Rectangulum CDQT, & sit angulus DCE semirectus, compleatur etiam Rectangulum ACDF. Quoniam angulus DCE est semirectus Triangulum DCE Rectangulum est Isosceles, & latera CD, DE aequalia. Et quoniam Hyperbola AQ est circularis Rectangulum BTA aequatur quadrato ordinatae TQ (ut ostensum est in prop. 56. num. 1.)

Jam quadratum CT aequatur Rectangulo BTA + quadr. CA (2. Elem. Eucl. prop. 6.) ergo quadratum DQ (aequalē quad. CT) aequatur Rectangulo BTA, sive quadrato TQ, aut CD, aut DE + quadr. CA aut DF. Similiter ostendetur quæcunque alia ordinetur DQ in segmento Hyperbolico ACDQ ejus quadratum esse aequalē quadrato DE ordinatae in Triangulo CDE + quadrato DF. Ergo (Meib. Indivis.) summa quadratorum DQ aequatur summæ quadratorum DE, + summæ quadratorum DF. Cubatur autem utraque summa tam quadratorum DE, quam quadratorum DF. ergo & cubatur summa quadratorum DQ ordinatarum segmenti Hyperbolici ACDQ. Ergo summa circulorum quorum radii sunt DQ sive Rotundum ex segmento ACDQ circa CD reducitur ad sphæram. Est autem Cylinder ex Rectangulo CTQD circa CD aequalē Rotundo ex segmento CAQD citca CD + Rotundo ex ATQ circa eamdem CD. ergo Rotundum ex ATQ circa CD reducitur ad sphæram. Quod erat demonstrandum.

LEMMA II.

Iisdem positis sit alia quæcunque recta HI perpendicularis ad AB.

Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ Rotundum ex segmento ATQ circa HI reduci ad sphæram.

DEMONSTRATIO.

Quoniam Rotundum ex segmento ATQ circa CD reducitur ad sphæram (Lemm. 1. prec.) Datâ segmenti quadraturâ habetur (prop. 8. Coroll. 1.) recta parallela CD ac proinde & HI transiens per illius centrum gravitatis. Datâ autem hâc rectâ & quadraturâ segmenti ATQ, habetur (prop. 8. Coroll. 2.) Rotundum ex eodem segmento circa HI, ergo datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur Rotundum ex segmento ATQ circa HI. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO

PROPOSITIO. LX.

Resumatur Figura 21. in qua RS est Conchois Hyperbolica cuius Polus A, axis BR, basis BV, figura genitrix sector Hyperbolicus ABF.

Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ haberi Rotundum ex segmento Conchoidico RST circa basin BV.

DEMONSTRATIO.

Intelligatur descripta Hyperbola RQ similis & æqualis Hyperbolæ BF, occurrens in Q ordinatæ TS. Ex methodo generali tradita in prop. 5.) Rotundum ex segmento Hyperbolico RTS circa basin BV æquatur Rotundo ex segmento Hyperbolico RTQ circa AM. ergo (Lemm. 2. præc.) datâ Hyperb. quadraturâ habetur Rotundum ex segmento Conchoidico RST circa basin BV. Quod erat demonstrandum.

Dimensio Rotundorum ex Conchoide Hyperbolica circa axem.

PROPOSITIO. LXI.

Lemma ad prop. sequent.

Esto (fig. 23.) Hyperbola BE circularis cuius axis transversus AB, ordinata FH, ex B tangens BV. ex A ad curvæ BE omnia puncta F, f intelligentur ductæ rectæ AF, Af quæ occurant BV in P, p.

Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ cubari summam quadratorum BP, Bp applicatorum ad axem BH in punctis respondentibus H, h.

Sive quod idem est. Si ex punctis H, h rectæ BH, ordinentur HG, hg æquales tangentibus BP, Bp, respondentibus. Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ cubari summam quadratorum ordinatarum. HG, hg.

i. **E**x proprietate Hyperbolæ circularis BF quadratum ordinatæ HF æquatur Rectangulo AHB, ergo BH, HF: : HF, AH: ac proinde quadr. HF, quadr. AH: : BH, AH. Est autem quadr. HF, quadr. AH :: quadr. BP, quadr. AB; ergo quadr. BP, quadr. AB :: BH AH. Similiter ostenderetur quadr. Bp, quadr. AB :: Bp, Ah, & in-

vertendo quadr. AB, quadr. B p : A b, B b. Igitur ratio quadratorum BP, B p quæ componitur ex duabus 1. quadr. BP, quad. AB, 2. quadr. AB, quadr. B p. componitur etiam ex duabus æqualibus 1. BH, AH, 2. A b, B b. Sive quod idem est ex duabus BH, B b; A b, AH.

II. Ex puncto A sit AX perpendicularis ad AB, & centro A, asymptotis AX, AH descripta sit Hyperbola quæcunque KI cuius ordinatæ in B, b, H sint BK, b i, HI. Ex proprietate hujus Hyperbolæ A b, AH : HI, b i, ergo substitutæ ratione HI, b i loco rationis æqualis A b, AH. Ratio quadratorum BP, B p quæ componitur ex duabus BH, B b; A b, AH, componetur etiam ex duabus BH, B b; HI, b i. Quadratum igitur BP, est ad quadr. B p ut Rectang. BHI ad Rectang. B b i. Atque ita summa quadratorum BP, B p sive æqualium HG, b g est ad summam Rectangularium BHI, B b i ut quadratum BP aut HG ad Rectangulum BHI; quare si cubetur summa Rectangularium BHI, B b i cubabitur summa quadratorum BP, B p aut æqualium HG, b g.

III. Datâ autem Hyperbolæ quadraturâ cubatur summa Rectangularium BHI, B b i.

Nam 1. Summa Rectangularium AHI, A b i cubatur cum illa Rectangula ex proprietate Hyperbolæ KI sint æqualia.

2. Datâ hyperbolæ quadraturâ atque ideo segmenti BHIK cubatur solidum rectum cuius basis est idem segmentum BHIK altitudo AB, hoc autem solidum rectum nihil est aliud ut patet quam summa Rectangularium AB, HI; AB, b i; AB, BK; ergo datâ hyperbolæ quadraturâ cubatur summa Rectangularium BHI, B b i quæ differentia est summa Rectang. AHI, A b i. & summa Rectang. AB, HI; AB, b i. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO LXII.

DATâ Hyperbolæ quadraturâ (fig. 21.) habetur Rotundum ex segmento Conchoidico RST circa axem RT.

DEMONSTRATIO.

AD hoc ostendendum, probandum est tantum (prop. 6.) datâ Hyperbolæ quadraturâ cubari summam quadratorum omnium AS Conchoidis radiorum applicatorum in punctis T respondentibus ad axem RT.

Cubabitur autem hæc summa. si cubentur tres summae, quæ simul sumptæ illi sunt æquales. 1. Quadratorum AP 2. Quadratorum PS 2. Rectangularium APS bis. applicatis omnibus his tam quadratis quam Rectangulis ad axem RT in punctis T respondentibus. Cubantur autem hæc tres summae datâ hyperbolæ quadraturâ, quod sic ostendetur.

I. Summa quadratorum AP applicatorum in T æquatur summæ eorumdem quadrat. AP applicatorum in H , cùm rectæ BH , RT æquales sint (*prop. 4. Coroll.*) & summa quadr. AP applicatorum in punctis H æquatur summæ quadr. AB + summæ quadr. BP applicatorum in H . Atqui summa quadr. AB applicatorum in H cubatur ut paret. Summa etiam quadratorum BP applicatorum in H cubatur (*prop præc.*) datâ Hyperbolæ quadraturâ , ergo eâdem datâ hyperb. quadraturâ summa quadratorum AP applicatorum in H cubatur.

II. Summa quadratorum PS applicatorum in T , aut quod idem est summa quadratorum AF applicatorum in H absolute cubatur. Cùm enim quodlibet quadratum AF æquetur quad. AH + quadr. HF . Summa quadratorum AF æquatur summæ quadratorum AH + summæ quad. HF . Summa autem quadrat. AH cubatur (cùm AH applicatæ in H & BR sint ordinatæ Trapezii) summa etiam quadratorum HF cubatur , quoniam summa circulorum radiorum HF reducitur ad sphæram cùm nihil sit aliud quàm Conois Hyperbolica genita ex BHF circa axem BH .

III. Summa Rectangulorum APS aut AF , AP applicatorum in T aut quod idem est in H cubatur absolute. Nam in Triangulis ABP , AFI rectangulis & similibus , AI , AF :: AP , AB . Ergo Rectangulum AI , AB æquatur Rectangulo AF , AP & summa Rectangulorum AI , AB æquatur summæ Rectangulorum AF , AP . Cubatur autem summa Rectangulorum AI , AB applicatorum in H . Cùmenim BH , HI sint æquales (*prop. 56. num. 4.*) AI æquatur AB + 2 . BH . Jam rectæ AB applicatæ in H , constituunt Rectangulum , & BH applicatæ in H triangulum , unde BI æquales duplo BH constituunt etiam Triangulum , quare rectæ AI applicatæ in H constituunt figuram rectilineam compositam ex Rectangulo & triangulo . Summa igitur Rectangulorum AB , AI applicatorum in H est solidum rectum cuius altitudo AB , basis autem figura rectilinea nota... quare summa Rectangulorum AB , AI vel illius æqualium AF , AP applicatorum ad H cubatur , & illius summæ duplex , ergo , &c. Quod erat demonstrandum.

De centro gravitatis Conchoidis Hyperbolicae.

PROPOSITIO LXIII.

E Sto (*fig. 21.*) alterum segmentum Conchoidis Hyperbolæ RTZ æquale & simile segmento RTS , & habens eumdem axem RT .

Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ haberi centrum gravita-

tis figuræ RST. Haberi etiam segmenti RST.

D E M O N S T R A T I O .

Datâ Hyperbolæ quadraturâ, quadratur segmentum Conchoidicum RST (*prop. 58. coroll.*) Habetur autem etiam datâ hyperbolæ quadraturâ, Rotundum ex eodem segmento RST circa BV basin (*prop. 60.*) ergo (*prop. 8. Coroll. 1.*) datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur recta parallela BV, transiens per centrum gravit. segmenti RST. Manifestum est autem punctum in quo talis recta secat axem BRT esse centrum graxit. figuræ RST, ergo datâ hyperb. quadraturâ habetur centrum gravitatis figuræ RST. Quod erat primum.

Præterea datâ Hyperb. quadraturâ habetur Rotundum ex segmento RST circa axem RT (*prop. 62.*) ergo habetur (*prop. 8. coroll. 1.*) recta axi RT parallela transiens per centrum gravit. segmenti RST. Habetur autem & alia (ut probatum est in prima parte hujus propos.) parallela BV & transiens per idem centrum gravit. segmenti RST. Ergo datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur centrum gravit. segmenti RST. Quod erat demonstrandum.

De Tangente Conchoidis Hyperbolicae.

P R O P O S I T I O L X I V .

Inveniri potest Tangens Conchoidis Hyperbolicæ in dato illius puncto.

D E M O N S T R A T I O .

Haberur tangens curvæ genitricis BF quæ est hic Hyperbola, ergo (*prop. 9.*) habetut tangens Conchoidis Hyperbolicæ RS. Quod erat demonstrandum.

Plures dare possemus constructiones ad inueniendam hujus Conchoidis tangentem, quemadmodum fecimus pro Conchoide semicirculari. Sed non arbitramur operæ pretium esse hic immorari.

P R O P O S I T I O L X I V .

PROPO.

PROPOSITIO LXV.

*In qua demonstrantur ea quæ Doctissimus P. Lalovera
sine demonstratione tradidit circa novam quam-
dam figuram quæ maximam cum Conchoide
Hyperbolica affinitatem habet.*

Esto (fig. 21.) Curva RN talis naturæ ut quælibet ejus or-
dinata TN sit ad TQ ordinatam Hyperbolæ RQ ut BR
diameter Hyperbolæ ad BT.

Ait P. Lalovera (*de Cycloid: Appendice 2. num 5.*) duo hæc
se invenisse datâ Hyperbolæ quadraturâ.

1. Quadraturam Figuræ RTN.

2. Centrum gravitatis figuræ RNX compositæ ex duabus
RTN, RTX æqualibus & similibus.

Hæc duo sic demonstrabimus.

I. Quadratura Figuræ RTN.

Sit AB æqualis BR & Hyperbola BF æqualis & similis Hyperbolæ
RQ & Conchois Hyperbolica RS genita ex Hyperbola BF, Polo
A, axe BR, basi BV.


Quoniam [hyp.] BR, BT :: TN, TQ & AB æqualis est BR ; AB,
BT :: TN, TQ. Atqui ex proprietate Conchoidis RS, [prop. 4. coroll. I.]
AB, BT :: QS, QT. ergo TN, TQ :: QS, QT ac proinde TN, QS
sunt æquales. Cum ergo hoc semper eveniat quæcunque TS parallela
ducatur, sequitur figuram RTN æquari figuræ RQS. Atqui datâ Hy-
perbolæ quadraturâ, quadratur segmentum Conchoidicum RTS
(prop. 58. Coroll.) & segmentum Hyperbolicum RTQ, ac proinde eo-
rum differentia RQS, ergo datâ Hyperbolæ quadraturâ quadratur fi-
gura RTN. Quod erat ostendendum.

II. Centrum gravitatis figuræ RNX.

Quoniam AB, BT :: TN, TQ. Si supponamus rectam AT esse li-
bram, cuius centrum B, segmentum hyperbolicum RTQ sus-
pensum ex A extremo brachii BA æquiponderabit figuræ RTN ut jacet
pendenti ex brachio BT (ex princip. Archimed. in lib. de Parabola.)











Supponatur rectam parallelam TQ & transeuntem per centrum grav. figuræ RTN. secare axem RT in punto Y. erit AB ad BY ut reciprocè figura RTN ad segmentum hyperbolicum RTQ pendens ex A. Datâ autem hyperb. quadraturâ, quadratur figuræ RTN (i. part. præf. prop.) atque ita habetur illius ratio ad segmentum hyperbolicum RTQ, quod etiam datâ Hyperb. quadraturâ quadratur ut patet. Ergo datâ hyperb. quadr. habetur ratio AB,BY. ac proinde punctū Y. Est autem Y centrum gravitatis figuræ RNX compositæ ex duabus RTN , RTX similibus & æqualibus , ergo datâ hyperb. quadraturâ habetur centrum gravit. figuræ RNX. Quod erat demonstrandum.





hoc solūm differunt quēd in Conchoide rectæ FI æquales radiis AE
sumantur ultra DX basin ; In Ciffoide vero CG , rectæ FG eisdem ra-
diis æquales sumuntur citra DX regrediendo versus A. Cūm igitur
utriusque figuræ Conchoidis & Ciffoidis generatio tam similis sit , hinc

De Conchoidibus



Pag. 83.

1000 ft. above sea level, 8 miles from
the coast. A small town, All roads paved,
and there is a good supply of water. The climate
is very healthy, and the air is pure.



DE CISOIDIBUS.

EXERCITATIO GEOMETRICA.

DEFINITIONES.

Esto (fig. 1.) angulus rectus ADX, & quæcunque figura ABK; ex puncto A ad singula puncta E linea BK intelligantur duci rectæ AE, quæ occurrant in F rectæ DX, & in recta AF sumantur FG æquales respondentibus AE, sit etiam DC æqualis ipsi AB.

Linea CGG transiens per omnia puncta C, G hoc modo inventa vocatur *Cissois*, cuius *Polus* A, *axis* CD, *figura genitrix* ABK, *basis* DX.

Hinc patet unamquamque lineam sive rectam, sive curvam suam habere Cisoidem, imo ex quacunque generari posse infinitas Cisoides variando nimirum Polum aut Basin quod infinitis modis fieri potest.

Constat etiam unamquamque lineam sive rectam sive curvam esse Cisoidem alterius imo infinitarum. Sit verbi gratia curva CGG extra quam ad libitum sumpto punto A, & ultra A & CG ductâ utcunque rectâ DX, si intelligantur singuli radii AC, AG occurrere in D, F, rectæ DX, atque ex punto A sumi AB, AE æquales ipsis DC, FG, manifestum est curvam CGG fore Cisoidem linea BEK.

Vides ex ipsa generatione Cisoidis magnam esse illi cum Conchoide affinitatem. Nam Cissois CG, & Conchois HI (fig. 1.) eodem Polo A, eadem basi DX, eademe figura genitrici ABK generata, hoc solùm differunt quod in Conchoide rectæ FI æquales radiis AE sumantur ultra DX basin; In Cisioide vero CG, rectæ FG eisdem radiis æquales sumuntur citra DX regrediendo versus A. Cum igitur utriusque figuræ Conchoidis & Cisoidis generatio tam similis sit, hinc

in cæteris earum proprietatibus mira conformitas existit, quam in hoc tractatu explicare aggredimur.

I. Igitur quemadmodum circa Conchoides fecimus, atque ex iisdem ferè principiis, hic Methodos generales trademus ad invenienda in Cissoidibus hæc quinque. 1. Earum dimensionem. 2. Rotunda circa basi. 3. Rotunda circa axem. 4. Centra gravitatis. 5. Tangentes.

II. Methodos illas applicabimus uni speciatim Cissoidi quæ ex semicirculo generatur Polo in extremitate diametri constituto. Hanc autem præ aliis illustrandam sclegimus, quoniam inde dabitur occasio fusiùs agendi de nobilissima Cissoidi quæ Dioclea appellatur, & una est ex Cissoidibus semicircularibus.

III. Perpetuam admirabilēmque inter Conchoides & Cissoides quæ ex eadem figura, eodem polo, eadēmque basi generantur affinitatem & Analogiam demonstrabimus, circa Aream, Rotunda, Centra gravitatis, Tangentes.

PROPOSITIO I.

Methodus generalis ad dimensionem Cissoidum.

Esto (fig. 2.) Cissoidis CZ, cuius Polus A, Axis CD, Basis DX, Figura genitrix ABK, ex Polo A ducta quæcunque AF quæ occurrat in E curvæ genitrici BK, in G Cissoidi CG, in E basi DX.

Ex omnibus punctis E curvæ BE intelligantur rectæ EI perpendicularares ad AE & occurrentes axi AB in I. (*ad vitandam linearum confusionem unam solum EI in figura expressimus quæ cæteras omnes representabit.*) Centro A radio AD describatur arcus circularis DL occurrens in L rectæ AF.

Jam intelligatur singulas AI Hypotenusas angulorum rectorum AEI erigi in punctis L respondentibus supra arcum DL & constituere figuram aliquam Cylindricam.

Dico sectorem Cissoidicum ACG æquari Triangulo ADF — figur. genitric. ABE & differentia inter prædictam figuram Cylindricam & duplum figuræ genitricis.

DEMONSTRATIO.

I. **Q**uodlibet quadratū AF æquatur ex elementis quadr. AE + quadr. EF + Rectang. AEF bis, sive Rectang. AF, AE bis — quadr. AE bis

$AE \text{ bis.}$ — Ergo summa quadr. AF applicatorum ad arcum DL extensum in lineam rectam æquatur summa quadr. $AE +$ summa quadr. $EF +$ summa Rectang. $AF, AE, bis.$ — summa quadrator. AE bis, applicando omnia ad arcum BL .

II. Summa autem quadr. AF appli. ad arcum DL æquatur solido recto cuius basis Triangulum ADF , altitudo dupla AD (*de Conchoid. prop. 2.*)

Similiter summa quadr. AE applic. ad arcum DL æquatur solido recto cuius basis figura ABE altitudo dupla AD .

Et summa quadrat. EF sive AG (cùm enim ex natura Cissoidis AE, GF æquentur, additâ aut ablatâ communi EG duæ AG, EF æquantur) summa inquam quadr. EF vel AG æquatur solido recto cuius basis figura ACG , altitudo dupla AD .

Summa verò bis sumpta Rectangularium AF, AE applic. ad arcum DL , æquatur (*Lemm. prop. 3. de Conchoid.*) solido recto cuius basis figura Cylindrica genita ex hypotenuse AI ereditis in L supra arcum DL , altitudo autem dupla AD .

Denique summa quad. AE bis sumpta applic. ad DL , æquatur solido recto cuius basis figura ABE bis, altitudo dupla AD . (*prop. 2 de Conchoid.*)

III. Ergo solidum rectum cuius basis Triang. ADF altitudo dupla AD , æquatur solido recto cuius basis figura ABE , altit. dupla AD + solido recto cuius basis figura ACG altitudo eadem. + solido recto cuius basis figura cylindrica ex hypotenuse AI , altitudo eadem — solido cuius basis duplum figuræ ABE altitudo eadem. Hoc est cum eorum solidorum sit eadem altitudo, Solidum rectum cuius basis Triang. ADF altitudo dupla AD æquatur solido recto cuius altitudo eadem, basis autem est $ABE + ACG +$ Figura Cylindr. prædicta — duplū ABE . Ergo cùm solida recta ejusdem altitudinis sint inter se ut bases, Triangulum ADF æquatur fig. $ABE +$ fig. $ACG +$ Figuræ Cylindr. prædictæ — duplo figuræ ABE . hoc est Triang. ADF æquatur figuræ $ABE +$ fig. $ACG +$ differentiæ inter Figuram Cylindr. prædictam & duplum figuræ ABE .

IV. Ergo figura ACG Cissoidica æquatur Triangulo ADF — figuræ genitrici ABE & differentiæ inter Figuram Cylindricam ex hypotenuse AI & duplum figuræ genitricis ABE . Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO II.

Methodus præcedens applicatur Cissoidi semicirculari.

E Sto (fig. 3.) Cissois CGZ cuius Polus A , axis CD , basis DX , figura genitrix semicirculus AEB . & recta quæcumque AEF occurrens Cissoidi in G , basi in F .

Inter AB, AD sit media proportionalis AH, & radio AH describatur quadrans circuli AHM occurrentis in rectæ AE.

Dico sectorem Cissoidicum ACG æquari Triangulo ADF imminuto figura genitricë ABE & duplo figuræ BHIE duobus arcubus BE, HI & rectis BH, EI comprehensæ.

DEMONSTRATIO.

EX singulis punctis E curvæ genitricis BE intelligantur perpendiculares ad rectas AE, illæ perpendiculares coibunt cum AB in punto B, quoniam anguli AEB in semicirculo recti sunt. Hypotenusa ergo angularum rectorum AEB sunt semper æquales rectæ AB.

Centro A radio AD describatur arcus circuli DL occurrentis rectæ AF in L. Quoniam (*hyp*) tres AB, AH, AD sunt proportionales, arcus HI est ad arcum DL ut AH ad AD sive AB ad AH, quare Rectangulum sub AB & arcu DL (hoc est figura Cylindrica genita ex hypotenuse AB supra arcum DL) æquatur Rectangulo sub AH & arcu HI hoc est duplo sectoris AHL.

Est autem figura BHIE bis sumpta, differentia inter sectorem AHI bis sumptum & figuram genitricem ABE bis sumptam, ergo eadem figura BHIE bis sumpta est differentia inter figuram Cylindricam gentam ex Hypotenuse AB erekta supra arcum DL, & duplum figurae genitricis ABE.

Atqui ex propos. præcedenti sector Cissoidicus ACG æquatur Triangulo ADF — figuræ genitrici ABE & differentiæ inter figuram Cylindricam ex hypotenuse AB, & duplum figuræ genitricis ABE.

Ergo idem sector Cissoidicus ACG æquatur Triangulo ADF imminuto figura genitricë ABE & duplo figuræ BHIE. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Addendo utrinque duplum figuræ BHIE, sector Cissoidicus ACG + duplum figuræ BHIE æquatur Triangulo ADF — figuræ genitrici ABE, hoc est figuræ BDFE.

PROPOSITIO III.

Iisdem positis (*fig. 3.*) Dico figuram Cissoidicam CDFG æquari figuræ genitrici ABE + duplo figuræ BHIE. Et totum spatum Cissoidicum CDXZ æquari semicirculo generatori AEB + duplo figuræ BHMAE.

DEMONSTRATIO.

Quoniam (*Coroll. propos. præc.*) $ACG + \text{duplo figurae } BHIE$ æquatur figurae $BDFE$, addendo utrinque figuram ABE , $ACG + BHIE$ bis $+ ABE$ æquatur $BDFE + AB E$ sive Triangulo ADF ; ergo tollendo utrinque ACG , $BHIE$ bis $+ ABE$ æquatur $CDIG$. Quod erat primum.

Deinde cum $CDFG$ semper æquetur $ABE + BHIE$ bis, qualisunque sit angulus DAF , sequitur quando angulus DAF rectus est, puncto F infinitè distante à D , totum spatium Cissoidicum $CDXZ$ æquari semicirculo $AEB + \text{duplo figurae } BHM AE$. Quod erat secundo loco demonstrandum.

PROPOSITIO IV.

Determinare rationem spatiis Cissoidici $CDXZ$ ad semicirculum genitorem AEB .

Sit AN (*fig. 3.*) quarta pars AB diametri semicirculi genitoris AEB , & O centrum ejusdem semicirculi.

Dico semicirculum genitorem AEB esse ad spatium Cissoidicum $CDXZ$ ut AN ad $AN + OD$.

DEMONSTRATIO.

Centro A radio AB sit descriptus quadrans circuli ABP , facile ostendi potest semicirculum AEB esse dimidium quadrantis ABP . hoc posito Semicirculus AEB ad quadrantem AHM est in ratione composita.

1. Semicirc. AEB ad quadrantem ABP sive 1. ad 2. aut AO, AB .

2. Quadrantis ABP ad quadrantem AHM , id est quadrat. AB ad quadrat. AH , vel rectæ AB ad rectam AD , cum tres AB, AH, AD sint ex hyp. proportionales.

Duæ autem rationes $AO, AB & AB, AD$ componunt rationem AO, AD , ergo semicirculus AEB est ad quadrantem AHM ut AO ad AD . & dividendo semicirculus AEB est ad figur. $BHMAE$ ut AO ad OD . ergo semicirculus AEB est ad duplo figurae $BHMAE$ ut AN dimidia ipsius AO ad OD . & componendo semicirculus AEB est ad eundem semicirc. $AEB + \text{duplo figurae } BHMAE$ hoc est (*prop. præc.*) ad spatium Cissoidicum $CDXZ$ ut AN ad $AN + OD$. Quod erat demonstrandum.

C O R O L L A R I U M .

Si habeatur in numeris ratio AB, AD facile determinabitur in numeris ratio semicirculi genitoris ad spatium Cissoidicum.

Fiat enim ut AB ad AD ita numerus 4. ad alium Z. Dico ut 1. est ad Z — 1. ita semicirculum AEB esse rd spatium Cissoidicum CDXZ.

Qualium enim AB est 4. talium AO est 2. & AN 1. est autem AD æqualis Z, ergo OD est Z — 2 & AN + OD est 1. + Z — 2 hoc est Z — 1. ut autem AN ad AN + OD ita ex præsenti propos. semicirculus AEB est ad spatium Cissoidicum CDXZ, ergo semicirculus est ad spatium ut 1. ad Z — 1.

Exempla. Sit AB tertia pars ipsius AD, ergo AB ad AD ut 4. ad 12. ergo semicirc. AEB ad spatium Cissoidicum CDXZ ut 1. ad 12. — 1. sive ut 1. ad 11.

Sit AB ad AD ut 1. ad 2. ergo erit ut 4. ad 8. ac proinde semicirculus erit ad spatium Cissoidicum ut 1. ad 8 — 1 sive ut 1. ad 7.

Sit AB ad AD ut 1. ad 1. sive AB, AD sint æquales, erit ergo AB ad AD ut 4. ad 4. & semicirculus AEB ad spatium Cissoidicum CDXZ ut 1. ad 3.

L E M M A T A .

Ad propositiones sequentes.

Esto (fig. 4.) semicirculus AEB & quadrans circuli ABM
I. Dico quadrantem circuli ABM esse duplum semicirculi AEB.

Cùm enim AB radius quadrantis ABM sit duplus AD radii semicirculi AEB, circulus radii AB quadruplus est circuli radii AD. ergo quadrans ABM æquatur circulo radii AD sive duplus est semicirculi AEB.

II. Ex punto A ducatur quævis AL quæ occurrat arcui BM in L & arcui AEB in E.

Dico segmentum BEL duplum esse segmenti BE.

Jungatur DE. Sector ABL est ad sectorem BDE in ratione composita ex his tribus.

1. Sectoris ABL ad quadrantem ABM hoc est anguli BAL ad angulum rectum BAM.

2. Quadrantis ABM ad semicirculum AEB hoc est 2. ad 1.

3. Semicirculi AEB ad sectorē DBE, hoc est duorum angulorū rectorū ad angulum BDE sive anguli recti BAM ad dimidium anguli BDE.

Prima autem & tertia ratio anguli BAL ad angulum BAM, & anguli BAM ad angulum BAL dimidium anguli BDE se mutuo elidunt.

Ergo

Ergo sector BAL est ad sectorem DBE ut quadrans ABM ad semi-circulum AEB, sive ut 2. ad 1. est autem & Triangulum ABE duplum Trianguli DBE, ergo reliquum segmentum BEL est duplum reliqui segmenti BE. Quod erat demonstrandum,

PROPOSITIO V.

Dimensio Dioclea ejusque segmentorum.

Hac propositione completemur non solum quæcunque à Vallisio aliquisque inventa sunt circa aream Dioclea, sed etiam alia fatis eximia quæ à nobis reperta sunt.

Sed antè omnia supponendum est Diocleam esse unam ex Cissoidibus semicircularibus de quibus actum est in præcedentibus tribus propositionibus.

Sit enim (fig. 4.) Dioclea AZ cuius axis AB, asymptotus BF, radio AB descriptus semicirculus AEB.

Ostendendum est Diocleam AZ esse Cissoidem genitam ex semicirculo AEB ; Polo A, axe AB, basi BF.

Ducatur per A & G quocunque Dioclea punctum recta AGEF occurrens in E semicirculo AEB & in F recta BF. Per G ducatur NG perpendicularis ad AB occurrens in Q semicircumferentia AEB. ex E ducatur etiam EP perpendicularis ad eamdem AB. His positis.

Proprietas Dioclea omnibus nota est quod GN ejus ordinata est ad NA, ut NQ ordinata semicirculi AEB ad NB. igitur GN, NA :: NQ, NB. sed GN, NA :: EP, PA in Triangulo APE. Ergo EP, PA :: NQ, NB; quare quadr. EP est ad quadr. PA, hoc est BP ad PA, ut quadratum NQ ad quadr. NB hoc est ut AN ad NB. & componendo, BP, BA :: AN, AB. Ergo BP, AN sunt æquales. Ut autem BP ad AN ita est FE ad AG in Triangulo ABF, ergo FE, AG sunt æquales, & additâ vel sublatâ communi GE, duæ AE, FG sunt etiam æquales, Quod cum eveniat quæcunque ducatur AF, constat ex generatione Cissoidum anteà tradita Diocleam AGZ esse Cissoidem generatam ex semicirculo AEB, Polo A, axe AB, Basi BF. Quod erat ostendendum.

Hoc ita supposito veniamus ad Dimensionem Dioclea.

THEOREMA I.

Dimensio sectoris concavi Dioclea.

Dico sectorem concavum Dioclea ACG æquari Triangulo ABF imminuto figura genitrix ABE & segmento circulari BE bis sumpto.

DEMONSTRATIO.

Quoniam Dioclea AZ est Cissois semicircularis, cuius Polus A, axis AB, basis BF, figura genitrix semicirculus AEB; sector Cissoidicus ACG (*prop. 2.*) æquatur Triangulo ABF imminuto figura genitrix ABE & duplo figuræ BEL contentæ duobus arcibus BE, BL. Quoniam autem segmentum BEL contentum rectis BE, EL & arcu BL, duplum est (*Lemm. præc.*) segmenti BE, segmentum BE æquatur figuræ BEL contentæ arcibus BE, BL, ac proinde duplum figuræ BEL æquatur duplo segmenti BE. Ergo sector Cissoidicus ACG æquatur Triangulo ABF imminuto figura genitrix ABE & duplo segmenti circularis BE. *Quod erat demonstrandum.*

THEOREMA II.

Dimensio segmenti convexi Dioclea.

Iisdem positis (*fig. 4.*) Dico segmentum convexum ABFG Dioclea æquari figuræ genitrici ABE + duplo segmenti circularis BE.

DEMONSTRATIO.

Segmentum ABFG (*prop. 3.*) æquatur ABE + duplo BLE, est autem ut modò ostendimus BLE æquale segmento BE, ergo segmentum ABFG æquatur figuræ genitrici ABE + duplo segmenti BE. *Quod erat demonstrandum.*

THEOREMA III.

Dimensio spatii integri Dioclea.

Iisdem positis (*fig. 4.*) Dico spatium integrum Dioclea ABXZ esse triplum semicirculi AEB.

DEMONSTRATIO.

Quodcunque segmentum ABFG æquatur ut modò diximus (*Theor. 2.*) figuræ ABE + duplo segmenti BE. Segmentum autem ABFG abit in spatiū integrū ABXZ puncto F infinitè recedente à B, sector autem ABE simul abit in semicirculum AEB puncto E abeunte in punctū A. & duplū segmenti BE abit similiter in duplū semicirculi AEB. Ergo spatiū integrū ABXZ æquatur semicirculo AEB + eidem semicirculo AEB bisumpto, sive triplū est semicirculi genitoris AEB. Quod erat demonstrandum.

THEOREMA IV.

Dimensio sectorum convexorum Diocleæ.

Iisdem positis, (fig. 4.) jungatur BG.

Dico sectorem convexum BAG Diocleæ esse triplū segmenti circularis BE.

DEMONSTRATIO.

Quoniam ex proprietate Cissoidis AGZ, rectæ AE, FG sunt æquales, ablata aut addita communi GE, duæ AG, EF sunt etiam æquales, quare duo Triangula BAG, BEF sunt æqualia (*Elem. Eucl.*) Deinde sector concavus Diocleæ ACG (*Theor. 1.*) æquatur Triangulo ABF imminuto figura ABE & duplo segmenti BE, ergo addendo utrinque triplū segmenti BE, sector Diocleæ ACG + triplū segmenti BE, æquatur Triangulo ABF + segmento BE — figuræ ABE. Hoc est Triangulo BEF aut æquali BAG. Ergo ablato communi sectore Diocleæ concavo ACG, sector convexus BACG Diocleæ est triplus segmenti circularis BE. Quod erat demonstrandum.

THEOREMA V.

Dimensio Figuræ contentæ Diocleæ portione & arcu circuli.

Iisdem positis. Ex puncto G Diocleæ ducatur GN perpendicularis ad AB & producatur donec occurrat in O semiperipheriae AOB, jungaturque AO.

Dico Figuram ACGO contentam Diocleæ portione ACG & arcu AO, rectaque GO esse quadruplam segmenti AO.

DEMONSTRATIO.

EX punto E sit EP perpendicularis ad AB. Quoniam ut diximus in demonstr. Theor. 4. duæ AG, EF sunt æquales, etiam AN, BP illis proportionales (*Elem.*) æquales sunt. Quare circuli ejusdem segmenta BE, AO sunt æqualia.

Deinde ex proprietate Dioclez GN, AN : : ON, NB. Ergo Triangulum OAN æquatur Triangulo BGN, & additâ communi figura ACGN, figura ACGO æquatur sectori convexo Dioclez ACGB. Est autem ACGB (*Theor. 4.*) triplum segmenti BE, ergo ACGO trilineum contentum curva ACG & rectis GO, AO triplum est segmenti AO, quare addito segmento eodem AO, Figura ACGO contenta curva Dioclez ACG, arcu AO & recta GO quadruplicata est segmenti AO. Quod erat demonstrandum.

THEOREMA VI.

Quadratura Figuræ contentæ arcibus circuli & curva Dioclez.

Esto (fig. 5.) Dioclea ABX, cuius Polus A, axis AC, basis CZ, semicirculus genitor ABC cuius centrum E. Perficiatur circulus ABCD in quo sit inscriptum quadratum ABCD, & circumscriptum quadratum OPQR. Ex punctis P, Q, R ut centris sint descripti tres quadrantes circuli BGC, CHD, DIA.

Dico Figuram AFBGCHDIA comprehensam tribus circuli quadrantibus prædictis & curva Dioclez AFB æqualem esse quadrato CEBP.

DEMONSTRATIO.

Sector Dioclez convexus CAFB contentus rectis CA, CB & curva Dioclez AFB est triplus segmenti circularis BLC (*Theor. 4.*) aut illi æqualis BGC. Ergo Figura AFBGC est dupla segmenti BGC aut æqualis est Figuræ BGCL. Ergo addendo ex una parte figuras CHDE, DIAE, & ex altera figuras æquales CGBE, CLBP. Figura AFBGC-HDIA æquatur quadrato BECP. Quod erat demonstrandum.

THEOREMA

THEOREMA VII.

Quadratura totius spatii contenti arcu semicirculi generatris, curvâ infinitâ Diocleæ, ejusque asymptoto.

Iisdem positis (fig. 5.) Dico totum spatium contentum semi-peripheria ABC, curva infinita Diocleæ ABX & asymptoto CZ, æquari quadrato OPQR circumscripto circulo ABCD.

DEMONSTRATIO.

TO tum hoc spatium componitur ex duobus, quorum primum est Figura AFBK, alterum spatium BLCZX.

I. Ostensum est in Theor. 6. figuram AFBGC esse æqualem figuræ BGCL, cum igitur BGCE æquetur AKBO, sequitur AFBE + AKBO æquari BGCL. Quadrata autem AEBO, BECP sunt æqualia, ergo AFBK æquatur BGCE + BPCL, hoc est BLCP + AKBO.

II. Totum spatium Diocleæ ACZX est triplum semicirculi ABC (Theor 3.) ergo æquale est circulo ABCD + semicirculo ACB. Deinde ostensum est in demonstr. Theor. 6. spatium AFBLC esse duplum BLCG, ergo est quadruplum segmenti BLC.

Si ergo ex spatio Diocleæ ACZX auferatur figura AFBLC supererit spatium BLCZX. & si ex circulo ABCD + semicirc. ACB auferatur quadruplum segmenti BLC, supererit quadratum ABCD + semicirculus ABC, hoc est Rectangulum AQ (æquale quadrato ABCD) + semicirculus ABC. & cum tota & ablata sint ostensa æqualia, duo reliqua sunt æqualia scilicet spatium BLCZX æquale est Rectangulo AQ + semicirculo ACB. Si igitur spacio BLCZX addatur AFBK, & Rectangulo AQ + semicirculo ABC, BLCP unà cum AKBO quæ num. 1. ostensa sunt æqualia figuræ AFBK. Totum quadratum OPQR inventur æquale figuræ AFBK + spatio BLCZX. Quod erat demonstrandum.

Dimensio alterius speciei Cissoidis semicircularis.

HAc tenus dedimus dimensionem Cissoidum semicircularium, sive asymptotus DX (fig. 3.) secet AB diametrum semicirculi generatris in D supra B; sive asymptotus BX (fig. 4.) secet AB in B in quo casu Cissois est Dioclea. Placet nunc ad perficiendam hanc doctrinam tertium casum examinare quando nimis rùm asymptotus fecat AB inter A

& B, quo sit ut generetur Cissois semicircularis à prioribus longè diversa. Et quod eximium est, hujus integræ Cisloidis Quadraturam absolutam exhibebimus in eo casu quo asymptotus transit per centrum semicirculi genitoris.

Sit igitur (*Fig. 6.*) Cissois CGAZ, cuius Polus A, semicirculus genitor AEB, basis aut asymptotus DX quæ secet AB inter A & B. axis CD. O punctum ubi DX secat circumferentiam AEB.

In hac Cissoide hoc est speciale quod una illius portio CGA jaceat infra A & altera AZ supra. Portio CGA generatur ab arcu BO, nam ex generatione DC æquatur AB, & FG ipsi AE. Cum autem AB, AE, sint majores quam AD, AF, sequitur DC majorem esse quam DA & FG quam FA, ac proinde puncta C, G sunt infra A. Altera Cisloidis portio AZ generatur ex arcu OA, & propter eamdem rationem posita est supra punctum A. Hoc supposito.

Quæramus primò dimensionem Figuræ AGC, deinde dimensionem spatii ADXZ, ex his enim duobus habebitur dimensio totius hujus Cisloidis sub axe CD, asymptoto infinita DX, & curva integra CGAZ comprehensæ.

PROPOSITIO VI.

Dimensio Figurae AGC.

Jungatur recta AO, & radio AO describatur quadrans circuli HOM qui secet AB in H, & in I quamlibet GAE duam inter AB, AO.

Dico segmentum circulare ABO genitorem Cisloidis AGC æquari Triangulo ADO + Cisloidi AGC + duplo segmenti circularis DHO.

DEMONSTRATIO.

CEntro A radio AD describatur arcus circuli DN qui occurrat in L, N rectis AE, AO; jungatur etiam BE.

Angulus AEB in semicirculo rectus est, ergo Triangula rectangula ABE, ADF sunt similia, quare AB, AE :: AF, AD, ergo Rectangulum AE, AF æquatur Rectangulo AB, AD, & summa Rectangulorum AE AF applicatorum in punctis L ad arcum DN extensem in linem rectam, æquatur summa Rectangulorum AB, AD applicatorum in iisdem punctis L ad eundem arcum DN.

Summa autem Rectangulorum AB, AD applicatorum ad arcum DN

æquatur solido recto cuius altitudo AD, basis autem figura Cylindrica facta ex linea AB erecta supra omnia puncta arcus DN, sive solido recto cuius basis altitudo dupla AD, basis dimidium ejusdem figuræ cylindricæ, ergo summa Rectangulorum AE, AF applicatorum ad arcum DN æquatur eidem solido recto cuius altitudo dupla AD basis autem dimidia figuræ Cylindricæ factæ ex AB supra arcum DN.

Quoniam autem ex proprietate circuli, AO & consequenter AH est media proportionalis inter AD, AB, figura Cylindrica facta ex AB erecta supra arcum DN, æquatur figuræ Cylindricæ factæ ex AH supra arcum HO (*constat ex demonstr. prop. 2. de Cœfoid.*) ergo dimidium figuræ Cylindricæ factæ ex AB supra arcum DN æquatur dimidio figuræ cylindricæ factæ ex AH supra arcum HO, sive sectori AHO. Ergo cum summa rectangulorum AE, AF applicatorum: ad arcum DN æquetur solido recto cuius basis dimidia figuræ cylindricæ factæ ex AB supra DN, altitudo vero dupla AD; sumpto pro basi sectore AHO æquali illi basi, eadem summa Rectang. AE, AF applic. ad arcum DN æquatur solido recto cuius basis est sector AHO altitudo vero dupla AD.

Jam vero summa quadratorum AF (radiorum Trianguli ADO) æquatur solido recto cuius basis prædictum Triangulum ADO, altitudo dupla AD. Ergo differentia summæ quadrat. AF & summæ Rectang. AE, AF applic. ad eundem arcum, est eadem quæ duorum solidorum rectorum illis æqual. habentium pro basibus sectorem AHO & Triangulum ADO. Altitudinem autem eandem duplam AD. ac proinde talis differentia æquatur solido recto cuius basis est segmentum DHO, altitudo dupla AD. & duplum differentiæ est duplum hujusmodi solidi recti.

Est autem summa Rectangulorum AFE applic. ad arcum DN, differentia inter summam Rectangulorum AE, AF & summam quadratorum AF applicat. ad eundem arcum DN. Ergo bis summa Rectangul. AFE. applic. ad arcum DN, æquatur duplo solidi recti cuius basis DHO.

His ita præmissis, facile concludetur demonstratio propositionis in hunc modum.

Summa quadr. AE applicatorum ad arcum DN æquatur tripli summae 1. quadr. AE. 2. quadr. EF aut AG æqualium ex natura hujus Cœfoidis. 3. Summæ Rectang. AFE bis sumptæ. (applicatis tam quadratis quam Rectangulis ad arcum DN.)

Jam summa quadr. AE applic. ad DN æquatur solido recto cuius basis ABO altitudo dupla AD. (*de Conchoid. prop. 2.*) & summa quadr. AF applic. ad DN æquatur solido recto cuius basis Triangulum ADO, altitudo dupla AD.

Et summa quadr. AG applic. ad arcum DN æquatur solido recto cuius basis AGC, altitudo dupla AD.

Summa denique bis sumpta rectangulorum AFE applic. ad arcum DN æquatur ut jam diximus solido recto cuius basis duplum segmenti DHO , altitudo dupla AD.

Ergo solidum rectum cuius altitudo dupla AD basis autem ABO æquatur tribus solidis rectis præcedentibus, sive unico solido recto cuius basis ADO † AGC † duplum segmenti DHO , altitudo eadem nempe dupla AD.

Ergo cum solida recta habentia eamdem altitudinem sint inter se ut bases , figura ABO genitrix Cissoidis AGC æquatur Triangulo ADO † Cissoidi AGC † duplo segmenti circularis DHO. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Cissois igitur AGC æquatur figuræ genitrici ABO immunitæ Triangulo ADO & duplo segmenti DHO , sive æquatur segmento BDO — duplo segmenti DHO , & addito communi Triangulo ADO.Cissois AGC † Triangulum ADO æquatur figuræ ABO — duplo segmenti DHO.

PROPOSITIO VII.

Dimensio spatii ADXZ.

Ilsdem positis (fig.) Dico spatium Cissoidicum ADXZ æquari segmento circulari APOD † duplo figuræ APOM.

DEMONSTRATIO.

Sit in angulo OAM ducta quæcunque recta AR occurrentis in P arcui SAO , in Q Cissoidi AZ , in R basi DX , & in S quadranti circuli HOM.

Ostendetur ut in prop.2.de Cissoid. sectorem Cissoidicum AQ æquari Triangulo AOR imminuto figura genitrice AOP & duplo figura POS.

Unde sequitur Triangulum AOR æquari sectori Cissoidico AQ † figuræ AOP † duplo figuræ POS; & auferendo communem sectorem Cissoidicum AQ , sequitur segmentum convexum Cissoidicum AORQ æquari figuræ AOP † duplo figuræ POS.

Et procedendo in infinitum sequitur totum spatium AOXZ Cissoidicum æquari figuræ genitrici sive segmento circulari APO † duplo figuræ APOM.

Et addendo Triangulum ADO , sequitur spatium Cissoidicum ADXZ æquari spatio circulari APOD † duplo figuræ APOM. Quod erat demonstrandum.

PROPO.

97
PROPOSITIO VIII.

Quadratura absoluta spatii integri Cissoidis semicircularis cuius asymptotus secat in centro Diametrum semicirculi genitoris.

Ilsdem positis (fig. 6.) transeat DX asymptotus Cissoidis CGAZ per D centrum semicirculi genitoris AOB.

Dico totum spatium CGADXZ comprehensum axe CD, Cissoide infinita CGAZ, ejusque asymptoto DX æquari quadrato rectæ AO inscripto in circulo AOB.

DEMONSTRATIO.

Quoniam DO transit per centrum semicirculi AOB angulus HAO est semirectus, atque ita arcus HO æquatur arcui OM.

Ex puncto O ducatur TV tangens circulum AOB & compleatur Rectangulum ABTV.

Quoniam arcus HO, OM sunt æquales, manifestum est segmenta DHO, OVM esse æqualia. His ita præmissis.

Figura AGC æquatur segmento BDO — duplo DHO (Coroll. prop. 6.) & spatium ADXZ (prop. 7.) æquatur quadranti circuli ADO + duplo figuræ APOM, sive quadrato ADOV + figuræ APOV + duplo segmenti OVM.

Ergo Figura AGC + spatium ADXZ æquantur quadranti circuli BDO — duplo DHO aut æqualis OVM + quadrato ADOV + figuræ APOV aut æquali BEOT + duplo OVM. Elidendo igitur + & — duplum OVM. Figura AGC + spatium ADXZ æquantur quadranti circuli BDO + quadrato ADOV + figuræ EOT quæ componunt Rectangulum ABTV quod est æquale quadrato rectæ AO. Quod erat demonstr.

Analogia Conchoidum & Cissoidum quoad spatia.

Definitio. Si Conchois & Cissois generentur eodem Polo, eadem Basi atque ex eadem figura genitrici, dicantur *Cognatae*.

PROPOSITIO IX.

IN Conchoidibus & Cissoidibus cognatis quarum Basis communis non secat axem figuræ genitricis, Conchoidis spatiū

Bb.

integrum æquatur Cissoidis spatio + duplo figuræ genitricis.
Idem dicendum de segmentis correspondentibus.

Sint Conchois RV & Cissois AZ (*fig. 4.*) Cognatae sive genitrix ex eodem Polo A, eadémque basi BX, ex eadem figura AEB, sitque Basis BX ita posita ut non secet AB axem figuræ genitricis AEB inter A & B.

Dico spatium Conchoidicum BRVX æquari spatio Cissoidico ABXZ + duplo figuræ genitricis AEB.

Et si ducatur quæcunque AS occurrentis in G, E, S Cissoidi, figuræ genitrici, & Conchoidi; ducanturque ex G, E, S ordinatae GN, EP, ST.

Dico segmentum Conchoidicum RST æquari segmento Cissoidico ANG respondenti + duplo segmenti BPE.

D E M O N S T R A T I O.

EX proprietate Conchoidis & Cissoidis, tam GF, quam FS æquatur AE. ergo AS est æqualis AG + dupla AE. Atqui (*Elem. Eucl.*) in Triangulo AST propter parallelas GN, EP, ST, AG + dupla AE est ad AS ut GN + dupla EP ad ST, ergo GN + dupla EP æquantur ipsi ST.

Rursus tres AN, BP, RT æquales sunt. Nam 1. ex proprietate Cissoidis AZ duæ AE, GF sunt æquales, ergo sublatâ vel additâ communi GE duæ AG, EF sunt etiam æquales. Ut autem AG, EF ita AN, BP (*Elem.*) ergo AN, BP sunt æquales.

2. Ex proprietate Conchoidis RV, duæ AE, FS sunt æquales. Ut autem AE, FS ita AP, BT in Triangulo AST, ergo AP, BT sunt æquales, sunt autem ex natura Conchoidis etiam AB, BR æquales, ergo BP, RT sunt etiam æquales.

Considerentur igitur tres figuræ aut spatia. 1. ABXZ cuius altitudo est AB. 2. BEA cuius altitudo est BA. 3. BRVX cuius altitudo est RB.

Quoniam hæ figuræ aut spatia habent æquales altitudines, & ad æquales distantias AN, BP, RT à verticibus A, B, R, quælibet GN ordinata primæ figuræ aut spatiæ + dupla EP ordinata secundæ figuræ aut spatiæ æquatur ST ordinata tertia figuræ aut spatiæ, sequitur ex methodo indivisibilium primam figuram aut spatiū ABXZ + duplum secundæ figuræ aut spatiæ AEB æquari tertia figuræ aut spatiū BRVX. Quod erat primo loco ostendendum.

Similiter autem demonstrabitur segmentum AGN + duplum segmenti BEP æquari segmento BST. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc constat Conchoidem Cissoidemque cognatam , & earum figuram genitricem , tales esse figuras ut si duarum habeatur quadratura , etiam tertiae habeatur.

Scholion. Ut exemplo aliquo manifesta fiat veritas pulcherrimæ hujus propositionis & simul appareat quām recte conveniat cum aliis antea demonstratis.

Supponamus (fig. 4.) figuram genitricem AEB esse semicirculum , & asymptotum BX duci ex puncto B extremo diametri AB. Erit ergo Cissois AZ Dioclea , & Conchois BV illi cognata erit Conchois semicircularis cuius axis BR æquatur AB distantia Poli A ab asymptoto BX.

Ostensum est (de Conchoid. propof. 39. Coroll. 1.) spatium Conchoidicum BRVX quintuplum esse semicirculi genitoris AEB. Ostensum etiam (de Cissoid. prop. 3. Theor. 3.) spatium Cissoidicum ABXZ esse triplum ejusdem semicirculi genitoris AEB. Spatium ergo Conchoid. BRVX æquatur spatio Cissoidico ABXZ + duplo semicirculi AEB. Ut asseritur in præsenti propositione.

PROPOSITIO X.

IN Conchoidibus & Cissoidibus cognatis quarum Basis communis fecat axem figuræ genitricis , spatium Conchoidicum integrum æquatur duplo figure genitricis — spatio Cissoidis cognatae.

Sint (fig.6.) Cissois AGC , & Conchois r u cognatae genitæ nimirum ex eadem figura ABO , eodem Polo A , eadémque basi DX , fecet autem basis DX , AB axem figuræ genitricis inter A & B.

Ostendendum est spatium Conchoidicum r u y æquari duplo segmenti BOD — Cissoidi AGC.

DEMONSTRATIO.

IN angulo BAO ducatur quæcunque A s quæ occurrat in F , basi DX , in E curvæ genitrici BO , in s Conchoidi r u , & in G Cissoidi AGC . atque ex punctis G , E , s ordinentur rectæ Gg , Ee , st.

Quoniam ex proprietate Cissoidis AGC , AE , FG sunt æquales , AG , FE , sunt etiam æquales , cùm ergò AF æquetur AE — FE , AF æquatur AE — AG .

Deinde ex proprietate Conchoidis r u , AE , F s sunt æquales , est autem A s æqualis F s + AF , ergo A s est etiam æqualis AE + AF ; est autem AF æqualis AE — AG . Ergo A s æquatur AE + AE — AG . hoc est dupla AE — AG .



In Triangulis autem Ast , AEe , AGg , ut A sit ad duplam AE — AG ita est st ad duplam Ee — Gg . Quare st æquatur dupla Ee — Gg .

Jam tres lineæ Cg , Be , rt sunt æquales, nám 1. duæ AE , FG æquantur, ergo (*Elem.*) duæ Ae , Dg etiam æquantur (nam AE $AF::Ae$, AD , & AF , $FG::AD$, Dg). Ergo ex æquo AE , $FG::Ae$, Dg) sunt autem AB , CD æquales ex natura Cissoidis ergo Be , Cg sunt æquales.

2. Similiter AE , Fs sunt æquales ex natura Conchoidis r_n , ergo Ae , Dt ipsis proportionales sunt etiam æquales. Æquantur autem & AB , Dr (ex natura Conchoidis) ergo Be , rt sunt etiam æquales.

Denique in tribus figuris r_n , BDO , AGC altitudines r_y , BD , AC æquales sunt. Nam 1. ex natura Cissoidis AGC duæ AB , CD sunt æquales, ergo ablatâ communi AD , reliquæ BD , AC sunt æquales.

2. Ex natura Conchoidis r_n , AO radius figuræ genitricis AEB æquatur OV ab asymptoto DX ductæ ad Conchoidem, ergo illis proportionales AD , DY sunt æquales. Sunt autem ex natura Conchoid. AB , DR etiam æquales, etgo reliquæ DB , r_y sunt æquales.

Quoniam igitur tres figurae r_n , BDO , AGC tales sunt ut earum altitudines r_y , BD , AC sint æquales, & ad æquales rt , Be , Cg distantias à verticibus r , B , C ordinatae s sit æqualis duplo ordinatæ E — ordinatæ Gg .

Ex methodo indivisibilium Figura r_n æquatur duplo figuræ BDO — figur. AGC . Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XI.

Methodus generalis ad dimensionem Rotundorum ex Cissoidibus circa basin.

Esto (*fig. 7.*) Cissois CZ , cuius Polus A , axis CD , basis DX , figura genitrix ABK , cui æqualis & similis descrip-ta intelligatur CDL subcontrariè posita.

Sumpto quocunque puncto G in Cissoide, ordinetur GH quaæ producta occurrat CL in I .

Dico GH esse ad HI ut AH ad HD .

DEMONSTRATIO.

Jungatur AG quaæ producta occurrat BK curvæ genitrici in E , & ba-si in F . Ex E ordinetur EN ad axem AB .



Ex natura Cissoidis CZ, AE æquatur GF, est autem etiam AE, GF:: AN, HD. Ergo AN. HD æquantur. Est autem etiam AB æqualis CD. Ergo BN æquatur CH. Cum igitur figura ABK, CDL sint similes & æquales, & BN, CH æquales, evidens est ordinatas NE, HI æquales esse. Quoniam ergo in Triangulo ANE, AH, AN:: HG, NE sive æquales GH, HI. Est autem AN æqualis ut diximus, HD, ergo GH, HI:: AH, HD. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Si jungeretur recta DI, hæc foret parallela rectæ AF. Triangula enim rectangula ANE, DHI sunt similia & æqualia, unde anguli alterni ADI, DAF sunt æquales. Et AF, DI parallelæ. Unde etiam sequitur quadrilaterum DIGF esse parallelogrammum, & DI, GF esse æquales. Nec non DF, GI sive DF, GH + HI.

P R O P O S I T I O X I I .

Ilsdem positis. Per Polum A ducatur AM parallela DX basi Cissoidis.

Dico Rotundum ex spatio Cissoidico CDXZ circa basin DX æquari Rotundo ex figura CDL (æuali & simili genitrici ABK) circa AM.

D E M O N S T R A T I O .

Quoniam ex præced. quælibet GH est ad HI ut AH ad HD, Rectangulum sub GH, HD æquatur rectangulo sub AH, HI.

Jam quando spatium CDXZ volvitur circa DX, quælibet GH producit superficiem Cylindricam, cuius altitudo GH, basis autem est peripheria radii DH.

Similiter quando figura CDL volvitur circa AM, quælibet HI generat superficiem Cylindricam cuius altitudo HI, basis autem est circumferentia radii AH.

Hæ autem duæ superficies Cylindricæ sunt inter se in ratione composita altitudinum GH, HI, & basium sive radiorum DH, AH. Ergo sunt inter se ut Rectangula sub GH, DH, & sub HI, AH. Quare cum Rectangula sint æqualia, etiam superficies Cylindricæ sunt æquales, & cum hoc semper eveniat, sequitur ex methodo indivisibilium Rotundum ex spatio CDXZ circa DX, æquari Rotundo ex figura CDL circa AM. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. i. Similiter ostendetur Rotundum ex quoconque segmento Cissoidis verbi gratia CGH circa basin DX æquari Rotundo ex segmento CHI respondenti circa rectam AM.

Corollarium 2. Cùm figuræ CDL , ABK sint æquales & similes , & præterea rectæ AC , BD æquales (eò quod ex natura Cissoidis duas AB , CD æquentur) manifestum est Rotundum ex DCL circa AM æquari Rotundo ex ABK circa DX , quare cum Rotundu ex CDL circa AM æquetur Rotundo ex CDXZ circa DX , etiam Rotundum ex CDXZ circa DX æquatur Rotundo ex ABK figura genitrix circa eamdem DX .

Similiter cùm figuræ CHI , BNE sint æquales & similes (eò quod BN æquetur CH , ut ostensum est in demonstr. prop. II.) ac proinde Rotundum ex CHI circa AM æquetur Rotundo ex BNE circa DX , sequitur Rotundum ex segmento Cissoidico CHG circa basim DX (quod æquale est (*Coroll. I.*) Rotundo ex CHI circa AM) æquale etiam esse Rotundo ex BNE circa DX .

PROPOSITIO XIII.

Methodus præcedens applicatur Rotundis ex Dioclea ejusque segmentis circa Basin sive asymptotum.

Esto (*fig. 8.*) Dioclea ACZ , cuius Polus A , axis AB , basis BX , semicirculus genitor ACB , cuius centrum O .

Quoniam axis AB semicirculi genitoris ACB , est etiam axis Dioclea , manifestum est semicirculum BCA haberi posse pro figura simili & æquali & subcontrariè positâ figuræ genitrici ACB . Hocposito . Demonstrabimus sequentibus quator Theorematibus tum quæ à Vallis circa Rotunda ex Cissoide circa asymptotum ostensa sunt , tum alia nonnulla quæ nullus quod sciam animadvertisit .

THEOREMA I.

Dimensio Rotundi ex spatio integro Dioclea ABXZ circa asymptotum BX.

Dico Rotundum hujusmodi æquari semi cylindro , cuius basis est semi-circulus genitor ABC , altitudo autem est circumferentia ejusdem circuli cuius diameter AB .

DEMONSTRATIO.

Centrum gravitatis semicirculi ACB est in recta OC , ergo Rotundum ex semicirculo ACB circa AM (hoc est *propof. 12.* Rotundum

ex spatio Dioclea ABXZ circa BX) æquatur semicylindro cuius basis est semicirculus ACB , altitudo autem circumferentia radii BO (Tacq. lib. 5. cylindr. & annul.) Quod erat demonstrandum.

THEOREMA II.

Dimensio Rotundi ex quocunque segmento Dioclea AKL circa asymptotum BX(fig. 8.)

Dico Rotundum hujusmodi haberi sive ad Sphæram reduci datâ circuli quadraturâ.

DEMONSTRATIO.

Rotundum ex segmento Cissoidico AKL circa BX æquatur (Coroll. prop. 12.) Rotundo ex circulari segmento AKH circa AM.

Datâ autem circuli quadratura habetur rectâ parallela OC sive AM transiens per centrum gravitatis segmenti circularis AKM ut ostensum est in prop. 26. de Conchoidibus) habitâ autem illa rectâ parallela AM transeunte per centrum gravitatis segmenti AKH , & simul quadraturâ circuli datâ, quadratur segmentum AKM , ergo datâ circuli quadraturâ H habetur Rotundum ex segmento circulari AKM circa AM (de Conchoid. prop. 8. Coroll. 2.)

Ergo datâ circuli quadraturâ habetur Rotundum ex segmento Dioclea AKL circa asymptotum BX.

Hæc duo Theorematata jam à clarissimo Vvallisio demonstrata erant. Nos duo sequentia subjungimus.

THEOREMA III.

Dimensio Rotundi geniti ex spatio BICZX circa asymptotum BX.

Dico hujusmodi Rotundum æquale esse sphæræ diametri AB.

DEMONSTRATIO.

In curva infinita CZ sumatur quodcumque punctum F per quod ducatur FG ordinata Dioclea occurrens in I arcui BIC Jungatur etiam AF quæ occurrat in H arcui AC , & ex punto H sit ut antè ordinata HK.

Ex proprietate Cissoidis AG, BK sunt æquales ut jam saepius diximus, & AK, BG; & AO, BO. Quare & GO, KO, & GK dupla est GO.

Deinde ex proprietate Diocleæ BG, GI:: AG, GF. Cum ergo AG, BK sint æquales, BG, GI:: BK, GF. & permutando BG, BK:: GI, GF. & dividendo BG, GK:: GI, IF. Ergo Rectangulum sub BG, IF æquatur Rectangulo sub GK, GI. aut duplo Rectanguli GO, GI (cum GK dupla sit GO ut dictum est.)

Est autem Rectangulum sub BG, IF ad Rectangulum sub GO, GI ut superficies cylindrica ex IF circa BX ad superficiem cylindricam ex GI circa OC. Ergo superficies cylindrica ex IF circa BX, dupla est superficie Cylindr. ex GI circa OC. Summa ergo superficiæ ex IF circa BX. sive Rotundum ex spatio BICZX circa BX, est dupla summa superficiæ ex GI circa OC (hoc est Hemisphærii radii BO.) Ergo Rotundum ex spatio BICZX circa BX, æquatur sphæræ diametri AB. Qued erat demonstrandum.

THEOREMA IV.

Dimensio Rotundi ex figura ALCH circa asymptotum BX.

Dico etiam illud Rotundum æquari sphæræ diametri AB.

DEMONSTRATIO.

Sumatur in curva ALC quodcunque punctum L per quod ordinetur SKL quæ producta occurrat arcui AC in H, & per H ducatur AHF quæ occurrat Diocleæ in F, & per F ordinetur FG quæ occurrat arcui BIC in I. Ostendetur ut antè AG, BK, & OG, OK esse æquales.

Jam ex proprietate Diocleæ, BK, KH :: AK, KL, & permutando BK, AK aut BK, BG :: KH, KL. & per convers. rationis BK, GK :: KH, LH. Ergo Rectangulum sub BK, LH æquatur Rectangulo sub GK, KH, sive duplo Rectanguli OK, KH. Inde autem ut in præcedenti propositione facilè ostendetur summam omnium superficiæ Cylindricarum ex LH circa BX, hoc est Rotundum ex figura ALCH circa BX duplum esse hemisphærii ex quadrante circuli AOC circa OC, sive æquari sphæræ diametri AB. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Rotunda ergo ex spatio BICZX & ex figura ALCH circa asymptotum BX sunt æqualia inter se, cum utrumque sit æquale sphæræ diametri AB.

PROPOSITIO XIV.

Analogia Conchoidis & Cissoidis quoad Rotunda ex spatiis & segmentis circa basin.

Sint (fig. 7.) Conchois OP & Cissois CZ cognatae quarum Polus A, figura genitrix ABK, basis DX quæ non secet axem AB figuræ genitricis inter A & B.

Dico Rotundum genitum ex spatio Conchoidico DOPX circa basin DX æquari Rotundo ex spatio Cissoidico CDXZ circa eamdem basin DX † duplo Rotundi ex figura genitricē ABK circa AK parallelam basi DX.

DEMONSTRATIO.

EX Polo A ducatur quæcunque AP quæ occurrat in G Cissoidi CZ, in E curvæ genitrici BK. & in P Conchoidi OP, atque ex punctis G, E, P ordinentur rectæ GH, EN, PQ perpendiculares ad AO.

Ex generatione Conchoidis & Cissoidis rectæ AE, FG, FP sunt æquales, atque ita rectæ AN, DH, QD ipsis proportionales sunt etiam æquales.

Deinde ordinata PQ Conchoidis æquatur GH ordinatae Cissoidis † duplo EN ordinatae figuræ genitricis ut probatum est in demonstratione propos. 9.

Ut autem PQ æquatur GH † duplo EN, ita propter æquales DQ, AN, DH, sumptis æqualibus circumferentias radiorum DQ, AN, DH Rectangulum sub circumferentia radii DQ & PQ æquatur Rectangulo sub circumf. radii DH & GH † duplo Rectanguli sub circumf. radii AN & EN, sive superficies cylindrica ex PQ circa DX æquatur superficiei cylindricæ ex GH circa DX † duplo superficiei cylindricæ ex EN circa AM.

Ergo ex methodo indivisibiliū Rotundum ex spatio Conchoid. DOPX circa DX æquatur Rotundo ex spatio Cissoid. CDXZ circa DX † duplo Rotundi ex figura genitricē ABK circa AM. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Similiter ostendetur Rotundum ex segmento Conchoidico OPQ circa DX æquari Rotundo ex segmento Cissoidico CGH respondentem circa DX † duplo Rotundi ex segmento BEN respondentem figuræ genitricis circa AM.

PROPOSITIO XV.

Analogia Rotundorum eorumdem cum centro gravitatis figuræ genitricis.

Ilsdem positis (*fig. 7.*) transeat RS parallela AK per centrum gravitatis figuræ genitricis ABK.

Dico Rotundum ex spatio Conchoidico DOPX circa basin DX esse ad Rotundum ex spatio Cissoidico CDXZ circa eamdem basin DX ut AD † AR ad DR.

DEMONSTRATIO.

Rotundum ex spatio Cissoidico CDXZ circa DX æquatur (*prop. 12.*) Rotundo ex figura CDL circa AM aut quod idem est Rotundo ex figura genitrix ABK circa DX.

Atqui Rotundum ex spatio Conchoidico DOPX circa DX æquatur (*prop. 14.*) Rotundo ex spatio Cissoidico CDXZ circa DX † duplo Rotundi ex ABK circa AM.

Ergo Rotundum ex DOPX circa DX æquatur Rotundo ex ABK circa DX † duplo Rotundi ex ABK circa AM. Quare Rotundum ex DOPX est ad Rotundum ex CDXZ ut Rotundum ex ABK circa DX † Rotundum ex ABK circa AM bis ad Rotundum ex ABK circa DX.

Est autem (*Tacquet lib. 5. Cylindr. & annul.*) Rotundum ex ABK circa DX æquale solido recto cuius basis ABK, altitudo circumferentia radii DR. Similiter Rotundum ex ABK circa AM æquatur solido recto cuius basis ABK altitudo circumf. radii AR, ergo Rotundum ex DOPX circa DX est ad Rotundum ex CDXZ circa DX ut solidū rectū cuius basis ABK, altitudo circumferentia radii DR † circumf. radii AR bis ad solidum rectum cuius basis ABK, altitudo circumferentia radii DR. hoc est ut DR † AR bis, sive ut AD † AR ad DR. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. I. Hinc data rectâ RS parallela basi DX transeunte per centrum gravitatis figuræ genitricis ABK, habetur ratio Rotundi ex spatio Conchoidico DOPX circa basin DX ad Rotundum ex spatio Cissoidico CDXZ circa eamdem basin.

Exemplum sit in Conchoide semicirculari RV (*fig. 4.*) & Dioclea ipsi cognata AZ. Constat figuræ genitricis quæ semicirculus est AEB centrum grav. esse in recta transeunte per centrum D. Est ergo ut AB † AD ad BD sive ut 3. ad 1. ita Rotundum ex spatio Conchoidico BRVX

circa basin BX, ad Rotundum ex spatio Dioclea ABXZ circa eamdem BX, quod egregie convenit cum eo quod demonstratum est pro Rotundo Conchoidico (prop. 41. de Conchoidibus) & pro Rotundo ex Dioclea (prop. 13. de Cissoidibus Theor. 1.)

Corollarium 2. Vicissim si habeatur ratio Rotundorum circa basin ex spatiis Conchoidis & Cissoidis cognatarum, habebitur recta basi parallela transiens per centrum gravitatis figuræ genitricis.

Unde (fig. 7.) si OP supponatur Conchois Nicomedea genita ex quadrante circuli ABK. Si haberetur ratio Rotundi ex spatio Conchoid. DOPX circa basin DX ad Rotundum ex spatio CDXZ Cissoidis cognatae circa eamdem DX, haberetur RS recta transiens per centrum gravitatis quadrantis ABK. Quod sufficeret ad circuli quadraturam.

Corollarium 3. quæ dicta sunt de Rotundis ex spatiis integris Conchoidum & Cissoidum Cognatarum applicari possunt Rotundis ex eorum segmentis respondentibus circa basin communem rotatis.

Ita (fig. 7.) Rotundum ex segmento Conchoidico OPQ circa DX, est ad Rotundum ex segmento Cissoidico CGH respondentem circa eamdem DX ut AD + distantia rectæ AK à centro grav. segmenti BEN figuræ genitricis, ad distantiam ejusdem centri à basi DX. Demonstrabitur planè eodem modo quo propositio præcedens.

Corollarium 4. Applicari etiam possunt segmentis quæ dicta sunt in Coroll. 1. & 2. pro spatiis integris. nimis rūm

1. Si habeatur recta parallela DX (fig. 7.) & transiens per centrum grav. segmenti BEN figuræ genitricis, habebitur ratio Rotundi ex segmento Conchoid. OPQ circa DX ad Rotundum ex segmento Cissoid. respondentem CGH circa eamdem DX.

2. Et vicissim si nota sit ratio quam habent hæc duo Rotunda, habebitur recta parallela DX transiens per centrum gravitatis segmenti BEN.

Si igitur quemadmodum habetur ratio Rotundorum ex Conchoidis semicircularis & Dioclea spatiis integris BRVX, ABXZ (fig. 4.) circa basin DX, ut ostensum est in Corollario 1. præcedenti, ita habetur ratio Rotundorum ex duobus segmentis RST, & AGN respondentibus, circa basin BX rotatis, haberetur hinc recta parallela BX transiens per centrum gravit. segmenti circularis BEP. Quod sufficeret ad circuli quadraturam.

SCHOOLION.

DUabus præcedentibus propos. earumque Corollariis explicuimus analogiam Rotundorum circa basin ex Conchoide & Cissoidide cognatis & in quibus basis communis DX (fig. 7.) non secat AB axem figuræ genitricis inter A & B sed vel in B ut in Dioclea vel supra B. Simili autem ratiocinio prosequi possemus analogiam eorumdem Rotundo.

rum quando basis DX secat axem AB inter A & B ut in fig. 6. Sed ubi methodus nota est, quæ ex ea deduci possent in singulis casibus, non est operæ pretium fusè & laboriosè prosequi.

PROPOSITIO XVI.

Methodus generalis ad Dimensionem Rotundorum ex Cissoidibus circa axem.

Esto (fig. 7.) Cissois CZ, cuius Polus A, basis DX, axis CD, figura genitrix ABK.

Dico 1. si habeatur summa quadratorum omnium AG (duitarum à Polo A ad curvam CG) applicatarum ad puncta H respondentia, haberi Rotundum ex segmento CGH circa axem CH.

DEMONSTRATIO.

Quodlibet quadratum AG æquatur quadrato AH + quadrato GH. Habetur autem summa quadr. AH applicatorum in H. Ergo si habeatur summa quadr. AH applic. in H, habebitur summa quadr. GH, ac proinde summa circulorum radiorum GH, hoc est Rotundum ex segmento CGH circa CH. Quod erat ostendendum.

Dico 2. Si habeatur summa quadratorum AF + summa quadrat. AE + summa Rectangularium AEF applicatorum in N, habebitur Rotundum ex segmento CGH circa CH,

DEMONSTRATIO.

Habebitur enim summa quadratorum EF applicatorum in N, (Cùm quodlibet quadr. AF æquetur quadrato AE + quad. EF + Rectangulo AEF bis.) Cùm autem AG, EF sint æquales (propter æqualitatem AE, GF ex natura Cissoidis) etiam ipsis proportionales AH, ND sunt æquales, sunt autem æquales AB, CD ergo reliquæ BH, CN sunt æquales, ac proinde summa quadr. AG applicat. in H æquatur summæ quadratorum EF applicatorum in N. Cùm ergo habeatur summa quadr. EF applic. in N, habebitur & summa quadr. AG applic. in H, ac proinde (num. 1.) Rotundum ex CGH circa CH. Quod erat demonstrandum.

PROPOS-

PROPOSITIO XVII.

Methodus precedens applicatur Dioclea.

Esco (fig. 4.) Dioclea AGZ, cuius Polus A, basis BX, figura genitrix semicirculus AEB.

Dico datâ Hyperbolæ quadraturâ habeti Rotundum ex quo-libet segmento AGN circa axem AN.

DEMONSTRATIO.

Juncta AG & producta occurrat semicirculo AEB in E, & asymptoto BX in F, atque ex E ordinetur EP.

Rectæ AF applicatæ in P constituant segmentum Hyperbolæ secundi generis in quâ quadrata ordinatarum sunt reciprocæ ut abscessæ (*de Conchoid. propos. 42.*) & summa quadr. ordinatarum hujus segmenti Hyperbolici sive rectarum AF, cubatur datâ Hyperbolæ quadraturâ. (*de Conchoid. prop. 45.*)

Præterea rectæ AE subtensæ semicirculi applicatæ in P, generant segmentum Parabolæ cuius vertex A, axis AB (*de Conchoid. prop. 43.*) summa ergo quadratorum AE applic. in P cubatur, cum summa circulorum quorum radii sunt AE applicatæ in P & ordinatæ Parabolæ, reducatur ad Sphæram (*Archim.*) Denique cum Angulus AEB in semicirculo sit rectus quodlibet Rectangulum AEF æquatur quadrato BE, rectæ autem BE applicatæ in P generant aliam Parabolam cuius vertex est B axis BA, ac proinde cubatur summa quadratorum BE sive rectangulorum AEF applicatorum in P.

Quoniam igitur datâ Hyperbolæ quadraturâ cubatur. 1. Summa quadratorum AF. 2. Summa quadratorum AE. 3. Summa Rectangulorum AEF, applicando tam quadrata prædicta quam rectangula ad puncta P. Sequitur (*prop. præc. num. 2.*) datâ Hyperbolæ quadraturâ haberi Rotundum ex segmento Dioclea AGN circa axem AN. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XVIII.

Analogia Conchoidum & Cissoidum cognatarum quoad Rotunda ex illarum segmentis circa axem genita.

Resumatur (figura 7.) in qua ductæ sint lineæ ut antè sæpius dictum est. Sitque præterea Figura CTH talis ut

quodlibet ejus quadratum HT æquatur Rectangulo GHI. contento sub GH ordinata Cissoidis CGZ, & HI ordinata figura CDL similis & æqualis genitrici ABK.

Dico Rotundum ex segmento Conchoidico OPQ circa axem OQ æquari Rotundo ex segmento Cissoidico CGH circa axem CH † quadruplo Rotundi ex segmento CHI circa CH; vel quod idem est quadruplo Rotundi ex segmento BEN circa BN † quadruplo Rotundi ex segmento CHT circa CH.

DEMONSTRATIO.

Ordinata PQ Conchoidis æquatur GH ordinata Cissoidis † duplo EN ordinata figurae genitricis aut æqualis HI (*prop. 9. de Cissoid. in demonstratione.*) Quadratum autem GH † 2. HI æquatur quadrat. GH † quad. 2. HI aut 4. quadratis HI † duplo Rectanguli sub GH & 2. HI aut 4. Rectangulis GHI aut æqualibus 4. quadratis HT. Cum ergo quadrata rectarum sint inter se ut circuli quorum radii sunt hujusmodi rectæ, circulus radii PQ æquatur circulo radii CH † quadruplo circuli radii HI † quadruplo circuli radii HT.

Cum igitur hoc semper eveniat, & aliunde rectæ OQ, CH sint æquales (nam AE, FG, FP æquantur ex natura Conchoid & Cissoidis, ergo & AN, DH, DQ: sunt autem & AB, CD, DO etiam æquales, ergo & BN, CH, OQ)

Sequitur ex methodo Indivisibilium Rotundum ex OPQ circa OQ æquari Rotundo ex CGH, circa CH † quadruplo Rotundi ex CHI circa CH, sive BEN circa BN † quadruplo Rotundi ex CHT circa CH.
Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XIX.

Applicatur praecedens proposicio Diocleæ & Conchoidi semicirculari ipsi cognatae.

Resumatur (fig. 4.) Dico Rotundum ex segmento RST Conchoidis semicircularis, circa axem RT æquari Rotundo ex segmento Diocleæ AGN respondentem circa axem AN † sphæræ cognitæ.

DEMONSTRATIO.

Semicirculus AOB est figura similis & æqualis genitrici AEB. Deinde ex proprietate Diocleæ AZ, tres GN, AN, NQ vel NO sunt in continua ratione, quare quadratum AN æquatur Rectangulo GNO. Denique rectæ AN applicatæ in N generant Triangulum, & circuli harum rectarum generant Conum cuius vertex A, qui ex Archimede reducitur ad Sphærā ac promide ejus quadruplum. His præmissis.

Rotundum ex RST circa RT (*prop. præc.*) æquatur Rotundo ex AGN circa AN † quadruplo Rotundi ex ANO circa AN † quadruplo Rotundi quod est summa circulorum quorum radii sunt AN medii proportionales inter GN, NO hoc est † quadruplo Coni prædicti aut Sphæræ illi æqualis.

Cum igitur reducatut ad sphærā (*Archim.*) Rotundum ex segmento circulari ANO circa AN ac proinde ejus quadruplum. Sequitur Rotundum ex RST circa RT æquari Rotundo ex AGN circa AN † duabus sphæris cognitis aut reducendo duas spheras ad unam, † uni sphæræ cognitæ. Quod erat demonstrandum.

SCHOLION.

SI liceret comparare inter se magnitudines absolutè infinitas, dici posset Rotundum ex Conchoide integra BRVX circa axem BR æquari Rotundo ex Dioclea integra ABXZ circa axem AB † quadruplo sphæræ ex semicirculo AOB circa AB † quadruplo Coni ex Triangulo Isoscele cuius ordinatae sunt AN applicatae ad omnia puncta N axis AB. Facile autem ostendi potest hunc Conum duplum esse sphæræ diametri AB, ergo quadruplum Coni est octuplum sphæræ, quare Rotundum ex Conchoide integra semicirculari BRVX circa axem BR æquatur Rotundo ex Dioclea integra ABXZ circa axem AB † sphæræ diametri AB duodecies sumptæ.

PROPOSITIO XX.

Methodus Generalis ad inveniendum centrum gravitatis in Ciffoide.

Esto (fig. 7.) Ciffois CZ, cuius Polus A, basis DX, figura genitrix ABK, eique similis, æqualis & subcontrariè posita CDL; GH ordinata Ciffoidis, HI ordinata figuræ CDL.

Sitque præterea in CH punctum V per quod transit recta pa-

rallela DX ducta per centrum gravitatis segmenti CHI; & Y punctum per quod transit recta parallela DX ducta per centrum gravitatis segmenti Cissoidis CGH.

Dico AV esse ad DY ut segmentum Cissoidicum CGH ad segmentum CHI.

D E M O N S T R A T I O.

Rotundum ex segmento CGH circa basim DX æquatur (*propof. 12. Coroll. 1.*) Rotundo ex segmento CHI circa AM parallelam DX. Äequatur autem Rotundum ex CGH circa DX solido recto cuius basis CGH, altitudo circumferentia radii DY (*Tacq. lib. 5. Cylindr.*) & Rotundum ex CHI circa AM æquatur similiter solido recto cuius basis CHI, altitudo circumferentia radii AV. Ergo duo hæc solida recta æquantur inter se, quare habent bases altitudinibus reciprocas, ergo ut circumf. radii AV ad circumf. radii DY, sive ut AV ad DY, ita est segmentum CGH ad segmentum CHI. Quod erat demonstrandum.

Corollarium 1. Hinc si habetur ratio segmentorum CGH, CHI & recta parallela DX transiens per centrum gravit. segmenti CHI, ac proinde punctum V, & recta AV, habebitur recta DY, ergo & punctum Y & recta parallela DX transiens per centrum gravit. segmenti Cissoid. CGH.

Corollarium 2. Quod dictum est de segmentis applicari debet spatii integris Cissoidum. Ita si supponatur punctum V esse in quo parallela basi DX, transiens per centrum gravitatis figurae CDL secat axem CD, & punctum Y esse illud in quo parallela basi DX, transiensque per centrum gravit. spatii Cissoidici CDXZ secat axem CD, ostendetur ut prius AV esse ad DY ut spatium Cissoid. CDXZ ad figuram CDL.

Unde sequitur si nota sit ratio spatii Cissoid. ad figuram CDL vel illi æqualem genitricem ABK, & simul habeatur recta parallela basi DX transiens per centrum grav. figurae CDL sive genitricis ABK, haberi rectam parallelam DX quæ transeat per centrum gravitatis spatii Cissoid. CDXZ.

S C H O L I O N.

Methodum seu Theorema generale tradidimus ad inveniendam rectam basi parallelam quæ transit per centrum gravit. segmentorum & spatii Cissoidici, ad inveniendam autem rectam aliam axi parallelam quæ transeat per idem centrum gravitatis, non aliam assignamus methodum quam quæ pro Conchoidibus data est (*prop. 8. de Conchoid.*) quamque in *Corollario 2. ejusdem propos.* valere diximus pro quibusunque figuris.

PROPO-

PROPOSITIO XXI

Applicatur methodus precedens Diocleæ.

Data circuli & Hyperbolæ quadratura habetur centrum gravitatis segmenti Diocleæ.

DEMONSTRATIO.

Resumatur figura 4. cum lineis ibi sèpiùs notatis. Inveniendūmque sit centrum grav. segmenti Diocleæ AGN.

Datâ circuli quadraturâ, quadratur segmentum Diocleæ AGN (*prop. 5.*) atque ita habetur ratio segmenti AGN ad segmentum circulare AON. Præterea datâ circuli quadraturâ habetur recta parallela BX transiens per centrum grav. segmenti circularis ANO. Ergo datâ circuli quadraturâ habetur recta parallela BX transiens per centrum gravit. segmenti Diocleæ AGN (*prop. preced.*)

Jam datâ Hyperbolæ quadraturâ habetur Rotundum ex segmento AGN circa AN (*prop. 17.*) Quoniam ergo datâ circuli quadraturâ quadratur segmentum AGN, sequitur (*de Conchoid. prop. 8. Coroll. 1.*) datâ circuli & Hyperbolæ quadraturâ haberi rectam axi AN parallelam transeuntem per centrum gravitatis segmenti Diocleæ AGN.

Ergo cùm datâ circuli & Hyperb. quadraturâ habeantur duæ rectæ transeuntes per centrum gravit. segmenti AGN. manifestum est iisdem datis haberi centrum gravitatis. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXII.

Centrum gravitatis totius spati Diocleæ ABXZ distat ab asymptoto BX sexta parte diametri AB.

Jam Vvallisius hoc adverterat.

DEMONSTRATIO.

Rotundum ex spatio ABXZ circa BX æquatur (*prop. 13. Theor. 1.*) semicylindro cuius basis est semicirculus AEB, altitudo vero æqualis circumf. radii BD. Est autem idem Rotundum æquale solidi recto cuius basis spatium ABXZ, altitudo autem circumf. cuius radius est distantia centri gravitatis prædicti spati à recta BX (*Tacquet lib. 5. Cylindr.*) ergo semicylinder & solidum rectum prædictum sunt æqualia, habentque bases altitudinibus reciprocas.

Est autem semicirculus AEB tertia pars spatii Cissoidici ABXZ (*prop. 5. Theor. 3.*) Ergo distantia centri grav. spatii Cissoid. ABXZ à recta BX, est tertia pars radii ABD, ac proinde sexta pars diametri AB. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXIII.

Analogia Conchoidis & Cissoidis quoad centra gravit.

Sint (*fig. 7.*) Conchois OP, & Cissois CZ cognatae, quarum idem Polus A, basis DX, figura genitrix ABK. Sitque præterea recta RS parallela DX transiens per centrum gravit. figuræ genitricis ABK.

Dico distantiam centri grav. spatii aut figuræ Conchoid. DOPX à basi DX, ad distantiam centri grav. spatii aut figuræ Cissoidis CDXZ ab eadem basi DX, esse in ratione composita spatii figuræve Cissoid. CDXZ ad spatium figuramve Conchoid. DOPX, & rectæ AD + AR ad DR.

DEMONSTRATIO.

Rotundum ex spatio Conchoid. DOPX circa DX ad Rotundum ex spatio Cissoid. CDXZ circa eamdem DX est ut AD + AR ad DR. (*prop. 15. de Cissoid.*)

Est autem idem Rotundum Conchoid. ad idem Rotundum Cissoid. in ratione composita ex his duabus. 1. spatii Conchoid. DOPX ad spatium Cissoid. CDXZ. 2. Distantiae centri grav. spatii DOPX à recta DX, ad distantiam spatii CDXZ ab eadem recta DX (*Tacq.*) Ergo ratio AD + AR, DR componitur ex duabus prædictis rationibus. Et addita communi ratione spatii Cissoid. CDXZ ad spatium Conchoid. duas rationes 1. AD + AR, DR. 2. spatii Cissoid. CDXZ ad spatium Conchoid. DOPX componunt eamdem quam tres 1. spatii Conchoid. ad spatium Cissoid. 2. Distantiae centri grav. spatii Conchoid. à recta DX ad distantiam centri grav. spatii Cissoid. ab eadem recta DX. 3. Spatii Cissoid. ad spatium Conchoid. Prima autem & tertia ratio se elidunt. Ergo secunda nempe ratio distantiae centri grav. spatii Conchoid. ad distantiam centri grav. spatii Cissoid. à recta DX, composita reperitur ex his duabus. 1. AD + AR, DR. 2. Spatii Cissoidici CDXZ ad spatium Conchoidicum DOPX. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Quod dictum est de spatiis integris Conchoidis & Cis-

soidis, applicari potest segmentis earum sibi respondentibus, estque ea-
dem ferè demonstratio.

PROPOSITIO XXIV.

Methodus generalis ad inveniendā tangentem Cissoidum.

Esto (fig. 9.) Cissois FM, cuius Polus A, basis DE. Figura genitrix ABC, axis DF, radius quicunque Cissoidis AI (qui occurrat in G curvæ genitrici BC, & in H basi DE) ex punctis G, I sint tangentes GV, IE quæ occurrant in V, E rectis AC, DE parallelis.

Dico AV, HE :: AG, AI.

DEMONSTRATIO.

Sumpto alio quoque puncto M in Cissoide, jungatur AM quæ occurrat in K, L curvæ genitrici BC & basi Cissoidis DE. Per I, M, & G, K ducantur secantes IMP, GKO quæ occurrant in P, O rectis DE, AV. Præterea per puncta L, M ducantur LN, RS parallelae AI & occurrentes in N, R rectæ IR parallelae DE, & in L, S, ipsi DE. Deinde jungatur NM quæ producta occurrat DE in Q. His positis.

I. Lineæ AO, LQ sunt æquales. Nam in Triangulis AGK, LNM, duo latera AG, AK duobus LN, (sive HI) LM sunt æqualia ex natura Cissoidis, & anguli A, L illis comprehensi, æquales propter parallelas AG, LN (*hyp.*) ergo reliquo angulus AGK reliquo LNM æqualis est. Jam in Triang. AGO, LNQ, cùm latera AG, LN sint æqualia, & angulus G angulo N, & angulus GAO angulo NLQ (Cùm GAO, AHD alterni, & AHD, NLH æquētūr) sequitur basi AO basi LQ æqualē esse.

II. Jam recta LQ est ad SQ ut LN ad SM, sive ut HI (æqualis LN) ad SM, sive ut HP ad SP, ergo permuto LQ, HP :: SQ, SP.

III. Propter parallelas IR, SP, SQ est ad SP ut RN ad RI, sive ut LS ad SH, sive ut LM ad AM.

IV. Quoniam igitur LQ, HP :: SQ, SP (ut ostensum est num. 2.) & SQ, SP :: LM, AM (num. 3.) ergo LQ, HP :: LM, AM. Est autem LQ æqualis AO (num. 1.) & LM æqualis AK ex natura Cissoidis, ergo AO, HP :: AK, AM.

V. Cùm igitur habeatur semper hæc analogia AO, HP :: AK, AM, quantumvis sumatur punctum M propinquum puncto I. Sequitur abeunte puncto M in punctum I, & consequenter puncto K in punctum G, cùm subsecans AO abeat in subtangentem AV & subsecans HP in sub-

tangentem HE, & AK in AG, & denique AM in AI: sequitur inquam ex methodo desinentium esse AV, HE:: AG, AI. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc manifestum est si habeatur tangens curvæ genitricis haberi quoque tangentem Cissoidum omnium quæ ab ea ex quocunque puncto generari possunt.

Sit enim GV tangens genitricis BC in G, si fiat ut AG ad AI ita AV ad quartam HE, juncta IE tanget Cissoidem FM in I.

PROPOSITIO XXV.

Altera construetio generalis ad inveniendas Tangentes Cissoidum.

Iisdem positis (fig. 9.) sit GT tangens curvæ genitricis BC, quæ occurrat in T basi Cissoidis DE, & IX tangens Cissoidis FM occurrens in X rectæ AC parallelæ DE.

Dico AG, AI :: HT, AX.

DEMONSTRATIO.

AG, IH æquales sunt ex natura Cissoidis FM, ergo sublatâ vel additâ communi IG, duæ AI, GH sunt etiam æquales; quare curva BGC est Cissois genita ex curva FM, Polo A & basi DE. Ergo (prop. prec.) AG, AI :: HT, AX.

PROPOSITIO XXVI.

Aliæ duæ Constructiones.

Iisdem positis (fig. 9.) Dico 1. Rectas HE, HT esse æquales.
Dico 2. Quadratum HE aut HT æquari Rectangulo XAV.

DEMONSTRATIO.

1. **H**E, AV :: AI, AG (prop. 24.) Atqui AI æquatur GH. Ergo HE, AV :: GH, AG. Atqui GH AG :: HT, AV ob similia Triangula GHT, GAV, ergo HE, AV :: HT, AV. Quare HE, HT sunt æquales.

2. AX, HT :: AI, AG (prop. 25.) sed AI, AG :: HE, AV

AV (prop. 24.) siue HT, AV cum HE, HT sint æquales ut modò of-
tensum est. Ergo, &c. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXVII.

*Variæ constructiones & nova ad inveniendam Tangen-
tem Dioclea.*

Esto (fig. 10.) Dioclea AMN, genita ex semicirculo AFD,
Ecujus centrum V, Polo A, basi DR tangente semirculum
in D. Sit etiam punctum M datum in Dioclea ex quo ducenda
est tangens.

Jungatur AM quæ occurrat in F semicirculo AFD, & in I
basi seu asymptoto DR, ex punto F sit F, HY tangens circu-
lum & occurrens in H asymptoto DR, & in Y rectæ AC pa-
rallela DR.

Prima Construclio.

Flat ut AF ad AM ita AY ad IX. Juncta MX tanget Dio-
cleam in M.

Patet ex propos. 24.

Secunda Construclio.

Flat ut AF ad AM ita IH ad AL. Juncta ML tanget Dio-
cleam in M,

Patet ex propos. 25.

Tertia Construclio.

Flat ut AY ad HI ita HI ad AL. Juncta ML tanget Dio-
cleam in M,

Patet ex propos. 26. num. 2.

Quarta Construclio.

Sit HI æqualis IX. Juncta MX tanget Diocleam in M.

Patet ex prop. 26. num. 1.

Quinta Construclio.

Sit DX tripla DH. Juncta MX tanget Diocleam in M.

DEMONSTRATIO.

Nam in Triangulis similibus FHI, FAY; FH, HI :: FY, AY. Sunt autem FY, AY tangentes ejusdem circuli aequales, ergo FH, HI sunt etiam aequales. Sunt autem & DH, FH aequales, ergo DH, HI aequales sunt (*constr. 4.*) posito quod MX tangat Diocleam, ergo si MX tangit Diocleam in M, DX tripla est ipsius DH. Unde viceversa. cum (*hyp.*) DX sit tripla DH, juncta MX tangit Diocleam in M.

Sexta Constructio.

Ex puncto M demittatur in AC perpendicularis MK. Fiat que ut EF ordinata circuli ad DH, ita AK aut MO ordinata Diocleæ ad AL.

Juncta ML tanget Diocleam in M.

DEMONSTRATIO.

Hoc manifestum erit, si ostendamus positâ ML tangente esse AL, AK :: DH, EF.

Probatum est in demonstr. constr. 5. DH, IX esse aequales positâ tangente LMX. Atque AL, IX :: AM, MI. Ergo AL, DH :: AM, MI :: AO, OD. Sunt autem ex proprietate Diocleæ OM, OA, OQ, OD, continuæ proportionales, ergo OM, OQ :: OA, OD, sive AK, OQ :: OA, OD. Cum ergo OQ aequaliter EF (nam AO aequaliter DE sicut AM, FI ex natura Cissoidis) ergo AK, EF :: AL, DH. Et permutando AL, AK :: DH, EF. Quod erat demonstrandum.

Septima Constructio.

Ut DO (intercepta inter asymptotum DR & ordinatam OM Diocleæ) est ad DV (radium semicirculi generatris) ita Fiat OM (ordinata ex punto M) ad AL. Juncta LM tanget Diocleam in M.

DEMONSTRATIO.

Hoc patet si probetur viceversa, positâ tangente LM esse DO, DV :: OM, AL. Hoc autem sic ostendetur.

Producatur FH tangens circulum donec occurrat AD in B. Ex proprietate circuli, BV, DV :: DV, EV. Ergo reliqua BD est ad reliquam DE ut DV ad EV. Ergo BD est ad BD + DE sive ad BE ut DV ad DV

$\dagger EV$ sive ad DO. Est autem BD, BE :: DH, EF, Ergo DV, DO :: DH, EF. Atqui DH, EF :: AL, AK sive AL, OM (*constr. 6.*) ergo DV, DO :: AL, OM. & invertendo DO, DV :: OM, AL. Quod erat ostendendum.

Otta-va Constructio.

A Ngulo MAC fiat æqualis angulus AMZ & rectæ AZ recta IX.

Juncta MX tanget Diocleam in M.

DEMONSTRATIO.

IN Triangulo AMZ cum anguli A, M sint æquales, latera AZ, MZ sunt etiam æqualia, æquantur autem & AY, FY tangentes circuli, quare MZ, FY sunt parallelæ. Estque AF, AM :: AY, AZ aut AY, IX (*hyp.*) ergo (*construkt. i.*) MX tangit Diocleam.

Xona Constructio.

*Eft Clarissimi Viri Petri Fermatii Operum Variorum pag. 70. sed
absque demonstratione.*

Ex puncto M sit in AD perpendicularis MO, & radio VD sit æqualis DS. Appliceturque ad rectam SO Rectangulum DOA faciens latitudinem OG.

Juncta MG tanget Diocleam in M,

DEMONSTRATIO.

SIt ML tangens Diocleam in M & occurrens AD in G, & AC in L. Ostendendum est Rectangulum DOA applicatum ad SO habere latitudinem OG, sive Rectangulum DOA æquari Rectangulo SD, OG sumptâ DS æquali radio VD.

Triangula GAL, GOM, sunt similia, ergo AG, GO :: AL, OM. Atqui AL, OM :: VD, DO (*constr. 7.*) ergo AG, GO :: VD aut SD, DO. & componendo AO, GO :: SO, DO. Quare Rectangulum sub AO, DO æquatur Rectangulo sub GO, SO. Quod erat demonstrandum.

Decima Constructio.

Eft Doctissimi Barrovii Lect. Geom. 9. num xvi. Quam placet ex nostris principiis demonstrare.

Ex punto Q (ubi OM ordinata Diocleæ fecat semicirculum genitorem) ducatur tangens QP quæ occurrat in P diametro DA, & fiat ut PO + PA ad PO ita AO ad OG, Juncta MG tanget Diocleam in M.

DEMONSTRATIO.

Quoniam AM, FI ac proinde AO, DE sunt æquales, manifestum est subtangentes BE, PO; & BD, PA æquales esse. Igitur ratio BE + BD ad BE est eadem cum ratione PO + PA ad PO.

Ostendendum igitur BE + BD esse ad BE ut AO ad GO.

Ex præcedenti constructione AO, GO :: SO, DO. Ostendendum est igitur SO esse ad DO ut BE + BD ad BE.

Ex proprietate BF tangentis circulum BV, DV, EV sunt proportionales, ergo BD, DE :: DV, EV. & componendo BE, DE :: DV + EV, EV; sive cum EV, VO sint æquales, BE, DE :: DO, VO. & per conversionem rationis BE, BD :: DO, DV. Sive DO, DS (cum DV, DS sint æquales (*Construct. præc. 9.*) ergo BE + BD, BE :: DO + DS sive SO, DO. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXVIII.

Analogia Conchoidum & Cissoidum quoad Tangentes.

Sint (fig. 9.) Cissois FIM, & Conchois *in* Cognatae genitrixim ex eadem figura ABC, Polo A, basi DE. Ducatur quæcumque recta AI iocurrens Cissoidi in I, Conchoidi in i, curvæ genitrici BG in G, basi DE in H.



Ex I hit IE tangens Cissoidis occurrens basi DE in E, sit etiam ex i tangens Conchoidis i e occurreris eidem basi DE in e.

Dico HE, He :: AI, Ai.





DEMONSTRATIO.

Ex G sit GV tangens in G curvam genitricem BC, & occurrens in V rectæ AC parallela basi DE. AI, AG :: HE, AV (prop. 24. hujus) AG, Ai :: AV, He (prop. 9. de Conchoid.) ergo ex æquo AI, Ai :: HE, He. Quod erat demonstrandum.





DE




De Cissoidibus



Pag. 121.







DE NATURA VARIARUM CONCHOIDUM ET CISSOIDUM.

EXERCITATIO GEOMETRICA.

PRÆTER eas Conchoides ac Cissoides quas prioribus Exercitationibus fusiū explicuimus, alias multas contemplatus sum ē variis figuris ortas tum antiquis, tum novis. Prolixior sim si quæcunque mihi circa foecundissimum hoc argumentum occurrerunt referre velim. Non tamen injucundum erit ut spero paucis accipere quæ sit natura Conchoidum nonnullarum & Cissoidum celebriorum, utpote quæ ex lineis rectis ac sectionibus Conicis atque etiam ex ipsis Conchoidibus & Cissoidibus variis modis generantur; unde Conchoides & Cissoides Triangulares dici possunt, Parabolicæ, Hyperbolicae, Ellipticæ, atque Conchoidum Conchoides & Cissoidum Cissoides, prout ex radiis Triangularium, Paraboliarum &c. efformantur. Atque in his quemadmodum & in precedentibus videre licuit, perpetuam inter Conchoides, Cissoidesque Cognatas Analogiam intercedere advertemus.

DE CONCHOIDIBUS ET CISSOIDIBUS Triangularibus.

PROPOSITIO I.

COnchois genita ex linea recta quæ parallela est basi Conchoidis, est linea recta.

Sit (fig. 1.) Conchois EH cujus Polus A, linea genitrix recta BF, basis DG. Dico Conchoidem EH esse rectam linem.

H h

DEMONSTRATIO.

EX natura Conchoidis, rectæ AB, DE, & AF, GH sunt æquales, Ergo AB, AF:: DE, GH. Sed propter parallelas BF, DG, AB, AF:: AD, AG, ergo DE, GH:: AD, AG. Unde patet puncta omnia E, H esse ad eamdem rectam parallelam DG. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO II.

Cissois genita ex linea recta basi Cissois parallela est etiam linea recta.

Esto (fig. 1.) Cissois DG genita ex linea recta BF, Polo A, basi EH parallelâ BG. Ostendendum est DG esse lineam rectam.

DEMONSTRATIO.

EX naturâ Cissois, AB, DE & AF, GH sunt æquales. Ergo AB, AF:: DE, GH. Sed propter parallelas BF, EH, AB, AF:: AE, AH. Ergo AE, AH:: DE, GH. Unde rursus patet puncta omnia D, G esse ad eamdem rectam parallelam EH aut DG. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO III.

Conchois genita ex linea recta non parallela basi Conchoidis est Hyperbola.

Esto (fig. 2.) Conchois IF, genita ex recta KC, Polo A, basi NM non parallela rectæ genitrici KC. Ostendendum est Conchoidem IF esse Hyperbolam.

DEMONSTRATIO.

Quoniam KC, NM non sunt parallelæ, concurrunt in aliquo puncto B, juncta AB & producta occurrat Conchoidi IF in I. Ducatur autem ex Polo A quæcunque alia recta AF occurrentis in D, rectæ genitrici KC, in E basi NM, in F Conchoidi I F. Ex I, F ducantur IK, FL parallelæ NM occurrentes KC in K, L. Ducantur item IG, FH parallelæ KC & occurrentes in G, H rectæ ACH parallelæ NM.

Ex naturâ Conchoidis IF, rectæ AB, BI sunt æquales, ergo in Triangulis similibus ABC, BIK, CB, BK sunt etiam æquales. Similiter ex naturâ Conchoidis, duæ AD, EF sunt æquales, ergo in Triangulis similibus ADC, EFM, DC, FM sunt æquales. Aequaliter autem FM,

BL; ergo DC, BL æquantur, igitur BK, BL:: BC, DC. Sed ob æquales BC, HM & DC, FM; BC, DC:: HM, MF:: AE, EF:: DF, AD:: HC, CA:: FL, IK. Ergo BK, BL:: FL, IK. Quare puncta I, F. sunt ad eamdem Hyperbolam descriptam centro B, asymptotis BK, BM. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hyperbolæ IF centrum est in B concursu rectæ genitricis KC & basis NM. Asymptoti autem sunt rectæ BK, BM.

PROPOSITIO IV.

Ciffois genita ex linea recta non parallela basi Ciffoidis est etiam Hyperbola.

POlo A (fig. 3.) basi BD, ex linea recta EI generetur Ciffois GH. Sitque EI non parallela BD sed concurrat cum illa in E. Dico Ciffoidem GH esse Hyperbolam.

DEMONSTRATIO.

DUcta AI parallelâ BD ac proinde conveniente cum EI in puncto I. Compleatur parallelogr. ABEI, & ipsi EB sit æqualis, BK, & ex K ducatur KL parallela EI occurrens AI in M. Erit ergo MI dupla AI. Jam per A intelligatur ducta quæcunque AD occurrens rectæ BD in D, Ciffoidi GH in H, rectæ EI genitrici Ciffoidis in F, & rectæ KL in L.

Quoniam ex natura Ciffoidis rectæ AF, DH æquales sunt, est autem AF æqualis AL, cum sint AF, AL:: BE, BK. Ergo DH, AL sunt æquales. Quare punctum H ex Conicis est ad Hyperbolam descriptam centro K, asymptotis KD, KL per punctum A. Idem ostendetur de aliis omnibus punctis Ciffoidis GH. Ergo Ciffois GH Hyperbola est. Quod erat demonstrandum.

DE CONCHOIDIBUS ET CISSOIDIbus Parabolicis.

PROPOSITIO V.

Conchois genita ex Parabola, Polo in curva Parabolica constituto, basi autem rectâ parallela axi, est alia Parabola.

Esto segmentum Parabolæ ABC (fig. 4.) cuius axis BO, ordinata ad axem AC; axi BO parallela DE. Polo A,

basi DE ex Parabola ABC sit genita Conchois FN.

Dico FN esse Parabolam.

D E M O N S T R A T I O.

Sit DHF alterum segmentum Parabolæ simile similiterque positum & æquale segmento ABC. Sitque FK Parabolæ FH tangens in F, occurrensque DE in K. Fiat ut AC ad AD ita DK ad DE, & jungatur FE. Ex quocunque puncto N Conchoidis FN ducatur NG parallela DE occurrentis in H, I, M, Parabolæ FHD, & rectis FK, FE.

Quoniam (*hyp.*) FN est Conchois genita Polo A, ex Parabola ABC, cui similis est Parabola DHF, AD est ad DG ut HN ad GH (*prop. 4. de Conchoidibus.*) Ratio autem AD, DG est composita ex duabus 1. AD, DF. 2. DF, DG.

Et cum AC, DF sint æquales ex natura Conchoidis, ratio AD, DF est eadem cum ratione AD, AC, sive (*hyp.*) DE, DK sive æquali GM, GI.

Ratio autem DF, DG est eadem cum ratione GI, GH (*Archim.de Parab. prop. 5.*)

Ergo ratio AD, DG sive illi æqualis HN, GH componitur ex duabus GM, GI, & GI, GH: sive est eadem cum ratione GM, GH. Ac proinde rectæ HN, GM sunt æquales, ergo sublatæ communi HM, duæ GH, MN æquales sunt. Similiter ostendetur ductâ quæcunque aliâ g n parallelâ DE, g b, m n æquales esse. Ergo omnia puncta N, n, Conchoidis sunt ad eamdem Parabolam transeuntem per F, E ut ostendetur Lemmate sequenti. Quare Conchois FN est Parabola. Quod erat demonstrandum.

L E M M A.

Sit segmentum Parabolæ FHD cuius diameter GH eique parallela DE & juncta quæcunque FE, sintque singulis GH, g b, parallelis æquales MN, m n. Dico puncta F, n, E esse ad eamdem Parabolam, cuius vertex N, diameter MN, ordinatim applicata FE.

D E M O N S T R A T I O.

EX proprietate Parabolæ DHF, quadrata GH, g b, sunt ut Rectangula DGF, D g F, sed quadrata GH, g b sunt ut quadrata æquales (*hyp.*) MN, m n. Et Rectangula DGF, D g F sunt ut Rectangula EMF, E m f (cò quid rectæ DF, EF similiiter secentur in punctis G, M, g, m.) Ergo quadrata MN, m n sunt inter se ut Rectangula EMF,

EmE

Em F. Unde patet puncta F, n, N, E esse ad eamdem Parabolam FNE
cujus vertex est in N, diameter NM, applicata FE. Quod erat, &c.

PROPOSITIO VI.

*Cissois genita ex Parabola, Polo in curva constituto, Basi
autem rectâ Parallelâ axi est alia Parabola.*

Esto segmentum Parabolæ ABC (fig. 5.) cuius axis BO
ordinata ad axem AC, axi BO parallela DE. Polo A, Ba-
si DE ex Parabola ABC sit genita Cissois FN.

Dico FN esse Parabolam.

DEMONSTRATIO.

Sit aliud in punto D infra DE segmentum Parabolæ DHF æquale
& simile segmento ABC sed subcontrariè positum (quanquam hic
erit etiam similiter positum propter similitudinem segmentorum ABO,
BCO.) Sitque in F, FK tangens Parabolam FH & occurrentis DE in K,
ut AC ad AD ita sit DK ad DE, jungaturque FE.

Ex quounque punto N Cissoidis FN ducatur NG parallela DE &
occurrentis FD in D, Parabolæ FH in H, & rectis FK, FE in I, M.

Ex proprietate Cissoidis FN (de Cissoibibus prop. II.) AG, GD ::
GN, GH. Ergo componendo AD, GD :: GN + GH, GH.

Sed AD, GD ratio componitur ex rationibus 1. AD, FD (sive AD,
AC, sive (hyp.) DE, DK, sive GM, GI.) 2. FD, GD (sive GI,
GH. Archim. 5. de Parab.) ergo ratio AD, GD sive illi æqualis GN +
GH, GH est eadem cum ratione GM, GH (quæ componitur etiam
ex duabus GM, GI, GH.) Ergo GM æquatur GN + GH, & su-
blatâ communi GN. Duæ GH, NM æquantur.

Punctum igitur N & alia omnia Cissoidis FN sunt (Lemm. pre-
ced.) ad Parabolam eamdem transeuntem per F, E. Quare Cissois FN
est Parabola. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO VII.

*Conchois genita ex Parabola, Polo in vertice Parabolæ
constituto, Basi autem axi Parallelâ est alia Parabola.*

Esto (fig. 6.) Conchois DMO genita ex Parabola ABC, Po-
lo A vertice Parabolæ, Basi DE axi AH parallela.

Dico Conchoidem DMO esse Parabolam.

D E M O N S T R A T I O .

Occurrat Parabola ABC rectæ DE in C. Et Figuræ ADC similis similiterque posita, & æqualis statuatur DKG. Jungaturque DG, & ducatur quæcunque IM parallela DE occurrentis in I, L rectis DF, DG, & in K, M Parabolæ DKG, & Conchoidi DMO.

Ex proprietate Parabolæ DKG cuius vertex D, axis DE, & FG parallela axi, FG, IL :: IL, IK. Sed FG, IL :: DF, DI, sive AD, DI. Ergo AD, DI :: IL, IK. Sed ex proprietate Conch. DMO (*prop. 4 de Conch.*) AD, DI :: MK, IK. Ergo MK, IK :: IL, IK. ac proinde MK, IL sunt æquales, & sublatâ communi KL, duæ IK, LM sunt æquales. Ergo (*Lemm. seq.*) punctum M est ad Parabolam cuius vertex D, tangens DG. Idem ostendetur de aliis omnibus punctis Conchoidis DM. Quod erat demonstrandum.

L E M M A .

Sit Parabola DKG, cuius axis DE, tangens DF, axi parallela FG, junctaque DG. Sit etiam curva DMO talis ut singulæ IK, FG respondentibus LM, GO sint æquales. Ostendendum est DMO esse Parabolam.

Ex proprietate Parabolæ DKG, rectæ FG, IK sunt ut quadrata AF, AI. Sed FG, IK sunt ut æquales GO, LM, & quadrata AF, AI ut quadrata AG, AL. Ergo ex Conicis DMO est Parabola, cuius vertex D, tangens DG, Quod erat ostendendum.

P R O P O S I T I O V I I I .

*Ciffois genita ex Parabola, Polo in vertice Parabolæ constituto,
Basi autem rectâ axi parallela, est etiam Parabola.*

Esto (fig. 7.) Ciffois DMO genita ex Parabola ABC, Polo A vertice Parabolæ, Basi DE, axi AG parallela.
Dico Ciffois DMO esse Parabolam.

D E M O N S T R A T I O .

Occurrat Parabola ABC rectæ DE in C. & Figuræ parabol. ADC similis & æqualis sed subcontrariè posita sit DFG. Jungaturque DG, & ducatur quæcunque IM parallela DE occurrentis in I, L,

rectis DF, DG, & in K, M, Parabolæ DKG & Cissoidi DMO.

Ex proprietate Parabolæ DKG cujus vertex D, axis DE, FG parallela axi; FG, IL :: IL, IK. Sed FG, IL :: DF, DI sive AD, DI; ergo AD, DI :: IL, IK. Sed ex proprietate Cissoidis DMO (*prop. II. de Cissoidibus*) AI, ID :: IM ordinata Cissoidis, IK ordinata figuræ sub contrariae, & componendo AD, DI :: IM + IK, IK. Ergo IM, + IK, IK :: IL, IK, ac proinde IM + IK & IL sunt æquales, & sublata communi IM, duæ IK, LM sunt æquales. Ergo (*Lemm. præc.*) punctum M est ad Parabolam cujus vertex D, tangens DG. Idem ostendetur de aliis omnibus punctis Cissoidis DMO. Quid erat demonstrandum.

PROPOSITIO IX.

Conchois ex Parabola, Polo in vertice, Basí ordinatâ ad axem.

Esto (fig. 8.) Parabola AC cujus vertex A, axis AB, ordinata BC, & ex eâ Polo A, basi BC genita Conchois EF.

Dico EF esse curvam cujus ordinatæ æquantur ordinatis Parabolæ + ordinatis Hyperbolæ secundi generis, in qua quadrata ordinatarum sunt reciprocè ut abscissæ.

DEMONSTRATIO.

Productâ AB in G ita ut BG sit æqualis AB, sit semi-segmentum Parabolæ BGH æquale & simile similiterque positum semi-segmen-
to ABC. Et centro B, asymptotis BC, BG per H descripta intelligatur Hyperbola HL secundi generis in qua quadrata ordinatarum GH, IL sunt ut reciprocè abscissæ BI, BG. Sumpto autem inter B, G, quo-
cunque puncto I ducatur IF ordinata Conchoidis EF, occurrentis in K,
L, Parabolæ BH, & Hyperbolæ HL.

Ex proprietate Hyperbolæ HL quadratum IL est ad quadr. GH ut BG ad BI, sive ex natura Parabolæ BH, ut quadratum GH ad quadra-
tum IK. Ergo tres IL, GH, IK sunt proportionales. Estque IL ad IK
ut quadratum GH ad quadr. IK.

Rursus ex proprietate Conchoidis EF (*4. prop. de Conchoid.*) FK est ad IK ut AB ad BI, sive ut BG ad BI, sive ut quadr. GH ad quadr. IK. Ostensum est autem quadr. GH esse ad quadr. IK ut IL ad IK. Ergo FK est ad IK ut IL ad eamdem IK. Quare FK, IL sunt æquales, & sublata communi KL, FL IK sunt etiam æquales, ergo FI ordinata Conchoi-

dis EF æquatur IK ordinatæ Parabolæ † IL ordinatæ Hyperbolæ secundi gradus prædictæ. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO X.

Conchoides genitæ ex Parabolis cuiuscunque gradus.

Sit (fig. 8.) Parabola ABC secundi generis quæcunque, atque ex illa, Polo A vertice, Basi BC ordinatâ, genita sit Conchois EF.

Dico Conchoidem EF esse talem curvam ut ejus ordinatæ IF æquentur IK ordinatis Parabolæ BGH similis genitrici ABC † IL ordinatis Hyperbolæ alicujus secundi generis.

DEMONSTRATIO.

Sit itaque HL curva talis ut IK † IL æquentur IF ordinatis Conchoidis EF genitæ ex Parabola AC. Ostendendum est, HL esse aliquam Hyperbolam secundi generis.

Sit verbi gratia Parabola ABC ac proinde similis & æqualis BGH talis ut abscissæ BI, BG sint ut cubi IK, GH.

Quoniam (*hyp.*) IK † IL æquantur IF. IL æquatur FK. Et IK, IL :: IK, KF. Atqui (*de Conchoid. 4.*) IK, KF :: BI, BA seu BG. Ergo IK, IL :: BI, BG. Est autem ratio BI, BG æqualis (*hyp.*) triplicata IK, GH. Ergo ratio IK, IL est triplicata rationis IK, GH. Sed ratio IK, IL componitur ex duabus IK, GH; GH, IL, ergo composita ex duabus IK, GH; GH, IL est triplicata rationis IK, GH. Quare ratio GH, IL est duplicata rationis IK, GH. & triplicata GH, IL est sextuplicata rationis IK . GH. Cùm autem (*hyp.*) triplicata IK, GH sit ipsa ratio BI, BG, sextuplicata IK, GH est duplicata BI, BG. Ergo triplicata GH, IL est duplicata BI, BG. Sive cubus GH est ad cubum IL ut quadratum BI ad quadratum BG. Quare curva HL est Hyperbola secundi generis centro AB, asymptotis BC, BG descripta per H.

Sit iterum Parabola AC ac proinde BH talis ut quadrata BI, BG sint quemadmodum cubi IK, GH.

Ostendetur ut antè rationem IK, IL eamdem esse cum ratione BI, BG. Ergo quadrata IK, IL sunt ut quadrata BI, BG sive (*hyp.*) ut cubi IK, GH. Componitur autem ratio quadrati IK ad quadr. IL ex rationibus quadratorum IK, GH. & quadratorum GH, IL, ergo composita ex duplicata IK, GH & duplicata GH, IL æquatur rationi cuborum IK, GH sive triplicata IK, GH. Quare duplicata GH, IL æquatur

tur rationi IK, GH. Ergo sextuplicata GH, IL æquatur triplicata IK, CH sive [hyp.) duplicata ipsius BI, BG. Quare triplicata GH, IL æquatur rationi BI, BG. Ergo ut BI ad BG ita est reciprocè cubus GH ad cubum IL.

Eodem modo demonstrabitur in aliis Parabolis, ergo &c. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. 1. Innotescet autem cuius gradus sit Hyperbola HI per hanc regulam universalem.

Centro B, asymptotis BC, BG per H descripta sit Hyperbola HL in qua exponens potestatis ordinatarum GH, IL idem sit cum exponente potestatis ordinatarum Parabolæ BGH sive ABC, exponens autem potestatis abscisarum BI, BG, sit differentia inter exponentes potestatis abscisarum & ordinatarum in predicta Parabola ABC.

Hyperbola HL erit talis ut ejus ordinatae IL + ordinatae IK sint aequales ordinatis IF Conchoidis genitæ ex parabola ABC, Polo A, basi BC. Ex allatis exemplis hoc satis liquet.

Corollarium. 2. Ex præcedenti propositione patet haberi quadraturam omnium Conchoidum quæ generantur ex Parabola, Polo in vertice constituto, assumptâ autem pro basi quâcunque ordinatâ ad axem.

Cùm enim (fig. 8.) singulæ IF ordinatæ Conchoidis EF æquantur IK + IL, segmentum IGEF æquatur segmento IGHK + segmento IGHL, cùm ergo segmentum IGHK sit Parabolæ aliqujus generis, segmentum autem IGHL sit Hyperbolæ secundi generis, quadrantur autem tam Parabolæ cujuscumque generis quam Hyperbolæ secundi generis ut Geometris notum est. Manifestum est segmentum IGEF quadrari.

Eadem ratione totus locus Conchoidicus BGEFM æqualis est segmento Parabolico BGH + loco Hyperbolico BGHLM.

SCHOLION.

De Conchoidibus genitis ex Parabolis cujuscumque generis Polo in vertice constituto, Basi autem Parallelæ axi.

Postquam præcedentem propositionem demonstravimus, advertimus etiam quadraturam haberi omnium Conchoidum quæ ex Parabolis cujuscumque generis generantur, polo in vertice constituto, basi autem axi parallelæ,

THEOREMA.

Resumatur enim figura 6. in qua AC est Parabola cujus axis AH; vertex A, DC parallela axi, Conchois MO genita ex Parabola AC, Polo A, basi DC.

Dico Conchoidem MO esse curvam cujus ordinatae IM æquantur ordinatis IK Parabolæ DG similis ipsi AC + ordinatis IL linea GL, quæ vel recta est vel Parabolica alicujus generis.

DEMONSTRATIO.

Nam primò sit AC eique similis & æqualis DG. Parabola communis. Probatum est in demonstratione (*prop. 7.*) hujus Exercit. junctâ DG quæ occurrat IM in L., duas. IL & KM æquales esse, ergo IM æquatur IK + IL, ordinatae ad rectam GL quæ in hoc casu recta est.

Sit secundò AC, eique similis DG Parabolica secundi generis, verbi gratiâ, in qua cubi abscissarum DI, DF sunt ut ordinatae IK, FG. Sit linea GL talis ut semper IL + IK æquentur IM.

Ostendendum est lineam GL esse Parabolicam alicujus generis.

Cum IL + IK æquentur IM, duæ IL, KM æquales sunt, ac proinde ratio IK, IL æqualis rationi IK, KM sive (*de Conchoid. prop. 4.*) rationi DI, DA aut DI, DF.

Jam (*hyp.*) ratio IK, FG est triplicata DI, DF ergo addita communi FG, IL, ratio compos. ex IK, FG; FG, IL, sive ratio IK, IL, sive ratio DI, DF componitur ex triplicata DI, DF & ex ratione FG, IL. Sive ex tribus 1. DI, DF. 2. quadr. DI ad quadr. DF. 3. FG, IL. Componitur autem ratio eadem DI, DF ex tribus. 1. DI, DF. 2. FG, IL. 3. IL, FG cum hæ dua ultimæ facientes rationem æqualitatis nihil immutent. Ergo tres. 1. DI, DF. 2. quad. DI. quad. DF. 3. FG, IL componunt eamdem quam tres. 1. DI, DF. 2. FGIL. 3. IL, FG. Et go sublatis utrinque duabus communibus. DI, DF; & FG, IL. Remanet ratio quadr. DI, ad quadr. DF, æqualis rationi IL, FG. Quare linea GL non est recta in hoc casu sed Parabolica cujus vertex D, tangens DF, suntque ordinatae IL, FG ut quadrata abscissarum DI, DF,

Eodem modo demonstrabitur in aliis Parabolis.

Cognoscetur autem cuius gradus sit Parabolica GL per regulam sequentem similem ei quam ante tradidimus.

Vertice D, per G describatur Parabola DLG in qua exponens ordinatum IL, FG sit idem cum exponente potestatis ordinatarum IK, FG in

Parabola DKG sive ABC proposita. Exponens autem potestatis abscissa-
rum DI, DF sit differentia inter exponentes potestatis abscissarum & or-
dinatarum in predicta Parabola ABC vel DKG.

Parabola GLD erit talis ut ejus ordinata IL + ordinata IK eque-
tur IM ordinatis Conchoidis DMO genitis ex Parabola ABC, Polo A,
Basi DC.

PROPOSITIO XI.

Ciffois genita ex Parabola, Polo in vertice Parabo-
la constituto, Basi autem ordinata ad axem
Parabolæ.

Esto (fig. 9.) Parabola ABC cujus vertex A, axis AB, BC
ordinata ad axem. Polo autem A, Basi BC, ex Parabola
AC generetur Ciffois AFE.

Dico FE esse curvam cuius ordinatæ æquantur ordinatis Hy-
perbolæ secundi generis (in qua quadrata ordinatarum sunt
reciproce ut abscissæ) — ordinatis Parabolæ.

DEMONSTRATIO.

Sit BGH Parabola similis & æqualis Parabolæ ABC sed subcon-
trariè posita, & productâ CB in M. Centro B, asymptotis BG,
BM per H descripta intelligatur Hyperbola HL in qua quadrata ordina-
tarum GH, IL sint ut reciprocè abscissæ BI, BG. Sumpto autem in-
ter B, G, quocunque puncto I ducatur IF ordinata Ciffoidis EF, oc-
currentis in K, L, Parabolæ BH, & Hyperbolæ HL.

Ex proprietate Hyberbolæ HL, quadratum IL est ad quadratum
GH, ut BG ad BI, sive ex natura Parabolæ BH ut quadratum GH ad
quadratum IK. Ergo tres IL, GH, IK sunt proportionales, estique IL
ad IK ut quadratum GH ad quadratum IK.

Rursus ex proprietate Ciffoidis EF (prop. II. de Ciffoid.) FI, IK ::
AI, IB, & componendo FK, IK :: AB, BI, sive BG, BI. Sive ut
quadr. GH ad quadr. IK. Ostensum est autem quadr. GH esse ad quadr.
IK ut IL ad IK. Ergo FK, IK :: IL, IK. Quare FK, IL æquales sunt,
& sublata communi IK, FI ordinata Ciffoidis æquatur KL, sive IL or-
dinata Hyperbolæ HL — IK ordinata Parabolæ BH. Quod erat de-
monstrandum.

PROPOSITIO XII.

Cissoides genitæ ex Parabolis cuiuscunque gradus.

Sit (fig. 9.) Parabola ABC secundi generis quæcunque, atque ex illa, Polo A vertice, Basi BC ordinata, genita sit Cissoidis EF.

Dico Cissoidem EF talem esse curvam ut ejus ordinatæ IF æquentur IL ordinatis Hyperbolæ secundi generis — IK ordinatis Parabolæ similis genitrici ABC.

DEMONSTRATIO.

Sit itaque HL curva talis ut IL — IK æquentur IF ordinatis Conchoidis EF genitæ ex Parabola AC. Ostendendum est HL esse aliquam Hyperbolam secundi generis.

Sit, verbi gratiâ, Parabola ABC ac proinde similis BGH talis ut abscissæ sint ut cubi ordinatarum respondentium.

Quoniam (hyp.) IL — IK æquatur IF. Additâ communi IK. IL æquatur FK. Et IL, IK :: FK, IK. Atqui (de Cissoid. prop. II.) FK, IK :: AB seu BG, BI. Ergo IL, IK :: BG, BI. Et invertendo IK, IL :: BI, BG. Est autem ratio BI, BG (hyp.) triplicata IK, GH. Ergo ratio IK, IL triplicata est rationis IK, GH. Sed ratio IK, IL componitur ex duabus IK, GH; GH, IL. Ergo composita ex duabus IK, GH; GH, IL, est triplicata rationis IK, GH. Quare ratio GH, IL duplicata est rationis IK, GH, & triplicata GH, IL est sextuplicata IK, GH. Cum autem (hyp.) triplicata IK, GH. sit ipsa ratio BI, BG, sextuplicata IK, GH est duplicata BI, BG. Ergo triplicata GH, IL est duplikeata BI, BG. Sive cubus GH, est ad cubum IL ut quadratum BI ad quadratum BG. Quare curva HL est Hyperbola secundi generis centro B asymmetris BM, BG descripta per H.

Eodem propè modo in aliis Parabolis cuiuscunque gradus fuerint demonstratio procedet.

Ergo &c. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. 1. Cujus autem gradus sit Hyperbola HL innotescer per Regulam quam in Coroll. I. præced. propos. tradidimus.

Corollarium. 2. Hinc etiam habetur quadratura omnium Cissoidum genitarum ex Parabolis, Polo in vertice constituto, Basi autem ordinata ad axem.

Est enim summa rectarum IF, æqualis summa notæ rectarum IL — summa item notæ rectarum IK.

SCHOLION.

S C H O L I O N.

De Cissoidibⁿs genitis ex Parabolis cujuscunque generis Polo in vertice constituto, basi autem axi parallela.

Resumatur (fig. 7.) in qua ABC est Parabola cuius axis \overline{AX} , vertex A, DC parallela axi, Cissoidis DMO genita ex Parabola ABC, Polo A, basi DC.

Dico Cissoidem DMO esse curvam cuius ordinatæ IM æquantur ordinatis IL lineæ GLD quæ vel recta est vel Parabolica alicujus generis — ordinatis IK Parabolæ similis ipsi AC sed subcontrariè positæ.

Nam primò sit ABC eique similis & æqualis DKG Parabola cōmuniſ. Probatum est in demonstratione prop. 8. hujus Exercit. IM + IK æquari ipsi IL. Ergo IM æquatur IL — IK. Est autem in hoc casu DG recta, ut ibidem ostensum est.

Sit secundo ABC, eique similis DKG Parabolica secundi generis, in qua verbi gratiâ, cubi abscissarum DI, DF sunt ut ordinatæ IK, FG. Sitque linea DLG talis ut semper IM æquetur IL — IK.

Ostendendum est lineam DLG esse Parabolicam alicujus generis.

Cūm IM æquetur IL — IK, IM + IK æquatur IL. Et IK est ad IL ut IK ad IM + IK sive ut DI, ad DF. (de Cissoid. prop. 11.)

Hoc posito. Jam eodem modo iisdemque verbis demonstrationem absolvere potes, ut factum est antè in Scholio prop. 10. pro Conchoid.

Et cognoscetur cuius gradus sit Parabolica curva DLG, utendo Regula quam ibidem tradidimus. Erit enim DLG Parabola cuius vertex D, tangens DF, ordinatae IL, FG. Exponensque ordinatarum erit idem qui ordinatarum Parabolæ ABC vel DKG, exponens autem abscissarum erit differentia inter exponentes ordinatarum & abscissarum ejusdem Parabolæ ABC vel DKG.

P R O P O S I T I O X I I I .

*Conchois genita ex Parabola Polo in axe constituto,
Basi autem parallelâ axe.*

Esto (fig. 10.) Parabola ABC cuius vertex C, axis AC BE parallela axe BC, & sumpto in axe quocunque puncto A. Polo A, ex Parabola BC, Basi BE, genita sit Conchois DK.

Dico DK curvam talem esse ut ejus ordinatae aequales sint ordinatis Parabolae genitricis et ordinatis segmenti Hyperbolae determinati.

DEMONSTRATIO.

Sit Parabola BDE similis & aequalis similiterque posita Parabola ABC. Junganturque BC, DE, & sumpto inter B, D quocunque puncto F, per illud agatur FK parallela BE, occurrentis in G recte DE, in H Parabolae DHE, & in K Conchoidi DK. linea DI intelligatur talis ut semper AB, BF sit ut FI, FH.

Quoniam ut AB ad BF ita ex hypothesi est tota FI ad totam FH; & ut AB ad BF sive BD ad BF, ita est etiam ablata FG ad ablatam GH *Archim. 4. de quadrat. Parabolae*) erit ut AB ad BF, ita reliqua GI ad reliquam FG. Ergo punctum I est ad Conchoidem ex recta BC descrip- tam Polo A, Basi BE (*de Conchoid. 4.*) hujusmodi autem Conchois est Hyperbola transiens per D, cuius centrum B, asymptoti BE, BL, produc- ta CB in L. (*prop. 3. hujus Exercit.*) Ergo omnia puncta I linea DI sunt ad eamdem Hyperbolam. Et figura FDI est segmentum seu Trili- neum Hyperbolicum. Jam vero quoniam ex hyp. DK est Conchois genita Polo A, Basi BE, ex Parabola ABC, cui similis & aequalis est BDE similiterque posita, AB, BF :: KH, FH. Sed AB, BF :: FI, FH (*hyp.*) ergo KH, FI aequales sunt, aequatur autem FK, FH et HK, ergo eadem FK ordinata Conchoidis DK aequatur FH ordinata, Parabolae DHE et FI ordinata Trilinei Hyperb. FDI. Quod erat demonstr.

Corollarium. Hinc constat hujusmodi Conchoidem etiam quadrari datâ Hyperbolae quadraturâ.

PROPOSITIO XIV.

Ciffois Cognata Conchoidi precedenti.

Esto (fig. II.) Parabola ABC cujus vertex C, axis AC, ordinata AB, BEM axi AC parallela. Polo A quocunque axis puncto, ex Parabola BC, basi BM generetur Ciffois AK.

Dico AK curvam talem esse, ut ejus ordinatae aequales sint ordinatis segmenti Hyperbolici determinati — ordinatis in segmento Parabolico.

DEMONSTRATIO.

Sit Parabola BDE similis & aequalis, sed subcontrarie posita Parabolae ABC, junganturque BC, DE, & sumpto inter B, D quocunque

puncto F, per illud agatur FK parallela BE, occurrentis in G rectâ DE, in H Parabolæ DHE, & in K Conchoidi AK. Sit etiam ex rectâ BC, Polo A, Basi BM genita Cissois AI. Quæ erit Hyperbola (ut probatum est antè in prop. 4. hujus Exercitationis.) Occurrat autem in I rectâ FK.

Erit ergo AF, FB :: IF, FG (prop. II. de Cissois.) cùm Triangulum DBE sit simile & æquale & subcontrariè positum Triangulo ABC, ergo componendo AB, BF :: IG, FG.

Rursus quoniam AK est Cissois genita ex Parabola ABC, cui similis æqualis & subcontraria est DHE; KF, FH :: AF, FB, (prop. II. de Cissois.) & componendo AB, BF :: KH, FH.

Quoniam igitur ut AB, ad BF ita est tota KH ad totam FH, & ablatâ IG ad ablatam FG, etiam ut AB ad BF erit reliqua IK + GH ad reliquam GH. Ut autem AB ad BF ita est etiam FG ad GH (Archim. 4. de Parabol.) ergo IK + GH, GH :: FG, GH. Quare IK + GH & FG æquales sunt. Et additâ communî IF, KF + GH æquantur IG. Ergo KF ordinata Cissoidis AK æquatur IG ordinatæ in segmento seu trilineo Hyperbolico AGI — GH ordinatæ in segmento Parabolico DHE. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc constat hujusmodi Cissoideam etiam quadrari datum Hyperbolæ quadraturâ.

DE CONCHOIDIbus ET CISSOIDIbus Hyperbolicis.

PROPOSITIO XV.

Conchois genita ex Hyperbola, Polo in curva constituto, Basi autem asymptoto.

Esto (fig. 12.) Hyperbola AB cujus centrum C, asymptoti CD, CE, & in ea sumpto quovis puncto A, Polo A, basi ipsa asymptoto CE, genita sit ex Hyperbola AB Conchois FG.

Dico FC esse aliam Hyperbolam transcurrentem per Polum A, & habentem pro asymptoto ipsam CD.

DEMONSTRATIO.

EX A ducatur AD parallela CE, & AH parallela CD. Sumptaque CL æquali CD, & per L ductâ LM parallelâ CE. Centro L, asymptotis LC, LM descripta sit Hyperbola HK similis & æqualis similiter-

que posita Hyperbolæ AB. Sumpsto verò quoconque puncto O inter CL, ducatur OG parallela CE, occurrens in G Conchoidi FG, in K Hyperbolæ HK, & in N rectæ AH productæ in P ubi secat LM.

Quoniam ex hypoth. FG est Conchois genita ex Hyperbola AB cuius axis AH, & cui similis & æqualis est Hyperbola HK. AH, HN :: GK, KN. (*de Conchoid. 4.*) & componendo AN, HN :: GN, KN.

Jam ex natura Hyperbolæ HK cuius centrum L asymptoti LC, LM, LC, LO :: OK, CH sive PH, PN :: KO, ON, & dividendo HN, NP :: KN, NO.

Cùm ergo sit AN, HN :: GN, KN. Et HN, NP :: KN, NO. Ex æquo AN, NP :: GN, NO. Et componendo AP, PN sive DL, LO :: GO, ON sive GO, DA.

Punctum ergo G est ad Hyperbolam cuius centrum L asymptoti LD, LM, descriptam per A. Idem ostendetur de aliis punctis Conchoidis FG. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XVI.

Ciffois Cognata præcedenti non est Hyperbola, sed linea recta.

Esto (fig. 13.) Hyperbola AB, cuius centrum C asymptoti CD, CE. Polo A puncto aliquo Hyperbolæ, basi CE asymptoto genita sit aliqua Ciffois.

Dico illam esse lineam rectam, alteri asymptoto CD parallelam.

DEMONSTRATIO.

EX A ducatur ad CE recta AF asymptoto CD parallela, & in CE sumatur FG æqualis CF, atque per G ducatur GI parallela CD.

Dico GI esse Ciffoideum Polo A, basi CE, genitam ex hyperbola AB.

Ducatur enim per A quæcunque DE, occurrens asymptotis in D, E, Hyperbolæ AB in B, & rectæ GI in H. Quoniam CF, FG æquales sunt (*hyp.*) etiam AD. AH sunt æquales. Atqui ex proprietate Hyperbolæ AB, duæ AD, BE sunt etiam æquales; ergo AH, BE æquales sunt, quare additâ communii HB, etiam AB, HE, æquales sunt. Ergo punctum H est ad Ciffoideum genitum Polo A, basi CE ex Hyperbola AB. Idem autem ostendetur de omnibus aliis punctis rectæ GI. Ergo GI Ciffois est ex Hyperbola AB, Polo A, basi BE. Quod erat demonstrandum.

PROPO-

PROPOSITIO XVII.

*Conchois genita ex Hyperbola, Polo in curva constitu-
to, basi autem parallela uni asymptoto in certo casu
est altera asymptotus, in aliis Hyperbola.*

Sit Hyperbola AB cujus centrum C (fig. 13.) & ductâ AF parallelâ asymptoto CD, sumptâque FG æquali CF, per G ductâ sit GI parallela eidem CD. Atque Polo A, basi GI ex Hyperbola AB generetur Conchois.

Dico illam esse alteram asymptotum CE.

DEMONSTRATIO.

PAtet ex præcedenti, ibi enim ostensum est ductâ quâcunque AE, esse AB æqualem HE. Ergo punctum E est ad Conchoidem Polo A, basi GI, genitam ex Hyperbola AB. Idem ostendetur de aliis punctis. Ergo &c.

Sit jam secundò (fig. 14.) Hyperbola AB, cujus centrum SC, asymptoti CD, CE & sumpto in curva AB quocunque puncto F, atque ex illo ductâ GF parallelâ CE quæ occurrat CD in G. Sit GH æqualis GC.

Sumatur jam in GD asymptoto infinita aliud punctum quodcunque K extra H, per quod ducatur KL parallela CE. Et intelligatur Polo F, basi KL, ex curva Hyperbolica FB generari Conchois O, ductâ nimirum ex F ad quodcunque hyperbolæ punctum M rectâ FM quæ occurrat KL in N, & sumptâ NO æquali ipsi FM.

Dico Conchoidem O esse Hyperbolam.

DEMONSTRATIO.

Super KL intelligatur constituta Hyperbola ST similis & æqualis similiterque posita Hyperbolæ FB, ac proinde cujus centrum R tantumdem distet à K, quantum C centrum Hyperbolæ FB distat à G. Per R ducatur XZ parallela CE; juncta etiam FS producatur in V.

Sumpto jam in Conchoide O quoctunque puncto O per illud ducatur OV parallela CE, occurrentis rectâ CD in D, & hyperbolæ ST in T, & rectâ FV in V.

Quoniam Oo (*Hyp.*) est Conchois Hyperbolæ FB & super basi KL constituta est Hyperbola ST similis similiterque posita genitrici FB, est FS, SV (*4. de Conchoid.*) sive GK, KR :: OT, TV. Atqui KD, KR :: TV, DT ex natura hyperbolæ ST (est enim KS sive DV, DT :: RD, RK. Ergo dividendo DK, KR :: TV, DT.)

Cum igitur sit GK, KD :: OT, TV. Et KD, KR :: TV, DT. Ex æquo GK, KR :: OT, DT. Similiter ostendetur esse GK, KR :: od, dt . Ergo OD, DT :: od, dt . Et permutando OD, $od :: DT dt$. Est autem DT, $dt :: Rd, RD$ ex natura hyperbolæ NT cuius centrum R, asymptoti RD, RZ. Ergo OD, $od :: Rd, RD$. Ac proinde Oo Conchois est Hyperbola cuius centrum R, asymptoti RD, RX. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XVIII.

Conchois ex Hyperbola, Polo in centro Hyperbolæ, basi autem parallelâ asymptoto.

Esto (fig. 15.) Hyperbola AB cuius centrum C, asymptoti CD, CE. Et DF parallela CE. Polo C, basi DF genita sit Conchois GH.

Dico Conchoidem GH esse curvam cuius ordinatæ æquuntur ordinatis Hyperbolæ genitricis + ordinatis hyperbolæ secundi generis.

DEMONSTRATIO.

Super DF sit DIKLF Hyperbola similis & æqualis similiterque posita hyperbolæ CDBAE, sit autem & KN curva talis ut DI, DM :: MN, ML.

Ex hyp. DI, DM :: MN, ML. Sed DI, DM :: ML, KI, ex proprietate hyperb. KL. Ergo MN, ML :: ML, IK quare MN, IK :: quadr. ML, quadr. IK. Sive quadr. DI. quad. DM. Igitur curva KN est hyperb. secundi generis in qua ordinatæ MN, IK sunt ut quadrata abscissarum DI, DM reciprocè. Jam quoniam GH (*hyp.*) Conchois est Hyperbolæ AB, cui similis est KL, HL, ML :: CD, DM. Sed CD, DM vel DI, DM :: MN, ML ut dictum est. Ergo HL, ML :: MN, ML. Quare HL æquatur MN. Ergo MH ordinata Conchoidis GH æquatur ML ordinatæ Hyperbolæ KL similis & æqualis genitrici AB + MN ordinatæ hyperbolæ KN secundi generis. Quod erat demonstrandum.

Corollar. Hinc tales Conchoides quadrantur datâ Hyperbolæ com-

munis quadraturā , nam Hyperbolam secundi generis quadratura habetur.

PROPOSITIO XIX.

Conchois ex Hyperbola secundi generis.

SIt (fig. 15.) Hyperbola AB non communis & primi generis sed secundi , & cætera ponantur ut in propos. præced.

Dico Conchoidem GH esse talem ut ejus ordinatæ MH æquentur ordinatis ML Hyperbolæ KL similis genitrici & MN ordinatis KN Hyperbolæ alterius secundi generis.

DEMONSTRATIO.

SIt verbi gratia AB ac proinde KL talis Hyperbola ut ordinatæ ML, IK sint ut quadrata abscissarum DI , DM.

Positâ rursus KN tali ut DI , DM :: MN , ML. Ostendetur facilè KN esse Hyperbolicam.

Nam MN , IK ratio componitur ex MN , ML (sive DI , DM) & ML , IK (sive quadr. DI ad quadr. DM.) Ergo MN , IK ratio est triplicata rationis DI , DM , sive MN est ad IK ut cubus DI ad cubum DM. Est ergo KN una ex Hyperbolicis.

Sit jam KL alia Hyperbola in qua nimirum quadrata ML , IK sint ut abscissæ DI , DM. Sitque rursus KN talis ut MN , ML :: DI , DM. Ostendetur KN esse Hyperbolicam.

Nam quadrati MN ad quadratum IK ratio componitur ex ratione quadr. MN ad quadr. ML (sive quadrati DI ad quadr. DM) & quadrati ML ad quadr. IK (sive DI , DM.) Ergo quadr. MN est ad quadr. IK in triplicata ratione DI , DM , sive ut cubus DI ad cubum DM. Ergo KN Hyperbolica est.

Ut autem statim cognoscas cuius gradus sit Hyperbola KN hanc accipe Regulam.

*Hyperbola KN talis est ut exponens potestatis ordinatarum MN , IK sit idem cum exponente potestatis ordinatarum ML , IK Hyperbolæ proprie*te*, exponens autem potestatis abscissarum DI , DM sit aggregatum exponentium potestatis ordinatarum & abscissarum in eadem Hyperbola KL.*

Hoc autem semel ostendo facilis est jam demonstratio propositionis. Quoniam enim (hyp.) GH est Conchois Hyperbolæ BA , Polo C, basi DF. atque Hyperbolæ BA similis , æqualis & similiter posita est KL, HL est ad LM ut CD ad DM (de Conchoid. 4.) hoc est ut DI ad DM, hoc

est (*hyp.*) ut MN ad ML. Ergo HL & MN sunt æquales, ac proinde MH æquatur ML ordinatæ Hyperbolæ KL similis genitrici BA + MN ordinatæ Hyperbolæ KN quam esse Hyperbolam secundi generis ostendunt est. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc Conchoidum hujusmodi quæ generantur ex Hyperbolis secundi generis habetur quadratura. Summa enim ordinatarum ML, MN quadratur (cum KL, KN sint Hyperbolæ secundi generis, ergo utriusque summæ æqualis summa ordinatarum MH in Conchoide GH pariter quadratur.

PROPOSITIO XX.

*Cissoidis Cognata Conchoidi de qua agitur in prop. 18.
præcedenti.*

Esto (fig. 16.) Hyperbola AB cujus centrum C, asymptoti CD, CE, & BDF parallela CE. Polo C basi DB genita sit Cissoidis GH.

Dico Cissoidem GH esse curvam cujus ordinatæ æquantur ordinatis Hyperbolæ secundi generis — ordinatis Hyperbolæ similis genitrici.

DEMONSTRATIO.

Sit Hyperbola KL similis & æqualis genitrici AB sed subcontrariè posita, ejusque centrum sit D, asymptoti DI (vel DC & DF. Sit autem & KN curva talis ut dicitur quæcunque ordinatæ MN sit DI, DM :: MN, ML. Occurrat autem MN Cissoidi GH in H.

Ratio MN, IK componitur ex rationibus MN, ML (five DI, DM) & ML, IK five iterum DI, DM (propter Hyperbolam KL.) Ergo ratio MN, IK duplicata est rationis DI, DM, five MN est ad IK ut quadratum DI ad quadr. DM reciprocè. Quare KN est Hyperbola secundi generis. Hoc posito facile absolve tur demonstratio hoc modo. Quoniam GH est Cissoidis hyperbolæ AB, cui similis & subcontraria est KL, CM, MD :: HM, ML (*de Cissoid. prop. 11.*) & componendo CD, MD :: HL, ML. Sed CD, MD five DI, DM :: MN, ML ex natura curvæ KL. Ergo HL, ML :: MN, ML. Unde HL & MN sunt æquales. Ergo HM ordinata Cissoidis GH, æquatur MN ordinatæ Hyperbolæ KN secundi generis — ML ordinatæ Hyperbolæ KL æqualis & similis genitrici AB. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hujusmodi ergo Cissoides quadrantur datâ Hyperbolæ communis quadraturâ.

PROPO-

141
PROPOSITIO XXI.

*Ciffois Cognata Conchoidi, de qua agitur in prop. 19.
precedenti.*

SIt (fig. 16.) Hyperbola AB non communis sed secundi generis, & cætera ponantur ut in prop. 20. proximè antecedenti.

Dico Ciffoisdem GH esse talem ut ejus ordinatæ æquentur ordinatis MN Hyperbolæ secundi generis — ML ordinatis hyperbolæ KL similis genitrici AB.

DEMONSTRATIO.

SIt verbi gratia AB ac proinde KL talis Hyperbola ut ordinatæ ML, IK sint inter se ut quadrata abscissarum DI, DM reciprocè. Sitque KN talis ut DI, DM :: MN, ML. Ostendetur primò KN esse Hyperbolam secundi generis.

Nam MN, IK ratio compon. ex MN, ML (sive DI, DM) & ML., IK [sive quad. DI, quad. DM.] Ergo ratio MN, IK triplicata est ratiois DI, DM. Sive MN est ad IK ut cubus DI ad cubum DM, est ergo KN una ex Hyperbolicis.

Quo posito facilè ostendetur propositio, nam HL, ML :: DI, DM (de Ciffois. II.) :: MN, ML, ergo HL æquatur MN & HM est MN — ML.

Similiter ostendetur propositio quæcunque alia Hyperbola supponatur AB. Quod erat demonstrandum.

Porrò ut habeatur gradus Hyperbolæ KN, intendum est Regula quam tradidimus in prop. 19.

*DE CONCHOIDIBUS ET CISSOIDIBUS
genitis ex Figuris Homogeneis.*

Definitio. Figuræ Homogeneæ dicantur illæ quæ axem eundem habent. & ordinatas proportionales. Ita (fig. 17.) si figuræ ABC, ABD sint tales ut & axem eundem habeant AB & ductis quibuscumque ordinatis ACD, EFG sit semper AC, AD :: EF, EG vel permutando AC, EF :: AD, EG. Figuræ ABC, ABD dicuntur Homogeneæ.

PROPOSITIO XXII.

Homogenearum Figurarum Analogia.

Si habeatur unius Figuræ Homogeneæ ABC quadratura; Rotundum circa axem, Rotundum circa basin, centrum gravitatis, & tangens.

Dico hæc eadem in altera Homogenea haberi.

DEMONSTRATIO.

Hæc jam à multis aliis demonstrata sic breviter ostenduntur,

1. **S**i habeatur quadratura figuræ ABC, habetur & quadratura figuræ Homogeneæ ABD.

Est enim (*hyp.*) perpetuò AC, AD :: EF, EG. Ergo ex methodo indivisibilium figura ABC est ad figuram ABD ut AC, ad AD.

2. **S**i habeatur Rotundum ex ABC circa axem AB, habetur Rotundum ex ABD circa cumdem axem AB.

Cùm enim sit semper AC, AD :: EF, EG. Circulus radii AC est ad circulum radii AD ut circulus radii EF ad circulum radii EG. Ergo ex methodo indivis. summa circulorum ex radiis AC, EF hoc est Rotundum ex ABC circa AB est ad summam circulorum ex radiis AD, EG sive ad Rotundum ex ABD circa AB ut circulus radii AC ad circulum radii AD. sive ut quadratum AC ad quadratum AD.

3. **S**i habeatur Rotundum ex ABC circa basin AC, habetur Rotundum ex ABD circa AD basin.

Dum enim volvuntur ABC, ABD circa bases AC, AD, singulæ ordinatæ EF, EG describunt superficies Cylindricas quæ sunt inter se ut ordinatæ ipsæ EF, EG. (Sunt enim ut rectangula AEF, AEG.) Ergo summæ illarum superficierum sive Rotunda sunt inter se ut una ordinata AC ad alteram AD.

4. **S**i habetur centrum gravitatis figuræ ABC, habetur & figuræ ABD.

Est enim Rotundum ex ABC circa AB ad Rotundum ex ABD circa

AB in ratione compos. figurarum ABC, ABD & viarum rotationis si-
ve distantiarum centrorum grav. ab axe revolutionis AB (*Tacquet. lib. 5.*
Cylindric. & Annularium,) ratio autem Rotundorum nota est, eadem
neinque quæ quadratorum AC, AD (*num. 2.*) ergo illi æqualis ratio
composita nota est. Est autem nota ratio figurarum ABC, ABD. Eadem
nempe quæ AC, AD. Ergo & nota est ratio distantiarum cen-
trorum ab axe AB, eadem nempe erit etiam quæ AC, AD. Unde si
habeatur una distantia nempe centri grav. figuræ ABC, ab axe AB, ha-
betur & alia figuræ ABD.

Similiter ostendetur si habeatur distantia centri grav. figuræ ABC
à basi AC, haberi distantiam centri gravit. figuræ ABD à basi AD.

Jam si habetur centrum grav. figuræ ABC habetur ejus distantia tum
ab axe AB, tum à basi AC. Ergo habebitur etiam distantia tum ab
axe AB tum à basi AD centri grav. figuræ ABD ac proinde ejus cen-
trum gravitatis.

5. **D**Enique si habeatur tangens in C curvæ BC, habetur
tangens in D curvæ BD.

Sit enim AE infinitè exigua, ergo curvæ CF, DG haberi possunt ut
particulæ tangentium. Cum verò sit (*hyp.*) AC, EF :: AD, EG.
rectæ CF, DG convenienter in idem punctum H. Jam si habetur tan-
gens CH, habetur punctum H, ergo & recta DH. *Quod erat demon-
strandum.*

PROPOSITIO XXII.

COnchoides genitæ ex Figuris Homogeneis eodem Polo
eadémque basi, sunt etiam Figuræ Homogeneæ.

DEMONSTRATIO.

EX figuris Homogeneis ABC, ABD, (*fig. 18.*) Polo eodem A, ea-
démque basi GX generentur Conchoides HI, HK. Ostendendum
est eas esse Homogenæas.

Super Basi GX sint figuræ similes, æquales, & similiter positæ
GHO, GHP figuris ABC, ABD, & ducatur quæcunque LMNIK oc-
currrens in M, N curvis HO, HP, & in I, K Conchoidibus HI, HK.

Ratio LI, LK componitur ex tribus 1. LI, LM; 2. LM, LN. 3. LN,
LK. Prima autem ratio LI, LM est eadem (*de Conchoid. prop. 4.*) cum
ratione AL, GL, cùm HM sit curva similis BC ex qua genita est Con-
chois HI. Tertia ratio LN, LK est similiter eadem quæ GL, AL cùm
HN sit curva similis BD ex qua genita est Conchois HK. Duæ ergo ra-

tiones LI, MM; LN, LK æquales duabus AL, GL: GL, AL se mutuò elidunt. Ergo ratio LI, LK est æqualis secundæ rationi LM, LN. Et hoc perpetuò evenit quæcunque ducatur LK. Est autem eadem semper ratio LM, LN, ubicunque sumatur punctum L inter G, H. Ergo eadem quoque est ratio LI, LK ubicunque sumatur punctum L inter G, H. Igitur figuræ HLI, HK Homogeneæ sunt. Idem dicendum de figuris integris aut spatiis CHIX, CHKX. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXIV.

Cissoides genita ex Figuris Homogeneis sunt etiam Homogeneæ.

EX figuris Homogeneis ABC, ABD (fig. 19.) Polo A, Basi GX, generentur Cissoides HI, HK. Ostendendum est eas esse Homogeneas.

DEMONSTRATIO.

Eadem omnino est quæ propositionis præcedentis, nam super basi XG producta versus G sint figuræ GHO, GHP similes & æquales sed subcontrariè positæ figuris ABC, ABD: tum quæcunque ducatur NK parallela GX, occurrens Cissoidibus in I, K, rectæ GH in L & in M, N curvis HO, HP.

Ratio LI, LK componitur ex tribus, 1. LI; LM sive (*Cissoid. prop. II.*) AL, LG. 2. LM, LN. 3. LN, LK (sive LG, LA.) Prima autem & tertia se elidunt. Ergo ratio LI, LK æquatur rationi LM, LN quæ cum sit semper eadem ex natura figurarum Homogenearum GHO, GHP. Etiam eadem est ratio LI, LK quæcunque ducatur LK. Ac proinde Figuræ HLI, HK sunt Homogeneæ (*defin.*) idem dicendum de Figuris aut spatiis integris GHIX, GHKX. Quod erat demonstrandum.

DE CONCHOIDIBUS ET CISSOIDIBUS Ellipticis.

PROPOSITIO XXV.

Conchoides Ellipticæ Polum habentes in centro vel in extremo diametri, basin autem axi perpendicularem Homogeneæ sunt Conchoidi Nicomedæ & Semicirculari.

DEMONS-

DEMONSTRATIO.

Sit semiellipsis BCZ cuius centrum A (fig. 18.) & eodem axe BZ semicirculus BDZ. Hæc duæ figuræ sunt Homogeneæ.

Ducantur enim quæcunquæ ordinatæ ACD, RST: Sunt tam quadrata AC, RS, quam AD, RT, ut Rectangula BAZ, BRZ. Ergo AC, RS:: AD, RT.

Si ergo Polo A, basi GX ad AB perpendiculari, ex quadrantibus semiellipſis & circuli ABC, ABD generentur Conchoides HI, HK. Illæ erunt Homogeneæ (prop. 23. præced.)

Et si Polo Z basi GX generari intelligentur aliae duæ Conchoides ex semiellipſe BCZ & semicirculo BDZ, erunt illæ etiam Homogeneæ. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Hinc (prop. 24.) eodem modo habetur quadratura Conchoidis Ellipticæ HI, & Rotundum tam circa basin quam circa axem, & centrum gravitatis & Tangens, quo modo hæc haberi in Conchoide Nicomedea ostensum est, ubi de illa egimus in Exercit. de Conchoidibus.

Similiter hæc omnia habebuntur in Conchoide semielliptica, quomo-
do haberi demonstravimus in semicirculari ubi de illa egimus.

PROPOSITIO XXVI.

Cissoides Ellipticæ Polum habentes in centro vel extremo axis, basin vero axi perpendiculari, Homogeneæ sunt Cissoidibus ex semicirculo genitis, eodem Polo, eademque basi.

DEMONSTRATIO.

Sint (fig. 19.) semiellipsis BCZ, & semicirculus BDZ, habentes eumdem axem BZ, & idem centrum A. Polo A basi GX ex quadrante ellipsis ABC & circuli ABD generentur Cissoides HI, HK.

Cùm quadrantes ellipsis & circuli Homogenei sint ut diximus, etiam Cissoides Homogeneæ sunt.

Idem dicendum de Cissoidibus quæ generarentur ex semiellipſi BCZ & semicirculo BDZ, Polo Z basi GX.

Corollarium. Quæ igitur in Dioclea haberi ostensum est circa Quadraturam, Rotunda, Centrum gravitatis & Tangentes ubi de Cis-
soidibus actum est, eodem modo habebuntur circa Cissoidem Ellipti-
cam Dioclez Homogeneam.

Quod attinet ad Cissoidem quæ generari potest ex quadrante circuli ABD, Polo in centro A constituto, de illa quidem non egimus speciali-
ter, sed cum cognata sit Conchoidi Nicomedæ eodem Polo eadēinque
basi genitz, ex iis quæ de Conchoidum & Cissoidum analogia in uni-

versum dicta sunt, facilè colligi potest quæ habentur circa Quadraturam, Rotunda, &c. in Conchoide Nicomedea, haberi etiam in hac Cissoide ipsi cognata. Hæc igitur etiam habebuntur in alia Cissoide Elliptica ipsi Homogenea, genitæ nimirum ex semiquadrante Ellipseos ABC. Polo A, basi GX.

PROPOSITIO XXVII.

De Conchoidibus & Cissoidibus Hyperbolicis Homogeneis.

Sint (fig. 20) duæ Hyperbolæ BD, BE habentes eundem axem transversum AB. verticem B, tangentem BX.

Dico Conchoides & Cissoides genitas ex his Hyperbolis Polo eodem ut A, basique eadem ut BX esse Homogeneas.

DEMONSTRATIO.

Hoc constat ex prop. 23. & 24. præc. si Hyperbolæ BD, BE, Homogeneæ sint. Has autem esse Homogeneas facilè ostendetur.

Ducantur enim quæcunque ordinæ CDE, FGH occurrentes Hyperbolis in D, E, G, H.

Tam quadrata CD, FG, quam quadrata CE, FH sunt inter se ut Rectangula ACB, AFB, ex proprietate Hyperbolæ, ergo quadrata CD, FG, & CE, FH sunt proportionalia, quare CD, FG :: CE, FH. Et permutando CD, CE :: FG, FH. Segmenta igitur BCD, BCE Homogenea sunt. Quod erat demonstrandum.

Corollarium. Supponatur BE esse Hyperbolam circularem sive cuius axes æquales sunt. Ostensum est in Exerc. de Conchoid. parte 4. Quomodo in Conchoide genita ex illa Hyperbola Polo A, basi BX, habentur Dimensio, Rotunda, Centrum gravitatis &c. Eadem igitur eodem modo habebuntur in Conchoidibus aliis omnibus genitis ex quacunque Hyperbola BD eundem axem BC habente.

DE CONCHOIDUM CONCHOIDIBUS & Cissoidum Cissoidibus.

PROPOSITIO XXVIII.

Conchoides Conchoidum eodem Polo eademque basi generata quo prima Conchois, sunt Conchoides ipsius figuræ genitricis primæ Conchoidis.

DEMONSTRATIO.

Sit (fig. 21.) figura ABC, ex qua Polo A, basi DX generetur Conchois GH; Polo autem eodem A, basique eadem DX, ex Conchoide GH generetur alia Conchois IK. Ostendendum est IK esse Conchoidem genitam ex figura ABC genitrice primæ Conchoidis GH. Sumatur DL æqualis AD. Et ducatur LQ parallela DX. Ducatur item quæcunque AK occurrentis in N, O, P, Q, lineis BC, DX, GH, LQ.

Quoniam AD, DL sunt æquales (*hyp.*) etiam AO, OQ æquales sunt. Sunt autem & AP, OK æquales, eo quod IK sit Conchois genita ex GH, Polo A, basi DX. Ergo subtractis AO, OQ æqualibus ex AP, OK item æqualibus, remanent æquales OP, QK. Est autem OP æqualis AN eo quod GH sit (*hyp.*) Conchois genita ex BC, Polo A, basi DX. Ergo QK æquatur etiam ipsi AN. Quare cum hoc semper eveniat quæcunque ducatur AK, manifestum est IK esse Conchoidem genitam ex BC, Polo A, basi LQ. Quod erat ostendendum.

Similiter si ex secunda Conchoide IK generaretur tertia RS, Polo eodem A, eadèmque basi DX, ostendetur RS esse Conchoidem genitam ex figura genitrice ABC.

Sumptâ enim LT æquali ipsis AD, DL, & ductâ TV parallelâ DX quæ occurrat rectæ AKS in V. Quoniam AL, DT æquantur, etiam æquantur AQ, OV. Sed AK, OS etiam æquantur (cum RS sit Conchois ex IK, basi DX, Polo A) ergo subtractis AQ, OV ex AK, OS, remanet VS æqualis QK siue ut ante probatum est ipsi AN. Quare RS est Conchois ex BC, Polo A, basi TV.

Similiter si ex tertia Conchoide generetur quarta & ex quarta quinta & sic in infinitum, ostendetur omnes has Conchoidum Conchoides in infinitum esse Conchoides genitas ex figura genitrice primæ Conchoidis. Quod erat demonstrandum.

PROPOSITIO XXIX.

Ciffois Ciffoidis est ipsamet linea genitrix prime Ciffoidis.

DEMONSTRATIO.

Sit (fig. 22.) Ciffois DE genita ex linea BC, Polo A, basi FG. Ostendendum est ipsam BC esse Ciffoidem suæ Ciffoidis DE, genitam Polo A, basi FG.



Ducatur quæcunque AK occurrens DE, BC, in H, I, & basi FG in K. Quoniam DE Ciffois est ipsius BC basi FG, AI æquatur KH, ergo additâ vel sublatâ HI, AH æquatur KI. Ergo BC est Ciffois ex DE. Polo A, basi FG. Quod erat demonstrandum.









FINIS.

PROPOSITIONS

[DEMO](#) [STRATEGY](#)



*De Natura
Variarum
Conchoidum
et Cissoidum*



*De Natura
Variarum
Conchoidum
et Cis soidum*




fig. 2.

fig. 1.

A C G H

D G F B

E H H

K L I

N B F

M

G

H

I

J

K

L

M

N

O

B

A

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Pag. 148.

LIBR. DE LA
TOULOUSE
UNIVERSITATIS




fig. 3.

K B E D

F H A I

M

G

O

F G O

I K L M

D C E

B fig. 6.

A H

M

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

D G H E

C I N M

F C B A

O B A

F G H E

I K L F

M B C A

G A E

H I F

L G A

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

M B C

E F H

I K L

GRAN
adversus
et illa
de
dico
dico
evo



