



D. TURNER  
—  
MUSCOLOGI  
HIBERNICA  
SPICILEGIU

1804

Nº 121635

Don de M<sup>me</sup> Dazer

21 avril 1884

*Donné par Lautens*  
*Res sec 121635*

MUSCOLOGIÆ HIBERNICÆ

**SPICILEGIUM.**

AUCTORE

**DAWSON TURNER, A. M.**

SOC. REG. ANT. ET. LINN. LOND. IMP. AC. NAT. CUR.

PHYS. GOETT. NECNON LIT. NOV.

CAST. SOCIO.

---

YERMUTHÆ:

TYPOGRAPHIA J. BLACK. SUMPTIBUS AUCTORIS.



LONDINI:

FROST. VENAL. APUD. J. WHITE, IN VICO FLEET-STREET.

1804.

*Aug*



*Bot. D. D. D.*

ROBERTO SCOTT, M. D.

IN ACADEMIA EBLANENSI,

BOTANICES PROFESSORI,


CUJUS CONSILIO INCEPTUM,

OPERA DITATUM EST,

HOC OPUSCULUM

D. D. D.

AUCTOR:



## PRÆFATIO.

EX iis, quæ in Systemate Linnæano, classis Cryptogamia complectitur vegetabilibus, vix ulla æquo ac Muscos studio, nulla tam auspicatò Botanici sunt prosecuti. Plurimi quidem et oculatissimi Historiæ Naturalis cultores de his plantulis disseruerunt, quos omnes enumereare, aut eorum detecta recensere nec propositum nostrum, nec operis ratio sinit: paucis tamen ut lectorem moneam est necesse.

Quod de Muscis ante Dillenii tempora compertum fuit, parvum et tenebrosum: ille primus caliginem tam densè infusam discussit; species plurimas collegit; descriptiones iconasque accuratas edidit; omnes in sex genera distribuit; et, licet nec veram methodum nec organa sexualia ritè detexerit, opus tamen reliquit, quod ingenii perspicacis et exquisiti monumentum semper, dum Botanice coletur, manebit.—Eodem tempore, vel parvo tantum intervallo, Linnæus Muscorum sex genera in novem dispertivit, sed, stirpibus, quæ phænogamæ dicuntur, intentus, nihil ferè novi de hisce addi-

dit; eam tamen lucem Regno Vegetabili profudit, quæ omnium animos ad thesauros ejus investigandos accenderet.—Plures mox celeberrimi viri optimè de Muscologia sunt meriti; præcipuè Hallerus, Neckerus, Schmidelius, Hudsonusque, quos omnes, et vel illustrissimum Schreberum, opusculo de Phascis Florâque Lipsiensi inter primos annumerandum, ægrè transeo, ut ad Hedwigium festinem. “Hic omnium primus,” ut Swartzii verbis utar, “levavit velum, quod subducere plures conati sunt, sustulit nullus.” Hic Muscorum partes minutissimas mente acerrimâ et accuratissimâ, labore improbo, et oculis bene armatis investigando, genitalia eorum detexit, et quâm mirè plantis phænogramis omnimodè convenienter primus monstravit. Detecta mox in operibus exquisitis edidit, iconibusque perpulchris, et ad unguem accuratis illustravit.—Novum hinc Systeama, nova Muscorum genera, nova nomina, quæ, diu inter Germanos aliasque gentes cognita et recepta, hic serius æquo sunt patefacta, nec, nisi a paucis, vel nunc adhibentur.

Hæc igitur opusculi hujus scribendi prima est causa, ut quod, post Linnæi tempora, exteri Botanici de Muscis docuerunt nostratibus quoque innotescat, et ut, de iisdem plantis disserentes, iisdem quoque nominibus, quantum id fieri potest, utamur; nec in magistri nostri immortalis verba tam cœcè juremus, ut, nisi quod ipse dixerit, nihil rectè dictum credamus.

Illud etiam me multùm impulit, ut Insulæ, in quâ, tantillùm modò moratus, benevolentia amicitiaque plurimum sum expertus, Insulæ Imperio Britannico super connexæ per arctissima conjunctionis vincula, (“quod sit, o! felix, quod et usque felix!”) thesauri vegetabiles per me magis innotescerent.—Est enim Hibernia nostra terra quâ nulla magis Muscorum ferax: excelsi montes, præruptæ rupes, profundi saltus, immensesque, quibus abundat, paludes, humilibus hisce Regni Vegetabilis civibus sedes dilectas præbent; mira quoque soli diversitas, aerque, ut in montosis, sæpius humidus. Hinc quæ rarissimè in Angliâ, vel etiam in Cambriâ, capsulas *Hypna* proferunt, ibi fructifera abundantè reperi; magisque quâm in regionibus nostris luxuriare species ferè singulæ mihi visæ sunt. Hic quoque libellus, qui Muscorum Hibernicorum non historia, non vel catalogus, tantummodò Spicilegium, idque valde imperfectum, extat, plures quâm totius Sueciæ, a tot tantisque Botanicis iterum atque iterum lustratæ, species continent; quod mireris, cùm omnes, quas comprehendit, unam alteramque si demas, a tribus modò Botanicis, oculatissimis quidem illis et fortunatis, sed quibus exiguum tantum insulæ partem investigare licuit, sint detectæ. Quâ de re, si in totam regionem attentè inquiratur, nullus dubito quin numerus duplicetur, et ex iis, quas in Scotiæ alpinis oculi Dicksoniani detexerunt, plurimæ Hibernicis quoque annumerentur.

Tertia opusculi hujus scribendi accessit causa, quod

omnia ferè de Muscis hactenus scripta in se sunt imperfecta, et vel in libris alias quoque Regini Vegetabilis partes complectentibus, vel in Societatum Literatarum actis, vel in operibus maximè sumptuosis, nec, absque molestiâ, in Britanniâ comparandis includuntur; unde fit ut Muscorum Enchiridion, nec pretii, nec voluminis, neque speciebus distinguendis impar, imprimis desideratur, idque hoc opusculum suppeditaturum spero, quoniam eadem propemodùm species per totam Europam sint vulgatissimæ, eaque ergò soleæ, quæ minimè sunt frequentes, et tyroni raro obveniunt, hic frustà quærentur.

Quod ad propositi nostri rationem attinet, clar. Swartzii vestigiis instare principio mihi statueram; sed jure timui, ne, dum brevis esse laborabam, obscurus fierem; meque ergò utilitati magis inservitulum credidi, si non modo de speciebus vel novis, vel dubiis hactenus vexatis, fusiis tractarem, sed et de jam-dudum satis cognitis pluribus verbis dissererem. Expertus enim scio plantas tam exiguae, quæ, licet copiosissimè describantur, Botanices maximè peritum sæpe fallunt, neutquam per duodecim verba tyroni liquere posse. Uniuscujusque partis descriptione absolutâ potius indigent; quod cum brevitati, quam mihi præceperam, obstaret, iter quasi medium tenere sum conatus. Illud ergo imprimis petii, ut notas, quibus singulæ species luculentissimè dignoscantur, quam brevissimè exponerem. *Hypna* tamen tractans tantas difficultates, et tot tantosque errores auctorum

celeberrimorum vel inveni, vel invenire credidi, ut unamquamque speciem fusè describere necesse duxi, majorisque culpæ opprobria fugiens, malui prolixitate quam obscuritate argui.—Specierum novarum seu minus cognitarum iconas adjeci; illis, quæ, ab aliis prætermisso vel neglectæ, in hoc opere primùm describuntur, crucis signo (†), illis, quæ, ab exteris memoratae, jam primum inter Britannicas recensentur, asterisco (\*) præposito.—Erroribus meis, (et de vegetabilibus adeo exiguis disserens quis tam audax, ut se errore vacuum sperare ausit?) Botanicos peritiores ut ignoscant, et simul quod rectius norint candidi impertiant obnoxè rogo. Mendosum esse hoc opusculum nemo me ipso melius novit; doleoque quod absolutius præstare nequii: quod potui feci; et, si, inter ea quæ continet, "sint bona, sint quædam mediocria, sint mala plura," non tamen idcirco me instituti mei pœnitentebit, cùm nihilominus non prorsùs inutile fore et spero et arbitror.—A quorundam, quos rei Botanicae peritisimos existimo, sententiis discessi, nunquam tamen non coactus; hosque omnes iterum atque iterum rogo, ut erudiant, me nunquam, vel eorum existimationi obtrectandi, vel inanem gloriam aucupandi gratiâ, id fecisse. Veritatem unam omnes colimus, scientiam nostram amabilem promovere omnes studemus, nec, quia dissidentius, alterum e nobis errâsse pro certo constat; fieri enim interdum potest, ut eandem plantam descripserimus, sed, sicut lacertam in fabulâ, vel solo diverso, vel ætate aliquantum mutatam viderit alteruter. Hoc quidem unum jactare mihi licet, me aut nihil omnino

quod non ipse observaverim admississe, aut, si quando ab hâc normâ aberraverim, auctoris, vel amici, cui observationes debo, nomen fidè protulisse, ut quantum in hoc opere ipse mihi vindico aliis etiam innotescat, descriptionesque meæ id saltem pretii habeant, quod iis, quæ ad ipsas plantas conficiuntur, nec e variorum et inter se non raro dissidentium auctorum scriptis excerpuntur, debetur.—Synonyma, ut brevitatem mihi propositam, quantum potui, servarem, parcissimè protuli; auctoresque nullos, præter Dillenium, Linnæum, Hedwigium, Bridelium, Hudsonum, Dicksonum, Smithiumque citavi, ibi modò deflectens, ubi ad veritatem aliquam stabilendam, vel errorem detegendum necesse visum est.—Omnes, quos hoc Spicilegium complectitur Muscos, aut in Hiberniâ ipse vidi, aut inde accepi: *Encalyptâ vulgari* unâ demptâ, quæ per totam Europam adeo frequens occurrit, ut dubitare nequeo quin in Hiberniâ copiosè nascatur; et quæ tam sui generis est planta, ut opus sine illâ plus æquo mancum evassisset.

Viris amicissimis, Roberto Scott, M. D. Botanices, Eblanæ, Professori, W. Stokes, M. D. Sacro-Sanctæ Trinitatis Collegii Socio, Historiæ Naturalis cultori indefesso, et Johanni Templeton, Arm. qui, Hiberniæ septentrionalis incola, regionem illam montosam et naturæ opibus abundantem labore improbo indagavit, et a quo Flora Hibernica mox est expectanda, summas et habeo et ago gratias. Illorum est quod hoc opusculum in lucem prodiit, illorumque benevolentia thesauros

ferè omnes, quibus ornatur, contulit. Nec quod viris literarum suavi commercio mecum coniunctis, Swartzio, Schraderio, Smithio, Dicksono, Schwaegrichenio, Mohrioque debo, silentio est prætermittendum: hi enim stirpes, quas vel ipsi descriperunt, vel in longinquis regionibus detexerunt, communicando, ad synonyma certè citanda plurimum contulerunt, operisque utilitatì, dummodo sit utile, multum inservierunt. Ipse quoque cl. R. A. Hedwigius, immortalis Hedwigii filius, herbariolum nostrum exemplaribus e patris sui beati herbario augere non est deditus: unde si auctores magis quam usitatum est audacter protulerim, non id meo acumine, sed amicorum munificentia confisus feci.

Quoad Muscorum genera nullius in verba omnino-  
juravi; Hedwigii tamen methodum, paucis mutatis, se-  
cutus sum. Hanc methodum e capsulâ pendere, quæ  
vel clausa, vel aperta, et, si aperiatur, os habet vel nu-  
dum, vel simplice vel duplice dentium ordine, qui Pe-  
ristomium dicitur, instructum, res est satis cognita.  
Nec tamen cum celebrissimo illo auctore florum mascu-  
lorum situm aut peristomii interni discrimina subtilissi-  
ma generum characteres vel commodos vel naturæ con-  
venientes suppeditare arbitror. Flores masculi semper  
ferè minutissimi, nec nisi oculo bene armato detegen-  
di, raroque eodem tempore, quo peristomium maturès-  
cit, conspiciendi, Tyroni botanico scrupulos quotidiè  
injiciunt; sic *Barbulas* a *Tortulis*, *Weissias* a *Grim-  
misi*, ut alia taceam, neutiquam disjungendas existimo.  
Nec minus, si peristomii interni mutationibus minutis

nitamur, invitâ naturâ agemus. *Leskeæ* enim ab *Hypnis*, *Meesia*, *Timmia*, *Pohlia*, et *Mnia* a *Bryis* ægrè admodum divelluntur. De his autem alio posthac loco erit disserendum.

Opere hoc typis jam mandato, unam alteramque speciem vel omnino novam, vel hic certè prætermissam misit D. Templeton, aliarumque quarundam nomina communicavit D. Scott, quas omnes ut Muscologiae Hibernicae à numerem occasionem mox suppeditandam confidit. *Bryii* quoque sui *fasciculati* exemplar a Dicksono accipi, et a *Grimmiâ verticillata* differre factus sum certior.

Illud jam tantummodo dicendum superest, me ad *Hypna* investiganda operculi formam, foliorum caulinorum nervum, et perichaetialium figuram notas maximè stabiles præbere reperisse; meque in hoc opere scribendo, neutiquam amici suavissimi, Smithii, qui nunc jam Floræ suæ Britannicae Muscologiae incumbit, æmulatione moveri. Id certè doleo, quòd ambo de iisdem plantis eodem tempore disserendo occupati, non, quod vellemus uterque, auxilium mutuo conferre potuimus. Quantum id fieri potuit factum est; quâ de re spero sententias nostras in paucis modò esse discrepaturas; dulcissimum enim fructum profert Historiae Naturalis cultura, dum virorum iisdem studiis ejusdemque veritatis indagationi conjunctorum commercium, benevolentiam, amicitiam comparat.

Dabam YERMUTHÆ, Pridie Idus Martii, MDCCCVI.

## TABULA

# GENERUM

## MUSCORUM FRONDOSORUM

### HIBERNIAE.

- 
- I. *Capsulæ ore nullo.*
    - 1.— ..... PHASCUM. L.
  - II. *Capsulæ ore nudo.*
    - 2.— Calyprâ circumscissâ, capsulam infernè cingente ..... SPHAGNUM. L.
    - 3.— Calyprâ integrâ secedente; floribus terminalibus .... GYMNOSTOMUM. H.
    - 4.— Calyprâ integrâ secedente; floribus axillaribus ..... ANICTANGIUM. H.
  - III. *Capsule ore aucto Peristomio.*
    - A. *Peristomio simplice; dentibus indivisis.*
      - 5.— Quatuor, liberis ..... TETRAPHIS. H.
      - 6.— Quatuor, apice cohærentibus. . ANDRÆA. H.
      - 7.— Octo, geminatis. .... SPLACHNUM. L.
      - 8.— Sedecim, linearibus; floribus terminalibus. .... ENCALYPTA. SCHREB.  
(LEERSIA. H.)
      - 9.— Sedecim latiusculis; floribus terminalibus ..... GRIMMIA. H.  
(WEISSIA. H.)

- 10.—Sedecim, vel tringinta-duobus ;  
floribus axillaribus . . . . PTEROGONIUM. SW.  
(PTERIGYNANDRUM. H.)
- B. *Peristomio simplex ; dentibus bifidis.*
- 11.—Triginta-duobus, ad basin divisis,  
vel simplicibus, erectis, longis,  
capillaribus . . . . TRICHOSTOMUM. H.  
(DIDYMODON. H.)  
(CYNONTODIUM. H.)
- 12.—Plurimis, ad basin divisis, capili-  
laribus, spiraliter convolutis . . . . TORTULA. H.  
(BARBULA. H.)
- 13.—Sedecim, latiusculis, inflexis, le-  
vitè bifidis . . . . DICRANUM. H.  
(FISSIDENS. H.)
- C. *Peristomio simplex ; dentium apicibus  
membranâ connexis.*
- 14.— . . . . POLYTRICHUM. L.
- D. *Peristomio duplice : exteriore dentibus sede-  
cim ; interiore ciliis totidem.*
- 15.—Exterioribus latis geminatis ;  
interioribus capillaceis, vel nul-  
lis . . . . ORTHOTRICHUM. H.
- 16.—Exterioribus latiusculis, distinc-  
tis, cum interioribus capillaceis  
alternantibus . . . . NECKERA. H.

- D. *Peristomio duplice : exteriore dentibus sede-  
cim ; interiore membranâ.*
- 17.—Exterioribus brevibus, trunca-  
tis ; interiore membranâ pli-  
catâ . . . . BUXBAUMIA. L.
- 18.—Exterioribus obliquis, apice  
cohærentibus ; interiore mem-  
branâ planâ, sedecim-partitâ . . . . FUNARIA. H.
- 19.—Exterioribus latiusculis ; inte-  
riore membranâ laciniatâ : capsu-  
lâ sphæricâ ; floribus terminali-  
bus . . . . BARTRAMIA. H.
- 20.—Exterioribus latiusculis ; inte-  
riore membranâ laciniatâ : capsu-  
lâ ovato-oblongâ ; floribus ter-  
minalibus . . . . BRYUM. L.  
(MNIUM. L.)  
(WEBERA. H.)  
(POHLIA. H.)  
(MEESIA. H.)
- 21.—Exterioribus latiusculis ; inte-  
riore membranâ laciniatâ : cap-  
sulâ oblongâ : floribus axillari-  
bus . . . . HYPNUM. L.  
(LESKEA. H.)
- 22.—Exterioribus latiusculis ; inte-  
riore membranâ conicâ, reticu-  
latâ . . . . FONTINALIS. L.

MUSCI FRONDOSI  
HIBERNIAE.

1. PHASCUM. SCHREB. Gen. pl. n.  
1636. HEDW. fund. II. p. 85.

*Capsula* ovata, undique clausa; vel cum ru-  
dimento operculi, nunquam dehiscente.

\* *Capsulā* subsessili.

1. *P. subulatum*, caulescens; foliis lanceolato-subulatis  
erecto-patulis, St. cr. I. t. 35. DILL. t. 32. f. 10.

Habitat in arenosis,

Planta circiter bilinearis; caulis simplex, rarius  
bifurcus; folia lutescentia, setacea, basi dilatata,  
amplexicaulia, rigidiuscula, nec exsiccatione crispata,  
enervia; capsula foliis obtecta.

2. *P. axillare*, caulescens; foliis linear-lanceolatis pa-  
tentibus; pedicellis lateralibus recurvis. DICKS. t. 1.  
f. 3. St. cr. I. t. 34. E. B. XV. t. 1036.

*P. nitidum*. Hedw. — in glareosis.

Colore, formā, et magnitudine cum præcedente  
convenit, sed folia remotiuscula, magis patula,  
neutiquam, nisi exsiccatione, subulata, sub lente

pulcherrimè reticulata, carinata, ad basin obsoletè uninervia; pedicellus principio terminalis, mox axillaris, recurvus; capsula elliptica.

3. *P. crispum*, caulescens; foliis lanceolatis acuminatis carinatis siccitate tortilibus. St. cr. I. t. 9.  
— in humidis.

Caules vix lineares, apice plerumque multifidi; folia saturatè viridia, caulina alterna, dissita, brevia, summa constipata, sesqui-linearia, basi dilatata, lanceolata, longè acuminata, complicato-carinata, madore rectiuscula, siccitate mirè contorta, nervo ferè concolore. *P. crispum* E. B. IX. t. 618. (*P. sphærocarpum* Fl. Bedf.) quod specie ab hoc differre credit cel. Smithius, varietatem esse foliis aliquantùm brevioribus potius censerem.

4. *P. patens*, sub-acaule; foliis ovato-lanceolatis apicem versus serratis horizontaliter patentibus. St. cr. I. t. 10.  
— in argillosis humidis.

Statura vix sesqui-linearis; folia pulchrè reticulata, uninervia, planiuscula, semper patula; hinc capsulae subglobosæ, fuscæ, magis quam in reliquis conspicuæ; margines foliorum haud rarò integri. Ab hoc *P. recurvifolium* Dicks. t. 10. f. 2, quoad iconem, vix distinctum videtur, exemplaria autem, ab ipso missa, ob folia multò angustiora, carinata, reflexa, specie differre crederem.

5. *P. cuspidatum*, sub-acaule; foliis ovatis cuspidatis patulis siccitate conniventibus. DILL. t. 32. f. 11.  
*P. acaulon*. L. — in sepibus.

A *P. patente* et Schreberiano cautè distinguendum: ab hoc staturâ minore, vix plus quam linearis, caule ut plurimùm simplice, et colore saturatiore; ab illo foliis integerrimis exsiccatione conniventibus discrepat. — Foliorum apices, semper acutissimi, non rarò aristati, fierine ergo potest ut in *P. piliferum* transeat?

6. *P. curvisetum*, sub-acaule; foliis ovato-lanceolatis aristatis patulis: pedicellis abbreviatis recurvis. DICKS. t. 10. f. 4.  
— in arenosis.

Hanc speciem a præcedente, cui perquam affinis, primus disjunxit oculatissimus Dicksonus; statura aliquantùm minor, folia magis patula, capsulae maturæ subglobosæ, non, ut in *P. cuspidato*, foliis tectæ, sed propter pedicellorum curvaturam extra folia positæ et conspicuæ.

7. *P. muticum*, acaule; foliis ovatis muticis concavis conniventibus. DILL. t. 32. f. 12. SCHREB. Phasc. t. 1. f. 11---14.

*P. acaulon* B. L. — in sepibus.

Folia perpaucæ, in bulbilli formam congesta, semper connivent, capsulamque omnino claudunt: planta præcedentibus cunctis duplò minor, gre-

garia. A penultimo primus et jure separavit cl.  
Schreberus.

*P. serratum*, acaule; surculis filamentaceis ramosis;  
foliis perichaetialibus erectis lanceolatis serratis  
enervibus. Dicks. t. 1. f. 1. E. B. VII. t. 460.  
SCHREB. Phasc. t. 2.

*P. confervoides*. BRID.

— in pratis et arvis.

*P. stoloniferum*, stolonibus reptantibus.

*P. stoloniferum*. Dicks. t. 7. f. 2.

Filamentis tenuissimis, lutescentibus, dense implexis, terræ instratis, *Confervam frigidam* primo aspectu refert, et vix, nisi capsulis minutis, rufofuscis, dignosci potest: surculi, succis, quibus replentur, arescentibus, speciem articulatam præbent, nec tamen naturâ sunt geniculati. Ex hâc unâ duas species construxerunt Hoffmannus et Bridelius—malè.—*P. serratum* et *stoloniferum*, consentiente amiciss. Dicksono, conjunxi: statura in hoc paullò major.

\*\* *Pedicello foliis longiore:*

*P. rectum*, acaule; foliis ovatis patulis; pedicellis erectis; capsulâ ovatâ apiculatâ. WITH. t. 18. f. 1.  
E. B. V. t. 330.

*P. curvicollum*. E. B.

— in fossis arenosis.

*Pedicellus folia exsuperans* hanc a precedentibus

distinguit: planta tota vix bilinearis. A *P. curvicollo*, cui proximum, foliis muticis, pedicello erecto, et capsulis ovatis; a *bryoide*, foliis muticis nunquam conniventibus, staturâque plus dimidio minore differt.

2. SPHAGNUM.\* SCHREB. Gen. Pl. n.

1637. HEDW. fund. II. p. 85. I. t. 1.

*Capsula* ore nudo, basi strumifera. *Calyptra* circumscissa, capsulam infernè cingens.

1. *S. latifolium*, foliis ovatis concavis arctè imbricatis obtusis. Dill. t. 32. f. 1.

— in paludibus.

*S. cymbifolium*. Brid. Swartz.

*S. Palustre*. L.

*P. fluitans*, caule protenso tenerrimo; foliis sparsis remotis.

\* *SPHAGNIS* omnibus substantia flexilis, mollis, color hyalino-vires-  
cens, siccitate albus, rubore interdum perfusus; rami breves, deflexi;  
folia enervia; pedicelli abbreviati; capsule recentes globosæ, siccatae  
insigniter urceolatæ, spadiceæ: genus natura distinctissimum, sed  
vix, nisi capsula strumifera, calyptaque capsulam inferne cingente,  
a *GYMNOSTOMIS* in Systemate distinguendum.

Caules subspithamæi, simpliciusculi, ramis teretiusculis, vix unguicularibus, turgidis, deflexis dense obſiti; rami ſummi in corymbum conſerti; folia ventricosa, ſub lente pulchrè reticulata, cordato-ovata, appreſſa. Huic valdè affine *S. squarroſum*, nova species, nuper in Hercyniā deſtecta, quæ foliis ſquarroſis acutiusculis diognoscitur.—♀ bipedalis et ultra, facie a *S. latifolio* quam diuerſiſſimā, colore pallidè, ſed amœnè viridi, ſub-hyalino.

2. *S. capillifolium*, foliis lanceolatis concavis arctè imbricatis acuminatis. *Dill.* t. 32. f. 2. A.  
*S. palustre* β. L.  
*S. capillaccum*. *Swartz.*  
     — in paludibus.

Formā et habitu cum præcedente convenit, ſed rami plus duplo graciliores, longè acuminati, et folia affatim diſtinguunt.

3. *S. cuspidatum*, foliis lanceolatis concavis remotiusculis patentibus. *Dill.* t. 32. f. 2. B.  
     — in aquosis.

In aquâ fluitat, caule pedali ad bipedalem: rami pulchriè plumosi, nec, ut in præcedentibus, teretes: fructum fert rarissimè. Cum *S. capillifolio* a Dillenio, Bridelio aliisque commixtum, et forsitan mera varietas, a loco natali pendens: at, cum habitu multum diſcrepet, in Hoffmanni, Rothiique ſententiā transire tutiſſimum duxi.

3. **GYMNOSTOMUM. SCHREB. Gen.**  
*Pl. n. 1638. HEDW. fund. II. p. 87.*  
*t. 7. f. 31.*

*Caps.* ovata, ore nudo. *Calyptra* integra e basi ſecedens. *Flores* terminales.

1. *G. truncatulum*, sub-acaule; foliis ovato-lanceolatis planis patentibus apiculatis conſertiſ; capsula turbinatâ. *T. 1. f. d—f. Dill.* t. 45. f. 7. A—E.  
     — in arvis et fossis.

*G. truncatum*. *Hedw.*

*Bryum truncatulum*. *L.*

Planta vix bilinearis; color saturatè viridis; folia ſiccitate ſubtortilia, nunquam conniventia, nervo valido cuspidata, ſed nequaquam pilifera.

2. † *G. intermedium*, sub-acaule; foliis ovato-lanceolatis planis patentibus apiculatis ſparsis; capsula oblongâ truncatâ. *T. 1. f. a—c. DILL. t. 45. f. 7. F—K.*  
     — in fossis.

Caules cæſpitosi, ſimplices, bi-trilineares; folia quinque vel ſex, laetè virentia, ſubdiaphana, ſublente reticulata, infima remota, ſumma rosæ instar expansa, plana, ovata, margine integerrima, nervo

valido, fusco cuspidata; pedicelli terminales, solitarii, rariū bini, fusco-virides, semi-unguiculares; capsulae oblongae, maturae fuscae, ore vix dilatatae, truncatae; operculum convexum, in rostrum obliquum, acutum, capsulae ferè longitudine, assurgens; calyptora tenerima, pallide viridis, lateraliter fissilis.

*G. intermedium* et *truncatulum*, ut inter quæ mira similitudo interest, primus disjunxit noluerim, nisi abundantè utrumque prope *Yarmouth* reperiatur, multosque annos observanti distincta videantur. Auctoritate etiam cl. Dicksoni freat sum; sed nec vel hâc de causâ de vegetabilibus adeo minutis sententiam non revocandam proferre ausim; quare, ut Botanici peritiiores ad rem accuratius investigandam, suaque inde judicia facienda ducerentur, utriusque iconem adjeci; et *G. obtusum*, plantam his simillimam, dubiusque tam vexatam ut *G. dubium* a Bridelio nominaretur, addidi. Staturâ altiore, foliis oblongo-lanceolatis, erectis, capsulis apice constrictis, operculoque recto dignoseitur hæc species. *G. truncatulum* et *intermedium* eandem non raro sepem habitant, hoc gregatim, in acervulos satis conspicuos conglomeratum, illud sparsum, saepius solitarium, nec nisi attentiùs intuenti observandum. Altitudo hujus multò major; folia magis sparsa, duplò pauciora, color lætior; operculum longius, sub-acuminatum; capsula, vel effœta, oblonga, et nequaquam turbinata. Cel. Hedwigius utramque præ se habuisse speciem in *St. cr.*

I. t. 5. videtur: crederem tamen, f. 12imā demptâ, omnes esse ad *G. intermedium* referendas. Nomen triviale, *intermedium*, quia locum ferè medium inter *G. truncatulum*, *obtusumque* tenet, huic speciei indidi.

3. *G. obtusum*, sub-acaule; foliis oblongo-lanceolatis concavis erectiusculis; capsula oblongo-ovatâ. T. 1. f. g-i. Dicks. t. 4. f. 7. Sp. Musc. t. 2. f. 1-3.

*G. dubium*. BRID.

*Bryum obtusum*. Dicks.

— in arenosis sterilibus.

Altitudo pollicaris; color e rufo nigrescit. A *G. Heimii*, quocum Bridelius conjungendum putat, foliorum colore et formâ toto cælo differt. Folia, quæ Dicksonus denticulata dixit, in exemplaribus nostris sunt integerrima.

4. *G. ovatum*, sub-acaule; foliis ovatis concavis piliferis conniventibus. St. cr. I. t. 6.

*Bryum ovatum*. Dicks.

— in muris argillaceis.

*G. truncatuli* ferè formâ, sed aliquantûm majus; folia, in pilum album desinentia, semper connivent; color pallidior; capsulae maturæ non turbinatæ.

5. *G. Heimii*, sub-acaule; foliis spatulatis acuminatis apicem versus denticulatis; capsula cylindracea;

operculo obliquè rostrato: St. cr. I. t. 30.

*Bryum Heimii.* Dicks.

— in humidis;

Folia pauca, erecta, pedicelli basin amplexentia, lutescentia, sub lente pulchrè reticulata; capsula semper cylindracea; operculum capsulae ferè longitudine; plantæ totius altitudo pollicaris.

6. *G. fasciculare*, sub-acaule; foliis ovato-lanceolatis acutis serratis patulis; capsula pyriformi; operculo piano. Dicks. t. 7. f. 5. E. B. XVIII. t. 1245. Sp. Musc. t. 4. f. 5—9?

*Bryum fasciculare.* Dicks.

— in saxis.

A *G. pyriformi* cautissimè distinguendum; differt staturâ duplò graciliore, caule infernè nudo, foliis omnibus ad pedicelli basin fasciculatis, operculo piano, obtusissimo. Capsulae quoque forma neutiquam eadem, sed hoc in *G. fasciculari* quodammodo incertum, plus minus enim ad basin attenuatur, ut nunc elongato, nunc rotundato-pyriformis evadat. Folia pallidè viridia, mirè vasculosa, sub lente obsoletè serrata, nervo obscuriore. Calyptra ventricosa, basi coarctata, capsulam juniores tegens, adultioris apici horizontaliter insidens.—Hedwigii figuram dubitantè citavi, cùm a plantâ Dicksonianâ abundant, suspicerque virum cel. tantummodo *G. pyriformis* varietatem præ oculis habuisse: talem quoque sub *G. fascicularis* nomine a Schradero accepi.

7. *G. pyriforme*. sub-acaule; foliis ovatis acutis apice serrulatis patentibus; capsula obovatâ; operculo umberato. E. B. VI. t. 413. Dill. t. 44. f. 6.  
*Bryum pyriforme.* L.

— in pratis.

Capsula præcedentibus duplò major; folia dilutè viridia, pellucida, sub lente reticulata, et minutè serrata, rosæ instar expansa. Operculum breve, con; vexo-conicum, sub-obliquum, obtusè apiculatum.

#### 4. ANICTANGIUM. HEDW. SP. MUSC.

p. 40. Fund. II. p. 86. Hedwigia.

*Caps.* ovata, ore nudo. *Calyptra integra* e  
basi secedens. *Fl.* axillares.

*A. ciliatum*, caule ramosissimo; foliis ovatis concavis imbricatis, apice cano denticulato; capsula subsessili. St. cr. I. t. 40. Dill. t. 32. f. 5. E. B. XVII. t. 1179.

*Gymnostomum ciliatum.* Swartz.

*Hedwigia ciliata.* St. cr.

*Bryum ciliatum.* Dicks.

— *apocarpum.* L.

— in saxis.

*Caules* sesquipollicares et ultra, abnormiter divisi; *folia* luteolo-viridia, siccitate appressa, madore erecto-patula, apice incano diaphano, concava, enervia; *capsulæ* rufo-fuscæ, campanulatæ, laterales, rarius terminales, brevissimè pedunculatæ, foliis perichaetialibus longè albo-acuminatis, sèpè laceris, obtectæ; *operculum* plano-convexum, umbone minuto, obtuso.—*Planta* hæc a *Gymnostomis* formâ habituque tantum recedit, ut fieri nequirit quin, Hedwigio præeunte, naturam sequerer, et *Anictangiis* adjungerem, flores licet fœminei, quos nunquam vidi, e ramorum apicibus interdum prodeant.

A *Grimmiâ apocarpâ*, quam præcipue refert, et quâcum conjunxerat Linnæus, colore, capsulâque ore nudâ dignoscitur. Foliorum pars incana magnitudine multùm ludit, et in inferioribus interdum ferè deest.—Exemplaria ab amiciss. Clemente ex Hispaniâ missa, foliis plus dimidio albis speciem pulcherrimam præbent.

5. **TETRAPHIS.** SCHREB. Gen. Pl. n.  
1639. HEDW. Fund. II. p. 87. t. 7.  
f. 32.

*Caps.* oblonga. *Perist.* simplex, dentibus quatuor pyramidalibus liberis.

*T. pellucida.* Sp. Musc. t. 7. f. 1. E. B. XV. t. 1020. Dill. t. 31. f. 2.

*Mnium pellucidum.* L.

— in umbrōsis uidis.

*Caulis* simplex; *folia* ovato-lanceolata, pellucida, lètè viridia, uninervia, laxè imbricata; *pedunculi* unguiculares; *capsula* erecta, matura sulcata; *operculum* conicum, acutum; *peristomii* dentes purpurascens, valdè conspicui.—*Generis* hujus pulcherrimi hæc una modò adhuc detecta est species, quæ *Bryum androgynum* tantum refert, ut, *capsulis* deficientibus, facilè prætermittatur; *foliis* latioribus, integrerrimis præcipue dignoscitur.

6. **ANDRÆA.** HEDW. Sp. Musc. p. 47.

*Caps.* exigua turbinata. *Perist.* dentibus quatuor concavis, apice connexis, operculigeris.

1. *A. alpina*, foliis ovatis obtusiusculis concavis undique imbricatis erecto-patulis. Sp. Musc. t. 7. f. 2. Dill. t. 73. f. 39.

*A. rupestris.* Sp. Musc.

*Jungermannia alpina.* L.

— in saxis.

Caules vix unguiculares, densè cæspitosi, sæpiùs divisi; folia infima obscurè purpurea, summa satratè viridia, laxè imbricata, latè ovata, enervia, siccitate appressa, madore erecto-patula, rarò surculorum ad apices subsecunda; pedicelli folia vix superant; capsula valdè exigua, pallescens; peristomii dentes satis magni, in sphæram conflati, atro-rubentes; operculum minutum album.—Hedwigii figura, supra allata, cum exemplaribus hujus speciei, non modò in Britanniâ lectis, sed et e Germaniâ acceptis, prorsùs convenit. *Andræam rupestrem* vir cel. ignorâsse videtur.

2. *A. rupestris.* foliis setaceis falcatis secundis. *Dill.* t. 73. f. 40.

*Jungermannia rupestris.* L.

— in saxis.

Crescendi modo, fructuque cum præcedente convenit, sed statur duplò minore, foliis e basi paullulùm explanatà setaceis, nigricantibus, omnibus falcatis, et secundis affatim distinguitur.—Inter muscos *frondosos* et *hepaticos* ambigunt quodammodo *Andræa*, genus natura a *Jungermanis* satis distinctum, sed Muscorum reliquorum etiam dissimile. Quod Hedwigius *capsulam*, Ehrhartus *apophysin* nominaverat.

7. **SPLACHNUM.\* SCHREB.** Gen. Pl.

- n. 1641. *HEDW.* Fund. II. p. 88.  
t. 7. f. 3.

*Caps.* cylindracea, apophysi umbraculiformi, seu sub-globosæ insidens. *Perist.* simplex, dentibus octo, geminatis.

1. *S. ovatum*, caule simplice brevissimo; foliis obcordatis apiculatis integerrimis; apophysi obovatæ. *Sp. Musc.* t. 8. f. 4—6.

— in alpibus.

Statura vix plus quam unguicularis; apophysis viridula, matura fuscescens, capsula latior: capsula fusca; operculum convexum; foliorum apex brevissimus.—*S. rugosum.* Dicks. huic perquam affine, vix specie revera differre videtur.

2. *S. sphaericum.* β. caule simplice: foliis ovatis patulis apice subserratis; pedunculo flexuoso debili; apophysi globosæ ferrugineæ. *Dicks.* t. 10. f. 5. *Dill.* t. 44. f. 4.

\* *SPLACHNA*, si formæ elegantia, texturæ subtilitas, colorumve splendor respiciatur, nullis omnino Muscis cedunt: species autem fere singulæ in diversis ætatis gradibus tantum immutantur, ut, ne in errorem inducatur, iterum atque iterum præmonendum est tylo; præsertim cum omnes rarius occurant, et hinc repetitæ indagationis non sæpe datur facultas.

*S. Sphaericum.* E. B. XI. t. 785.

*S. gracile.* Dicks.

— in ericetis montosis.

- Caulis bi-trilineares; folia pallidè viridia, subdiaphana, sub lente reticulata; pedicellus pollucaris, debilis, sæpe flexuosus, flavescens; operculum convexum.—*S. gracile* a *sphaerico*-specie differre contendit Dicksonus; pedicello tamen breviori dempto, discrimin planè ne minimum inventio, eademque esse nullus dubito, cùm folia in utroque obsoletè serrata viderim. Fierine potest ut *S. longicollum* Dicks. hujus sit varietas?—diffidentissimè quæro—Dillenii t. 44. f. 4. hucusque semper ad *S. ovatum* relata, fide proprietorum ipsius exemplarium, ad hanc speciem referri debet.
3. *S. ampullaceum*, caule simplici sculo; foliis lanceolatis acuminatis strictis serratis; apophysi pyriformi; capsula longâ. St. cr. II. t. 14. E. B. II. t. 144 Dill. t. 44. f. 3.

— in turfosis.

*E. minus*, pedicello vix unguiculari, staturâ graciliore.

*S. Turnerianum.* Dicks. t. 10. f. 11. E. B. XVI. t. 1116.

Species per pulchra. apophysi obconicâ, magnâ, dilutè purpureâ, capsula plus duplò crassiore, facillimè a reliquis dignoscenda. Caulis sæpe sub-pollicares, foliis tenerrimis, lœtè viridibus,

laxè vestiti; pedicelli sesquipollicares, rubentes; capsula longa, virens.—*S. Turnerianum*, optimè monente am. Swartzio, ad hanc speciem retuli, timeoque ne sit varietas ab ætate tantummodo pendens.

### 8. ENCALYPTA.\* SCHREB. Gen. pl.

n. 1643. HEDW. Fund. II. p. 88.  
LEERSIA.

*Caps.* cylindracea. *Perist.* simplex, dentibus sedecim linearibus, erectis, indivisis.  
*Calyptra magna*, campanulata, laxa.

1. *E. vulgaris*. caule simplice; foliis spatulato-lanceolatis; calyprâ conicâ integrâ. St. cr. I. t. 18.

\*ENCALYPTA à GRIMMIIS, quamvis ab omnibus auctoribus sejunctas, non nisi invite, et invita, ut opinor, natura, distraxi; nec enim vel PERTISTOMII DENTES ANGUSTOS LINEARES, vel CALYPTRAM LAXAM CAMPANULATAM ad genus stabiendum satis duco; quoniam hanc cum GRIMMIA CRIEROSA et DAVIESII, quorum dentes insigniter lati, communem habent; et, si dentium latitudo sola respiciatur, præter E. LANCEOLATAM, speciem a reliquis habitu diversissimam, vereor ne GRIMMIAS quoque quasdam admittere sit necesse.

E. B. VIII. t. 558. Dill. t. 45. f. 8.

*E. extinctoria*. Swartz.

*Bryum extlectorium*. L.

*Leersia vulgaris*. St. cr.

— in muris.

Caules brevissimi, plerumque simplices; folia conferta, erecto-patula, concavo-carinata, siccitate complicata, crispula, obscurè viridia, uninervia; pedicelli unguiculares, purpurascens; operculum rectum, longè conicum; calyptra albida, apice fusco, capsulam omnino tegens, acuminata, basi indivisa, integra secedens.

2. E. *ciliata*, caule subdiviso; foliis spatulato-lanceolatis; calyptrâ conicâ, basi fimbriatâ. St. cr. I. t. 19. DILL. t. 45. f. 9.

*Leersia ciliata*. St. cr.

— *fimbriata*. BRID.

— in rupibus.

Hanc speciem a præcedente disjunxit Dillenius, sed mox utramque commiscuit Linnæus. Differt E. *ciliata* statuâ duplò majore, caulibus pollicariis et ultra, ramosis; certissimè tamen dignoscitur calyptrâ ad basin, non, velut casu, lacerâ, sed processibus multis oblongis, sub lente reticulatis, pulchrè fimbriatâ. E. *streptocarpa*, H. cuius statura adhuc major, capsulâ effœtâ spiraliter tortâ, calyptrâque integrâ differt.

3. E. *lanceolata*, caule simpliciusculo; foliis lanceolatis concavis apiculatis; capsulâ oblongâ; calyptrâ dimidiatâ. St. cr. II. t. 23.

*Leersia lanceolata*. St. cr.

*Bryum lanceolatum*. Dicks.

— in sepibus.

Caules sesquilineares; folia saturatè viridia, patula, siccitate appressa et subcrispula, nervo in acumen breve producto; pedicellus trilinearis; capsula crassior, et minus quam in præcedentibus cylindracea; operculum obliquum, cuspidatum; calyptra capsulæ vix dimidium tegens, lateraliter fissilis. Formâ et habitu, sed imprimis calyptrâ, hæc species a reliquis discrepat, et *Gymnostoma* potius simulat.

9. GRIMMIA\*. SCHREB. Gen. pl. n.

1642. HEDW. Fund. II. p. 89.

WEISSIA. ibid. II. p. 90.

\* Oculatissimus Swartzius, qui florum masculorum situm ad genera stabilienda neutiquam suppetero duxit, GRIMMIAS a WEISSIAS, propter peristomii dentium latitudinem, habitumque inter se discrepantem, disjungendas censuit; pace tamen tanti viri, huic sententiae assentiri nequeo, cum W. CALCARÆ ET CALYGINÆ dentes inter utrumque genus ambigunt, et G. RECURVATA, si habitus respiciatur, WEISSIAS, si peristomium, GRIMMIIS annumerari debet.

*Caps.* ovata. *Perist.* simplex, dentibus sedecim latiusculis, indivisis. *Flores* terminales.

§ *Peristomii dentibus latis, reflexis.* Grimmia. H.

a) *Capsulâ subsessili.*

1. *G. apocarpa*, caule ramosissimo; ramis diffusis; foliis ovatis acuminatis, perichaetialibus albo-apiculatis; capsulâ turbinatâ. St. cr. I. t. 39. E. B. XVI. t. 1134. DILL. t. 32. f. 4.

*Bryum apocarpum.* L:

— in rupibus et muris.

Caules cæspitosi, pulvini in formam congesti, a vix trilineari ad ferè palmarem longitudinem variantes; folia densè imbricata, nervo crasso carinata, reflexo-patula, obscurè viridia, interdum subnigricantia; pedicelli brevissimi, laterales, terminalesque; capsulæ fuscæ, turbinatæ, substriatæ, foliis celatæ; operculum convexum, umbone brevi, recto, splendidè rubro; peristomii dentes rubri, integri, rarius hic illi pertusi.

† 2. *G. stricta*, caule subramoso; ramis strictis; foliis lanceolatis imbricatis patulis; capsulâ turbinatâ. T. 2. f. 1.

— in saxis.

Caules cæspitosi, bipollicares, ramo uno altero-que brevi, insigniter stricto, saepius instructi, ad basin nudi; folia laxiusculè imbricata, erecto-patula, interdum subsecunda, lanceolata, acuta, leviter concava, nervo crasso, nigricante, madore rufo-fusca, siccitate ferruginea et appressa; capsulæ laterales vel terminales, fuscæ, solitariæ, rarò binæ, brevissimè pedicellatæ, oblongæ, glabræ, nec striatæ, foliis perichaetialibus, ejusdem cum caulinis figuræ, et nunquam albo-apiculatis tectæ; peristomii dentes lati, errecti vel reflexi; operculum convexum, obtusè umbonatum, e fusco nigricans.—Planta siccata fragillima, primo visu *Andreae alpinæ* non absimilis.—*G. stricta* colore habituque tantum a *G. apocarpa* recedit, ut pro specie diversâ describere non refugi:—rectè, necne, judicent peritiores.—A. D. SCOTT primùm in saxis prope Swanlinbar est detecta, mox in Snowdoni jugis ipse legi.

\* 3. *G. rivularis*, caule ramosissimo; ramis diffusis sub-fastigiatis; foliis lanceolatis; capsulâ turbinatâ subsessili. T. 2. f. 2.

— in saxis ad rivulos alpinos.

Caules bi-tripollicares, infernè denudati, supernè foliosi, ramosissimi, ramis summis sub-fasciculatis; folia nigro-viridia, laxè imbricata, subsecunda, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, integra,

margine infexo concava, nervo fusco validiusculo prædita, siccitate flexilia; capsulae terminales, lateralesque, brevissimè pedicellatae, foliis perichætialibus, ejusdem cum reliquis formæ et coloris, cinctæ, solitariæ, turbinatae, glaberrimæ, nec striatae, subfuscæ, ore patulo; peristomium simplex, dentibus sedecim, basi latioribus, erectis vel reflexis, transversè striatis; operculum, cum columellâ capsulae medio affixum, obscurè fuscum, convexum, umbone brevi erecto, obtuso: calyptram non vidi.

In saxis aquâ roridis pluribus Hiberniæ partibus invenit D. SCOTT.

Primus hanc speciem, a reliquis omnibus habitu et colore valde recedentem, *Trichostomumque fontinaloides* potius simulantem, in Schraderi diario (III. p. 276) descripsit Bridelius. Variat caule ad basin usque folioso.—A *G. apocarpa* specie non diversam credit cl. Swartzius: in plurimis quidem convenient: sed foliorum color, habitusque toto cælo absimilis ut pro diversis habeam suadent.

\*4. *G. alpicola*, caule simplice; foliis lanceolatis obtusiusculis; capsula obconicâ subsessili. Swartz. Musc. Suec. t. 1. f. 1. Sp. Musc. t. 15. f. 1—5.

— in saxis.

*G. apocarpa* similis, sed minor; folia atro-viridia,

carinata, apice nunquam incana; capsulae terminales, lœves, ore dilatatae; operculum obliquè rotatum; peristomii dentes integri reflexi. Ex Hiberniâ misit D. SCOTT.

† 5. *G. maritima*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis; capsula turbinata. T. 3. f. 2.

— in rupibus marinis.

Caules unguiculares, cæspitosi, pulvini instar congesti, simplices, vel basin versus furcati; folia laxè imbricata, erecto-patentia, siccitate sub-incurva, lanceolato-subulata, nervo validiusculo, pallido leviter carinata, infima nigro-viridia, summa lutescentia, unde planta bicolor appetet; capsulae terminales, solitariæ, brevissimè pedicellatae, foliis tectæ, obovatæ, glabrae, pallidè subfuscæ, ore patulo; peristomium simplex, dentibus sedecim rubris, basi latioribus, erectiusculis, transversè striatis, integris; operculum, columellâ capsulae affixum, convexum, rostro capsulae ferè longitudine, sub-curvato: calyptram non vidi.

Habitat in saxis maris æstui objectis prope Bal-briggen. D. SCOTT.

A *G. plagiopodiâ*, H. cui affinis, foliorum formâ, apicibus nunquam piliferis, peristomiique dentibus integris diversa. Iisdem ferè notis a *G. cribrosâ* dignoscitur, et a præcedente, quâcum unâ inter Hibernicas confundi potest, folia longa subulata primo visu distinguunt.

b) *Capsulâ pedicellatâ.*

6. *G. Daviesii*, caule subsimplice; foliis subulatis siccitate crispis; calyprâ campanulatâ laxâ sulcatâ capsulam tegente. Dicks. t. 7. f. 6.

*Bryum Daviesii.* Dicks.

— in rupibus marinis.

Caules unguiculares, cæspitosi, subsimplices; folia infima nigra, summa luteo-viridia, omnia subulata, longa, conferta, complicato-carinata, patula, siccitate crispa et contorta; pedicellus trilinaris, ruber; capsula obconica, truncata, fusca; operculum rostro longo, erectiusculo; calyptre, *Encalypterarum* instar, ventricosa, basi laciniata; peristomii dentes valde lati, reflexi, rubri, transversè striati.—Hanc speciem *Encalyptis* esse associandam censem Smithius; *Octoblephari albidæ* esse affinem optimè monuit Swartzius.

7. *G. recurvata*, sub-acaulis; foliis setaceis patulis, capsulâ pyriformi; operculo rostrato; pedicello arcuato-recurvo. St. cr. I. t. 38.

*Bryum recurvatum.* Dicks.

— in saxis.

Planta perpusilla, fragilis: folia saturatè, vel glauco-viridia, rigidiuscula, siccitate vix crispula; pedicellus circiter bilinearlis, flexuosus; capsula maturitate sulcata, atro-rubens, basi attenuatas, ore patulo; operculi rostrum longum, tenuem, incur-

vum.—Hæc species crescendi modo, formâque (staturâ triplè minore dempta) *Dicranum fragile* multùm refert.

8. *G. nuda*, sub-acaulis; foliis lanceolatis erectis; capsulâ ovato-globosâ inclinatâ; operculo conico-convexo. Dicks. t. 10. f. 15.

*Bryum nudum.* Dicks.

— in fluviorum ripis.

Planta verè singularis, statimque dignoscenda: caulis vix ullus; folia perpaucia, congesta, lanceolata, acuminata, erecto-conniventia, nervo obsoletō; pedicellus pollicaris, et ultra; capsula dilutè fusca, siccitate striata.—Species hæc habitu formâque *Dicranum* tantum simulat, ut iis annumeraverim, ni Dicksoni, qui peristomium vidit, dentesque latiusculos integros dixit, summa auctoritas varet.

§§ *Peristomii dentibus angustis, erectis.*

WEISSIA. H.

c) *Capsulâ pedicellatâ.*

9. *G. calcarea*, sub-acaulis; foliis cylindraceo-setaceis patulis strictis; capsulâ turbinatâ erectâ; operculo rostrato incurvo, Dicks. t. 4. f. 3. Sp. Musc. t. 11. f. 1.—6. E. B. III. t. 191.

*Bryum calcareum.* Dicks.

— in rupibus calcareis.

Planta vix sesquilinearis : folia saturatè viridia, pauca, brevia, e basi amplexicauli cylindracea, obtusiuscula, semper, vel siccitate, stricta ; capsula abbreviata, fusca, lævis ; operculum capsulae ferè longitudine ; pedicellus erectus.—Bridelius, qui in Muscologiâ (II. p. 76.) hanc plantulam cum *Weissia pusillâ* conjunxerat, mox de sententiâ discessit ; ipse tamen fateor me nihil, quod ad species duas ritè constituendas sufficiet, adhuc reperisse.

10. *G. Starkeana*, caule brevissimo subdiviso, foliis oblongo-ovatis apiculatis reflexo-patulis ; capsula ellipticâ ; operculo convexo. St. cr. III. t. 34. Dicks. t. 10. f. 17.

*Weissia Starkeana*. H.

*Bryum minutum*. Dicks.

— in lutosis.

Caulis vix linearis, saepius furcatus ; folia conferta, amœnè, sed saturatè viridia, nervo crasso fusco brevissimè apiculata, siccitate nigricantia coniventia ; pedunculi sub-bilineares, rutilantes ; capsulae erectæ, subfuscæ, glabræ ; operculum breve. *B. minutum*, Dicks. monente am. Smithio, hæc retuli, folia licet in Dicksoni exemplaribus angustiora videantur, et cùm ab ejus, tūm ab Hedwigii iconе specimina nostra, prope Eblanam a cl. Stokesio lecta, staturâ ferè duplò majore et colore intensiore discrepent.

11. *G. controversa*, sub-acaulis ; foliis subulatis siccitate tortilibus ; capsula ellipticâ ; operculo subulato incurvo. St. cr. III. t. 5. Dill. t. 48. f. 43.

*Weissia controversa*. H.

— virens. BRID.

*Bryum virens*. Dicks.

— vridulum. Huds.

in sepibus.

Planta gregaria, vix tres lineas alta, ubique luteo-viridis ; folia longa, e basi dilatatâ subulata, madore patula, siccitate mirè crispa, et contorta. *A W. pusillâ*, foliis exsiccatione contortis, a fugace, capsula lævi, minus striatâ, ore nunquam patulo, foliisque subulatis statim dignoscitur.

12. *G. Dicksoni*, caule ramoso ; foliis lanceolatis carinatis siccitate tortilibus ; capsula ellipticâ ; operculo subulato incurvo. Sp. Musc. t. 12. f. 7—12. Dicks. t. 7. f. 7. Dill. t. 48. f. 42.

*Weissia circrata*. H.

*Encalypta circrata*. Swartz.

*Bryum Dicksoni*. Dicks.

— in lignis emortuis.

Caulis densè cæspitosi, pulvini in formam congesti, sub-pollicares, saepius ramosi ; folia infima nigricantia, summa luteola, omnia densè imbricata, lineari-lanceolata, acuta, nervo crasso, fusco carinata, madore patula, siccitate crispa et con-

torta; pedicelli unguiculares; capsulae cylindro-ellipticae, ore paullum coarctato, tæves, pallidæ; operculum longum, tenuë, curvulum.—Habitu, colore, et fructu mirè præcedentem refert, sed crescendi modo, staturâ majore, et foliorum formâ affatim distinguitur. Hedwigii icon, supra allata, cum plantâ nostrâ omnino convenit, sed exemplaria a cl. Schwaegrichenio communicata specie diversa videntur. An hujus quoque loci *Mnium cirratum* L. quod pro synonymo proferre non sustinui, licet ut verè discrepet dubito?

- \*13. *G. crispula*, caule sub-simplice; foliis lanceolato-subulatis carinatis siccitate crispis; capsula ellipticâ; operculo subulato obliquo. Sp. Musc. t. 12. f. 1.—6.

*Weissia crispula*. H.

— in saxis.

Caules sub-pollicares, simplices, vel bifurci; folia conferta, e basi latiore, longè subulata, infima nigricantia, summa dilutè viridia, siccitate valde tortilia, nervo fusco; pedunculi terminales, lateralesque, copiosi, semiunguiculares, rubentes; capsulae glabrae, neutiquam striatae.—*G. Dicksoni* summoperè affinis; sed surculis tenuioribus, foliis gracillioribus, magis acutis, capsulisque brevioribus, specie differre videtur. Apud Powerscourt, prope cataractam, detexit D. Stokes. E. Cambriæ accepti cl. Smithius.—Foliorum apices obsoletè et abnormiter serratos sub lente maximè augente vidi.

14. *G. recurvirostra*, caule sub-simplice; foliis oblongo-lanceolatis horizontalibus crispulis; capsula cylindracea; operculo conico recurvo. St. cr. I. t. 7. DILL. t. 48. f. 45.

*Weissia recurvirostra*. H.

*Bryum curvirostrum*. DICKS.

— *setaceum* L. Huds.

— in lapidosis sabulosis.

Caules a bilineari, ad pollicarem ferè longitudinem variant; folia laxè imbricata, fusco-viridia, leviter carinata, obtusiuscula, uninervia, semper horizontaliter patentia, crispula, et, praesertim siccata, apice paullum tortilia; pedicellus pollicaris, rufescens; operculi rostrum duplo brevius quam in *G. controversa*, et *Dicksoni*, insigniter curvatum.—Habitu *Tortulas* refert.

15. *G. acuta*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis carinatis enervibus subsecundis; capsula turbinata; operculo rostrato. St. cr. III. t. 35. Sp. Musc. t. 14, f. 6—12. DILL. t. 47. f. 34.

*Weissia acuta*. H.

— *rupestris*. H.

*Bryum acutum*. Huds.

— *splachnoides*, capsula basi obsoletè strumiferà.

*Bryum splachnoides*. DICKS. (excl. syn. Fl. Dan.)

— in montosis madidis.

Caules bipollicares, et ultra, raro divisi, foliis flavescenti-viridibus, e basi latâ lanceolato-subulatis, saepius incurvato-subsecundis, siccitate splendentibus, sed neutquam crispulis, laxè imbricatis, obsiti; pedicelli laterales, vix semi-unguiculares; capsulae principio ovatae, mox turbinatae, ore per quam patulo, laevissimae, fuscæ; peristomii dentes magni, pulchrè rubri; operculi rostrum capsulae ferè longitudine, incurvum, tenue.—*Weissiam rupestrem*, iconis et exemplarium, a Schwaegrichenio Mohrioque missorum fide, sub hâc specie citavi.— Var.  $\beta$ , ut vereor, ab ætate adultiore tantum pendet: apophysis valde obsoleta. Ad speciem totum cælo distantem, et *Bryum Schisti* a Gunnero nuncupatam, iconem in *Florâ Danicâ* t. 538. f. 2. retulerunt Botanici Suiones.

16. *G. heteromalla*, caule sub-simplice; foliis setaceis arcuato-secundis; capsulae ovato-cylindracea; operculo conico rectiusculo. St. cr. I. t. 8.

*Weissia heteromalla*. H.

*Bryum Weissia*. Dicks.

— in viis.

Caules cæspitosi, trilineares et ultra, saepius simplices; folia luteola, e basi dilatata, amplexicauli, subulata, laxè imbricata, rigidiuscula, siccitate nitida, nunquam tortilia; pedicellus subpollicaris, purpureo-rascens; capsula annulata, fusca, laevis, ore nun-

quam patulo; operculum breve, conicum, obtusulum, plerumque rectum.—*Didymodon homomallum*, Sp. Musc. (t. 23. f. 1—7.) ab hâc vix satis differre mihi videtur.

17. *G. verticillata*, caule ramoso; foliis linearisubulatis interruptè fasciculatis patulis; capsulae ovatae; operculo rostrato recurvo. DILL. t. 47. f. 35. St. cr. II. t. 24.

*Gymnostomum recurvirostrum*. H.

*Bryum verticillatum*. L.

— in rupibus.

Caules cæspitosi, implexi, graciles, pollicares, bis ter divisi; folia glauca, angusta, linearia, apice acuminata, encvia, hic illuc fasciculata, et tanquam verticillata, rigidiuscula, madore patula, siccitate sub-appressa, neutquam tortilia; pedicelli, e surculis annotinis orti, subunguiculares, pallidi; capsulae ovatae, laeves, atro-rufæ, effætae ore patulo; operculum capsulae ferè longitudine, arcuatum, recurvum, tenue, acutum; peristomii dentes breves, citissime caduci.— *Hedwigii* synonymon, supra allatum, cum iconis, tum exemplaris ab ipso Schwaegrichenio missi fide, huc retuli, et si quis *Bryum fasciculatum* Dicks. etiam citaret, pace Dicksoni, non is, me judice, multum erraret.— Prope fontes in rupibus calcareis habitare amat hæc species, unde caules terrâ calcarea plerumque obducti reperiuntur.

**10. PTEROGONIUM.\* HEDW.** St. cr.  
IV. p. 16. *Pterigynandrum*. H.

*Caps.* oblonga. *Perist.* simplex, dentibus se-decim, vel triconta-duobus, erectis. *Fl.* axillares.

*P. sciuroides*, caule repente ramoso : ramis sim-pliciusculis siccitate incurvis ; foliis ovatis striatis ; operculo conico. *DILL.* t. 41. f. 54.

*Fissidens sciuroides*. H.

*Dicranum sciuroides*. Swartz.

*Hypnum sciuroides*. L.

— in arboribus.

Rami pollicares et ultra, raro divisi, teretes, erecti, siccitate arcuato-incurvi ; folia luteo-viridia, ovata, brevitè acuminata, enervia, sed striis plurimis, nervos mentientibus, præsertim apices versus, instructa, madore erecto-patula, siccitate appressa, et interdum subsecunda, perichaetalia al-bescentia, longa, lanceolato-subulata, enervia, ap-

\* Recte in Schraderi diario observavit doct. Sprengel, hoc ge-nus, quod a floribus axillaribus nomen dicit, non *PTEROGONIUM*, sed *MASCHALANTHUS* nominari debere.

pressa ; pedicelli sub-unguiculares, perichaetium vix superantes ; capsulae ellipticae, atro-rufæ, erectæ, læves ; operculum breve, conicum, obtusiusculum ; calyptre alba, lævis.—*P. julaceo*, et *trichomitrio* affine : ab hoc, calyptre lævi, ab illo, foliorum formâ et striis, ab utroque, operculo conico dig-noscitur.—Mirum profectò hanc plantam inter *Dicrania*, quorum nulli affinis, hactenùs relictam, et a nemine *Pterogoniis*, quibus liquidò attinet, esse associatam. Quoad peristomium, si icon in *Hedw.* Fund. II. t. 7. f. 46. accuratè depingatur, ambigere quidem videtur, sed in exemplari, quod nunc sub lente observo, dentes ad basin usque dividuntur ; hinc, licet eorum numerus duplò major sit quam in reliquis, omnino fit *Pterogonium*, generisque characterem in hoc mutare sustinui.

**11. TRICHOSTOMUM.\* SCHREB.** Gen.  
Pl. n. 1645. *HEDW.* Fund. II. p. 90.  
t. 8. f. 43, 44. *Didymodon*. St. cr.  
III. p. 8. *Swartzia*. St. cr. II. p. 72.  
*Cynontodium*. Sp. Musc.

\* *TRICHOSTOMA*, *DIDYMODONTES*, et *CYNONTODIA* primus, ni fallor, conjunxit amiciss. Smithius, cui lubentissime in hoc assentor;

*Caps.* oblonga. *Perist.* simplex, dentibus triginta-duobus capillaribus, per paria approximatis, vel basi connexis.

§ *Peristomii dentibus basi liberis.* *Didymodon.* H.  
*Cynodontium.* H.

1. *T. rigidulum*, caule ramoso; foliis lanceolatis patentibus rigidiusculis; capsula elliptica; operculo subulato sub-incurvo. St. cr. III. t. 4.

*Didymodon rigidulum.* H.

*Bryum rigidulum.* Dicks.

in muris.

Habitus omnino *Tortula*; caules cespitosi, sub-unguiculares, apicem versus divisi; folia numerosa, pallide viridia, e basi latâ lanceolata, acuminata, margine involuta, nervo valido concolore carinata, siccitate incurva; pedicelli pallidi, pollicares; capsulae maturæ striatæ; operculum tenui, capsula ferè longitudine.—A *Swartzia trifariá*, H. capsula apice constricta, et operculo subulato, nec conico, imprimis distinguitur.

peristomii enim dentes in omnibus fere tam profunde finduntur, ut, nisi lente acerrima lustrentur, distincta videantur: genus quoque naturæ perquam conveniens juncta efficiunt.—*TRICHOSTOMA* inter *TORTULAS* et *DICRANA* sunt quasi media, sed illas nimium referunt, ut a difficultatibus, quibus ex scatent, omnino vacent.

2. *T. capillaceum*, caule simplice; foliis capillaceis sub-distichis horizontaliter patentibus; capsula elliptica erecta; operculo conico. St. cr. II. t. 26. E. B. XVI. t. 1152. Dicks. t. 1. f. 6.

*Cynontodium capillaceum.* Sp. Musc.

*Swartzia capillacea.* St. cr.

*Didymodon capillaceum.* Swartz.

*Bryum capillaceum.* Dicks.

in montosis.

Caules bi-triunciales, gracillimi, infernè nudi, ferrugineo-tomentosi, supernè foliosi; folia lutescentia, remotiuscula, e basi latâ, vaginante, capillacea, longa, flexuosa, sub-disticha, siccitate erecta, nec raro appressa; pedicelli pollicares, flavescentes, tenuissimi; capsulae ex elliptico conicæ, fuscæ; operculum breve, conicum.—A *Swartzia inclinata*, H. capsula erecta, dentiumque peristomii numero differt.

§§ *Peristomii dentibus basi connexis.* *Trichostomum.* H.

3. *T. polyphyllum*, caule subramoso; foliis lanceolato-subulatis serratis siccitate contortis; capsula elliptica; operculo subulato. T. 7. DILL. t. 48. f. 41. E. B. XVII. t. 1217.

*Dicranum polyphyllum.* E. B.

*Bryum polyphyllum*. Dicks.  
— *cirratum*. ß. Huds.

in saxis,

Caules densè cæspitosi, pulvini instar congesti, fastigiati, sesquiplicares, basin versus, ut plurimum, divisi; folia inferiora nigricantia, superiora luteola, omnia lanceolata, longè acuminata, nervo valido concolore carinata, et, præsertim apices versus, manifestè serrata, madore patula, siccitate valde tortilia; pedicelli terminales, lateralesque, numerosi, trilineares, pallidi; capsulæ erectæ, dilutè fuscae, læves; operculum capsulæ ferè longitudine, rectum, aciforme; calyptra, *Orthotrichorum* instar, campanulata, sulcata, acuminata, fusca, basi lacera, capsulam juniorem tegens.—Hæc planta, non nisi in Britanniae insulis hucusque detecta, tot Botanicis fucum fecit, ut iconem instituere non supervacaneum fore spero. Peristomii dentes longi, rubentes, fragillimi, plerumque tam decurtati reperiuntur, ut *Dicrani* species videatur, et hinc accuratiss. Smithium, qui *Dicranis* in opere suprà citato, sed et *Trichostomis* (sub *T. cirrati* nomine) in Florâ Britannicâ, nondum vulgatâ, annumeravit, sefellerunt.—Botanici exteri hanc stirpem cum *Fissidente polycarpo*, H. conjugendam censuerunt; ab hoc autem foliis serratis, magis tortuosis, capsulâ ore constrictâ, operculoque recto, primo aspectu dignosci potest.—Varietatem, cuius caules vix sunt trilineares, e montosis prope Belfast, misit

D. Templeton.—Variat quoque foliis omnibus atratis.

4: *T. heterostichum*, caule ramoso erecto; foliis lanceolatis acuminatis patulis apice incano denticulato; capsulâ cylindraceâ. St. cr. II. t. 25. DILL. t. 47. f. 27. A, F, G.

*Bryum heterostichum*. Dicks.

— in montosis.

Caules cæspitosi, sub-pollicares, abnormiter divisi; folia saturatè viridia, nervo\* valido, concolore carinata, sub-striata, patula, undique imbricata, interdum sub-secunda, siccitate appressa; pedicelli trilineares, surculis longiores; capsulæ elongatae, fuscæ, glabræ, juniores oblongæ, mox cylindraceæ; operculum subulatum, curvulum.—Folia exsiccatione atro-virentia, apice incano, nitente, rami sparsi, neutiquam pinnati, et capsularum forma hanc speciem a congenibus distinguunt.

\* In plerisque muscis, et præsertim in *Hypnis*, foliorum nervum ad species rite discriminandas plurimum conferre expertus scio: eadem tamen nota in *T. HETEROSTICHO*, *LANUGINOSO*, *ERICOIDI*, *FASCICULARI*, *CANESCENTE*, et *MICROCARPO*, neutiquam valet; hæc enim omnia striis duabus parallelis, nervi lati concoloris speciem prebentibus, percurruntur, sed ut sint vere uninervia metuo; cum striis quoque aliis sæpe notentur, et hæc duæ plerumque in *T. CANESCENTE*, et interdum in aliis interruptæ occurrant. Hedwigii auctoritatæ obtemperans uninervia in præsenti dixi, sed ut alii Botanici ad rem accurate investigandam propellantur spero.

5. *T. lanuginosum*, caule pinnatim ramoso decumbente; foliis linear-lanceolatis reflexis, apice incano denticulato; capsulâ ovatâ. St. cr. III. t. 2. DILL. t. 47. f. 32.

*Bryum hypnoides*.  $\alpha$ . L.

— in ericetis.

Caules ferè spithamæi, divisi, ramis brevibus, sub-horizontalibus sparsim pinnati; folia subsecunda, saturatè vel luteolo viridia, conferta, nervo concolore concavo-carinata, lanceolata, in apicem longum, incanum, flexuose recurvum producta; pedicelli vix trilineares, laterales, ramis breviores; operculum conicum, acuminatum, rectum, capsulæ concolor.—Crescendi modo, capsulaque formâ statim a præcedente dignoscitur.

6. *T. ericoides*, caule pinnatim ramoso erecto; foliis lanceolatis acuminatis; capsulâ ellipticâ; operculo rostrato. DILL. t. 47. f. 31.

*Bryum ericoides*. DICKS.

— *hypnoides*.  $\gamma$ . L.

— in saxis.

Caules erecti, bipollicares, ramis confertis, brevibus obsiti; folia lutescenti-viridia, numerosa, nervo lato, concolore carinata, apice nunquam, (in exemplaribus Dillenianis nostrisve,) incana, integrerrima, madore reflexo-patula, siccitate appressa;

pedicelli pollicares, et ultra, caulem superantes, rufi; capsulæ ellipticæ, erecte; operculum, teste Schraderi, subulatum.—Dillenii, Schraderique summæ auctoritati obtemperans, *T. ericoides* et *fasciculare* disjunxi; fateor tamen me discriminem nullum, quod ad species duas rectè constituendas sufficiet, adhuc reperisse. Folia apice incana dixit Schraderus, sin ita sit, quomodo a *T. canescens*, quocum Hedwigius conjungendum censuit, distinguatur, nescio. Hæc tria forsan in unam specimen rectius resolverentur, et inde errori, ut ait Bridelius, inextricabili, ambagibusque vix resolvendis terminus tandem imponeretur.

7. *T. fasciculare*, caule pinnatim ramoso procumbente; foliis lanceolatis acuminatis; capsulâ ovatâ; operculo rostrato recto. DILL. t. 47. f. 28.

*Bryum lutescens*. DICKS.

— *hypnoides*.  $\beta$ . L.

— in saxis.

Si caulis procumbens, erescendique modus paullò laxior excipiantur, nullum quidem inter hanc speciem et præcedentem discriminem reperio. Color forsan in hâc magis lutescens, et folia magis recurva.

8. *T. canescens*, caule ramoso; foliis ovato-lanceolatis striatis reflexis, apice incanis; capsulâ ovatâ;

operculo subulato. St. cr. III. t. 3. DILL. t. 47.  
f. 27. B—E.

*Bryum canescens*. With.

— in sterilibus.

Caulis sesquipollulares, erecti; rami breviusculi, plerumque, ut in præcedentibus, pinnati, sed interdum sparsi; folia lutescentia, carinata, striis duabus vel tribus, nunc nervum latum simulantes, nunc, ut saepius accidit, interruptis, prædicta, madore reflexo-patula, siccitate erecta, sub-appressa; pedicelli pollares et ultra, caulem superantes, rufi; capsulae ellipticae, erectae; operculum longum, subulatum, rectum.—Folia a pice incana hanc speciem a *T. fasciculari*, quod formâ, habitu, colore maximè refert, distinguunt. Fierine potest ut hoc in illud transeat?

9. *T. microcarpum*, caule sub-ramoso; foliis lanceolatis erectis, summis apice incanis; capsula ovata; operculo subulato. Sp. Musc. t. 23. f. 8—12.  
DILL. t. 47. f. 29.

*Bryum macrocarpon*. With.

— *hypnoides*. 8. Fl. Suec.

— in sepibus.

Caulis cæspitosi, sub-pollicares, graciles, teretiusculi, simplices, vel semel atque iterum divisi; rami longiusculi; folia atro-viridia, erecta, dense

imbricata, nervo lato, concolore carinata, siccitate appressa, summa tantum brevitè albo-apiculata; pedicelli breves; vix trilineares, surculos superantes, capsulae exiguae, fuscæ, ovatae, vel subrotundæ; operculum rostratum, rectum.—Foliis erectis, nigricantibus, pedicellisque et capsulis exiguis haec species satis a præcedentibus dignoscitur, et a *T. obtuso*, Brid. (Dill. t. 47. f. 30.) quod plurimum referre videtur, capsulae et operculi formâ differt.—Peristomii dentes longi, tenues, minus profundè quam in reliquis finduntur, unde Bridelius, in Schraderi diario, (III. p. 291) *Dicranis associandum* censem: huic autem sententiae e peristomii investigatione ascribere nequeo, sed *Dicranum ovali* esse affine, et *Dicranum* cum *Trichostomis* esse per hanc stirpem inter se connexa memoratu dignum videtur.

10. *T. fontinalioides*, caule ramoso fluitante; foliis oblongo-lanceolatis patulis; capsulis lateralibus subsessilibus perichaetio obvolutis. St. cr. III. t. 14.  
DICKS. t. 4. f. 2.

*Fontinalis alpina*. DICKS.

— in rivulis alpinis.

β. *incrassatum*; foliis ovatis concavis obtusis.  
DILL. t. 33. f. 2. E. B. VIII. t. 557.

*Fontinalis minor*. L.

— in fluviis.

Caules palmares, vel spithamæi, fluitantes, sparsum ramosi: folia atro-viridia, undique laxè imbricata, interdum subsecunda, sub-elliptica, obtusiuscula, nervo nigricante percursa, madore patula, lenitè flexuosa, siccitate lurida, appressa, et spiraliter torta, \* infima saepius ita corrossa, ut nervus tantum restet, et setacea videantur; pedicelli laterales brevissimi; capsulæ foliis perichaetialibus, ejusdem cum caulinis formæ, obtectæ, oblongæ, læves, fuscae; operculum conicum, acutum, apice curvulum.—Var.  $\beta$ , quam specie differre contendit Dicksonus, negat Smithius, caule breviore, foliisque concavis, latè ovatis, siccitate minus tortilibus dignoscitur; sed a loco natali pendere, et in  $\alpha$  transire credo.—Plurimum laboris huic stirpi impedit Bridelius, qui summoperè esse polymorpham optimo jure in Muscologiâ observavit.—*Fontinales* habitu omnino refert, unde quod iis a Dillenio Linnaeoque annumeraretur minimè mirum.—Icon in Historiâ Muscorum, quæ capsulas omnibus ramorum apicibus insidentes fingit, plurimos Botanicos fefellisse videtur, sed exemplaria Dilleniana in herbario suo jam nunc Oxoniæ conservata, cum nostris omnimodiè convenire oculatus testis adsum.

---

\* Hoc et in reliquis foliis interdum accidit, unde planta faciem longe alienam induit.

12. \***TORTULA.** SCHREB. gen. pl. n.

1647. HEDW. Fund. II. p. 92. t. 8.  
f. 38, 39. **BARBULA.** *Ibid.*

*Caps.* cylindracea. *Perist.* simplex, dentibus plurimis capillaribus, spiraliter convolutis.

1. *T. rigida*, sub-acaulis; foliis lingulatis margine involutis enervibus patulis; capsulâ cylindracea erectâ. St. cr. I. t. 25. DILL. t. 49. f. 55. E. B. III. t. 180.

*Barbula rigida.* H.

*Bryum rigidum.* Huds.

— in sepiibus.

---

\* Tot tantisque difficultatibus laborant multæ hujus generis species, at Botanicos fere omnes ad incitas redegerunt, et vel ipse Hedwigius (ut Schwaegrichenii sui verbis utar) “hier fand unendliche schwierigkeiten.” Hinc indagatorem illum indefessum mortem, dum hoc genus tractaret, oppetivisse, summopere est dolendum. Quis enim in Muscologia rem, de qua Hedwigius dubitaverat, pro certo affirmare ausit? Liceat mihi ergo in ipso limine fateri, me has difficultates neutiquam ex yoto enodavisse, sin vita maneat, Botanicique exteri species, quas descriperunt, impetrare non dedignantur, plura præstare mox conabor.---Cavendum est ne *TORTULÆ* quædam, peristomii dentibus ætate vel casu fractis evolutisque, *TRICHOSTOMIS*, quæ habitu referunt, annumerentur.

Caulis brevissimus, simplex; folia pauca, atro-viridia, conferta, carnosa, rigidiuscula, siccitate incurva, lurida; pediceilus pollicaris; capsula matura fusca, lœvis; operculum longè rostratum, curvulum, in exemplaribus a Swartzio missis conicum, obtusiusculum.—*Bryum stellatum*, Schreb. quod Dicksonus pro synonymo sub suo *B. stellato*, *Barbulâ agrariâ*, H. citavit, huc referri debet.

- \* T. \**subulata*, caule brevissimo sub-simplice; foliis oblongo-lanceolatis apiculatis patulis; capsulâ cylindraceâ erectâ; operculo subulato. Sp. Musc. t. 27. DILL. t. 45. f. 10. E. B. XVI. t. 1101.  
*Bryum subulatum*. L.

— in sepiibus.

\* *TORTULAS BARBULASQUE Hedwigii*, nullo ordine servato, commiscui, discriminem erim plane nullum invenio, et nequeo non dole re Botanicum illum celeberrimum systemati suo tam arte hæsisse, ut has plantulas propter florum masculorum situm, invita natura, disjunxisset. Quod autem Eridelius, in Schraderi diario, (III. p. 299) de Barbulis in duo genera distribuendis disserit, memoratu dignum videtur. ‘In plerisque *BARBULIS* peristomatis cilia spiraliter consta ad basin usque libera sunt, in nonnullis vero hæc cilia ad medium circiter longitudinis coalescent, trabeculisque transversalibus intertextis cylindrum reticulatum non alter quam peristomate des tructo dissolvendum, formant. Duas tantum species novi, quæ ha c peristomatis structura donantur, nempe *B. ruralem*, et *B. agrariam*B. ericetorum associanda, quæ novum genus, nobis *SYNTRICHIAS* dictum, constituant.’

Caules vix bilineares; folia conferta, lætè viridia, rosæ instar expansa, sub lente reticulata, carinata, nervo valido, ad apices extante, brevitè apiculata; pedicelli pollicares, atro-rubentes; capsulæ bilineares, et ultra, graciles, erectæ, maturitate levissimè curvatæ; operculum rectum, capsulâ triplò brevius.— Varietas foliis piliferis (quæ *T. pilosa*, Schrad. fide Hedwigii) hic illuc occurrit: folia autem pilifera et mutica in eodem individuo reperi.

- \* 3. T. *humilis*, caule brevi sub-simplice; foliis oblongo-spatulatis apiculatis carinatis congestis erecto-patulis; capsulâ oblongâ; operculo subulato. Sp. Musc. t. 25. f. 1—4.

*Barbula humilis*. H.

— in rupestribus.

Caules plerumque vix sesquilineares, interdum ad semiunguicularem longitudinem variant, sæpius prope basin bifurci; folia amœnè viridia, numerosa, congesta, lata, apice rotundata, nervo obscuro complicato-carinata, et brevitè apiculata, madore erecto-patula, rariùs apice reflexa, siccitate tortilia; pedicelli surculorum basin versus, ut plurimum, orti, caules vix superant, pallidè purpurascentes; capsulæ oblongæ, erectæ, vel aliquantillum obliquatae, rufo-fuscæ, lœves; operculum capsula ferè longitudine, obliquum.—DILL. t. 49. f. 56

quam Hedwigius sub hâc specie citavit, ad *Barbulam agrariam*, (*Bryum stellatum*, DICKS.) fide sui herbarii attinet.— A præcedente, cui valdè affinis, pedicellis triplò ferè brevioribus, et capsularum formâ et colore affatim dignoscitur.— Prope Eblanam legit D. Stokes, prope Belfast D. Templeton.

\* 4. *T. apiculata*, caule simplice abbreviato; foliis remotiusculis oblongo-lanceolatis apiculatis erecto-patulis; capsula oblongâ; operculo rostrato. Sp. Musc. t. 26. f. 1...3.

*Barbula apiculata*. H.

ad terram.

Caules sub-bilineares, erecti, graciles; folia pauca, dilutè viridia, oblonga, brevia, concavo-carinata, obtusiuscula, nervo nigricante brevitè apiculata, margine revoluta, infima patula, summa erecta, siccitate incurva, vix tortilia; pedicelli terminales, unguiculares, purpurascentes; capsulæ oblongæ, maturitate cylindraceæ; operculum, teste Hedwigio, capsulæ ferè longitudine, lenitè incurvatum. Exemplaria nostra, *Killesandra* ab am. Stokesio lecta, neutiquam, nisi pedicellis aliquantûm longioribus, capsulisque magis cylindraceis, ab iis, quæ ex Americâ Rev. Muhlenbergius benevolè communicavit, discrepant. Operculum et calyptre defuerunt.

5. *T. mucronulata*, caule sub-diviso; foliis linearilanceolatis-apiculatis carinatis reflexo-patulis; capsula oblongâ; operculo rostrato. St. cr. I. t. 23.

*Barbula unguiculata*. H. (excl. Syn.)

*Bryum mucronulatum*. DICKS.

β. *simplex*, caule indiviso; foliis longè apiculatis.  
— in sepibus.

Caules cæspitosi, unguiculares, et ultra, erecti, semel atque iterum divisi; folia nunc luteolo, nunc saturatè viridia, remotiuscula, linearilanceolata, latiuscula, carinata, nervo crasso, albescente, in mucronem brevissimum desinente percursa; pedicelli, e surculis annotinis orti, laterales, subpollicares, purpurei, nitidi; capsulæ erectæ, aut aliquantillûm obliquatæ, fuscae; operculum longum, obliquum.—Var. β, quam prope Eblanam legit D. Stokes, locum ferè medium inter hanc speciem et præcedentem tenet: folia minùs quàm in *T. mucronulata* reflexa, sed longiora et angustiora, quàm in *T. apiculata*, siccitate tortilia—anon potius distincta species?—Am. Smithius DILL. t. 48. f. 49, quam sub *Bryo tenui* citavit Dicksonus, huc referendam censem.

6. *T. unguiculata*, caule sub-diviso; foliis lanceolafobulatis carinatis reflexo-patulis; capsula oblongâ; operculo rostrato. DILL. t. 48. f. 47.?

— in muris.

Formā, magnitudine, crescendi modo, et colore, cum præcedente convenit, sed foliis angustissimis, subulatis, nec apiculatis primo aspec-  
tu distinguitur.—Dillenii iconem, supra allatam,  
Dicksoni auctoritati obtemperans, huc retuli,  
dubitantē tamen citavi, cūm, quantum ex ex-  
emplaribus desiccatis judicare licuit, ad *T. mucronulatam* pertinere mihi videretur.—Folia in  
*T. unguiculatā* summa insigniter stellatim expanduntur, et pedicelli caules vix superant, unde  
*Dill.* t. 48. f. 48. huc potius referendam censem.  
—Cuinam Botanicorum has tam nexas am-  
bages resolvere dabitus?

7. *T. fallax*, caule ramoso; foliis lanceolatis acumi-  
natis carinatis reflexo-patulis; capsulā oblongā;  
operculo rostrato. St. cr. I. t. 24. *Dill.* t. 48.  
f. 46.

*Barbula fallax*. H.

*Bryum fallax*. Dicks.

— *imberbe*. L.

— in argillosis.

A præcedente, cui valde similis, differt sta-  
turā crassiore, caule magis ramoso, foliis lutes-  
centibus, basi latioribus. Folia remota, carinata,  
interdum ferè complicata, nervo nigricante præ-  
dicta, siccitate incurva, vix tortilia: pedicelli, e  
surculis annotinis orti, caules paullum superant;

operculum obliquum, longitudinis incertæ, cap-  
sulam nunc æquans, nunc dimidio brevius.—  
Muscum hunc a *B. imberbi* differre cl. Dick-  
sonus perhibet, exemplaria tamen ab ipso missa  
cum *T. fallaci*, e Germaniā acceptā, omnino  
congruunt.—Dillenii iconem herbarii sui fide  
citavi.—Peristomium citissimè caducum. Formā  
et magnitudine multum ludit hæc species, et va-  
rietatem, facie longè discrepantem, cui folia longius  
acuminata, et vel madore erecto-patula, ex Hiber-  
niā misit D. Templeton.

8. *T. convoluta*, caule ramoso; foliis oblongis reflexo-  
patulis, perichætialibus in cylindrum convolutis;  
capsulā ellipticā. St. cr. I. t. 32. *DILL.* t. 48.  
f. 44.

*Barbula convoluta*. L.

*Bryum setaceum*. Huds. (nec Linn.)

— in muris.

Caules breves, cæspitosi, bi-trilineares, ad basin  
divisi; folia saturatè viridia, oblongo-spatulata,  
obtusiuscula, patula, remotiuscula, sub-disticha,  
marginè inflexa, nervo ferè concolore carinata,  
siccitate appressa, contorta, lurida, perichætia  
obtusa, enervia, albida, pedicelli circa basin arctè  
involuta; pedicelli, ad furcas ramorum orti, ses-  
quiunguiculares, luteoli, maturitate rubescentes;  
capsulae juniores dilutè virides, adultiores fuscae,

graciles; operculum conicum, capsulâ plus duplo brevius, rubrum.—Staturâ minore, pedicellis pallidis, et perichaetio cylindrico, hæc species a *T. mucronulata* et *unguiculata* statim dignoscenda est.—Exemplaria, quibus operculum subulatum, obliquum, capsulam longitudine æquabat, prope Eblanam legit D. Stokes.

9. *T. ruralis*, caule ramoso; foliis obovatis obtusis apice piliferis reflexis; capsulâ cylindraceâ; operculo conico. DILL. t. 45. f. 12.

*Barbula ruralis*. H.

*Bryum rurale*. L.

— in tectis et arboribus.

Cæspitosè, pulvini in formam nascitur: caules unguiculares, pollicares, et ultra, erecti; folia conferta, reflexo-patula, summa stellatim expansa, lætè viridia, infima ferè nigricantia, omnia carinata, margine inflexa, nervo valido, nigricante, apice in pilum longum, incanum, denticulatum desinente, instructa, siccitate lurida et inflexa; pedicelli, e surculis annotinis orti, sub-unguiculares, maturi atro-rufi; capsulae coloris ejusdem, longæ, graciles, erectæ; operculum capsulae longitudine, leviter curvatum, acutum, rubrum.—*B. ericetorum*, Dicks. species huic proxima, foliis tenuioribus, non piliferis, siccitate contortis, primo visu differt.

10. *T. muralis*, caule brevissimo sub-diviso foliis

oblongo-spatulatis obtusis piliferis patulis; capsulâ cylindraceâ; operculo conico. DILL. t. 45. f. 14.

*Bryum murale*. L.

— in muris.

Cæspitibus densis, pulvini in formam congestis, nascitur: caules vix sesquilineares, plerumque divisi; folia conferta, carinata, obtusiuscula, nervo crasso, nigricante, in pilum incanum, integrimum, folia longitudine sub-æquantem, desinente, prædicta, madore patula, saturatè viridia, siccitate sub-tortilia, lurida; pedicelli purpurascentes, unguiculares; capsulae atro-rufæ, erectæ; operculum acuminatum, obliquum.—Caulè abbreviato, foliorum margine vix infexo, piloque integrissimo hæc species a præcedente dignoscitur.

11. *T. cuneifolia*, caule brevissimo sub-diviso; foliis oblongo-spatulatis obtusis apiculatis patulis; capsulâ cylindraceâ; operculo conico. DILL. t. 45. f. 15. *Tortula acuminata*. BRID.

*Bryum cuneifolium*. DICKS.

— in aggeribus.

“Ab ultimâ specie,” ut Dillenii verbis utar, “cujus formam habet, differt foliis paullò brevioribus, et latioribus, mollioribus, pellucidis, et “non pilosis.”—Hæc sine sufficient?—dubito quidem, præsertim cum folia infima in pilum, br-

vissimum quidem, desinunt. Nihilominus cùm varietas sit saltem valdè singularis, Dillenii Dicksonique exemplum sequi tutissimum judicavi. Folia oculo armato pulchrè reticulata videntur cl. Smithius, sed idem et in *T. murali*, præsentim si exemplar diu desiccatum rursus humectetur, observari potest.

12. *T. tortuosa*, caule ramoso; foliis subulatis patulis siccitate tortilibus; capsulâ cylindraceâ; operculo conico. DILL. t. 48. f. 40.

*Bryum tortuosum*. L.

— in rupibus.

Caules bipolligares, et ultra, divisi, densè cæspitosi; folia lutescentia, conferta, carinata, margine undulata, e basi aliquantum dilatata subulata, nervo crasso, pallidiore instructa, siccitate valdè crispa; pedicelli pollicares, lutescentes; capsulae graciles, erectæ, vel aliquantum incurvæ, operculo duplo longiores.—Habitu et colore steriles hujus musci cæspites *Bartramiam pomiformem* in loco natali ita simulant, ut facile prätermittantur.

### 13. DICRANUM.\* SCHREB. Gen. Pl. n.

1644. HEDW. Fund. II. p. 91. t. 8.

f. 41, 42. *Fissidens*. Ibid.

*Caps.* ovato-oblonga. *Perist.* simplex, dentibus sedecim, latiusculis, inflexis, bifidis.

§ *Foliis compressis, distichis.*

1. *D. bryoides*, caule simplice; foliis oblongo-lanceolatis apiculatis; pedicello terminali; capsulâ erectâ; operculo rostrato. St. cr. III. t. 29. Musc. Suec. t. 2. f. 3. E. B. IX. t. 625. DILL. t. 34. f. 1.

*Dicranum viridulum*. Swartz.

*Fissidens bryoides*. H.

*Hypnum bryoides*. L.

— in sepiibus.

*P. minus*; sub-acaule; foliis paucis approximatis. Sp. Musc. t. 38. f. 7.—10. DICKS. t. 1. f. 5. (male.)

\* *FISSIDENTES* Hedwigii, quibus folia compressa, disticha, eodem more, quo *ANICTANGIA* a *GYNOSTOMIS*, *PTEROGONIA* a *GRIMMIIS* et *TRICHOSTOMIS*, *HYPNA* a *BRYIS*, natura disjuncti mihi videntur; eosque in systemate quoque separare perquam vellem, nisi flores plurimorum faminei terminales ut *DICRANIS* associarem cogereat;

*Fissidens exilis.* H.

*Bryum viridulum.* Dicks.

— *paucifolium.* With.

— in argillosis.

Planta magnitudinis perquam incertæ; caule ascendentē, nunc brevi, vix bilineari, nunc ferè pollicari; folia remotiuscula, nervo tenui, obscurō brevitè apiculata, disticha, horizontalia, apice sub-recurva, pallidè viridia, sub-decurrentia; capsula glaberrima, erecta, rariū inclinata; operculum capsulæ ferè longitudine, tenue, acutum, pulchrè rubrum.—Var.  $\beta$  ubique minor, caule brevissimo, foliis paucis, minus ordinatè distichis speciem distinctam simulat, sed cùm hanc in  $\alpha$  transire, non modo cl. \* Swartzii, sed et propriis quoque observationibus edoceor, fieri nequit quin utramque jungam.—Ab hac specie *Fissidens palmatus*, H. foliis lanceolatis acuminatis, capsulâque arcuatâ, pendulâ differt.

2. *D. tamarindifolium*, caule simplice; foliis oblongo-ovatis apiculatis; pedicello terminali; capsulâ cernuâ; operculo conico.

— in nemorosis.

Hanc stirpem primus in Florâ Britannicâ, nondum vulgatâ, descripsit cl. Smithius, cuius auctoritati obtemperans pro distinctâ specie sisto. Crescendi modo, colore, habituque cum *D. bryoides* convenit, sed caules vix sesquilineares, folia aliquantûm breviora, et latiora, arctiùs imbricata, pedicelli sub-trilineares, operculum ad amussim conicum.—A *Fissidente palmato*, H. inter quem et *D. bryoidem* locum quasi medium occupat, foliis latioribus, apiculatis nec acuminatis, capsulâ neutiquam arcuatâ, et operculi formâ affatim distinguitur.—Primus hanc speciem in Scotiâ detexit G. Don, mox prope Eblanam, in loco *Cullen's Wood* dicto, legit D. Stokes.

3. *D. osmundioides*, caule simplice; foliis oblongis obtusiusculis; pedicello terminali; capsulâ erectâ; operculo rostrato. Sp. Musc. t. 40. f. 7.—11. Dicks. t. 5. f. 5. Musc. Succ. t. 2. f. 4. Dill. t. 34. f. 4?

*Dicranum bryoides.* Swartz.

*Fissidens osmundioides.* H.

\* In hac plantula cum *D. Bryoide* conjugenda Dicksoni, Smithii, ipsiusque Hedwigii sententiae repugno, quare Swartzii in diario Schraderiano observationes referre opera pretium videtur. "Ob-  
" servavi plantas in subaquosis argillosis crescentes exilissimas, caule  
" foliisque vix discernibiliibus; eodem vero proximo loco parum sicciori  
" magisve umbroso, caules elongantur foliisque distinctiora evadunt, &  
" ipsius *Fissid. Bryoidis*, Hedw."

*Hypnum asplenoides.* Dicks.

— *acacioides.* L.?

— in alpinis:

Caules unguiculares, et ultra, erecti, cæspitosi; folia bifaria, patentia, imbricata, pallidè fusco-viridia, complicato-concava, apice sub-rotundata, interdum, teste Hedwigio, apiculata, nervo con-colore; pedicelli terpineales, bi-trilineares, atro-rufi; capsulæ oblongæ, erectæ, læves, pedicellis concolores; operculum capsulâ brevius, rectiusculum. — Linnæi synonymon dubitantè protuli, ne alias fortè in errorem inducerem, sed exemplaria Dilleniana Oxoniæ observanti eadem omnino cum nostris visa sunt.—*H. asplenoides*, Swartzii, plantam huic proximam, sed caule longiore, subdiviso, foliis angustis, linearibus, remotiusculis distinctam, perperam pro synonymo adduxit Dicksonus.

4. *D. taxifolium*, caule simplice; foliis oblongo-lanceolatis; pedicello sub-radicali; capsulâ cernuâ; operculo rostrato. Sp. Musc. t. 39. f. 1—5. DILL. t. 84. f. 2. E. B. VI. t. 426.

*Fissidens taxifolius.* H.

*Hypnum taxifolium.* L.

— in sepibus,

Pedicelli surculorum prope basin orti hanc speciem a congeneribus Britannicis distinguunt. Caules simplices, erecti, a trilineari ad unguicularem longitudinem variant; folia saturatè viridia, arctè imbricata, patula, acutiuscula, nervo obscuro prædicta; pedicelli caules paullùm superant, atro-rufi; capsulæ oblongæ, sub-arcuatæ, cernuæ; operculum capsulam sub-æquans, tenue.—*Fissidens sub-basilaris*, H. quocum uno pedicellorum situ congruit, staturâ duplò minore, capsulisque erectis, rufo-fuscis differt.

5. *D. adiantoides*, caule ramoso; foliis ovato-lanceolatis; pedicello mediâ tenus plantâ axillari, capsulâ cernuâ; operculo rostrato. St. cr. III. t. 26. DILL. t. 84. f. 3. E. B. IV. t. 264.

*Fissidens adiantoides.* H.

*Hypnum adiantoides.* L.

— in paludibus.

Caules erecti, bipollicares, plerumque bis, ter divisi; folia fusco-viridia, approximata, patula, latè lanceolata, acutiuscula, nervo obscuro percursa; pedicelli, surculorum prope medium orti, pollicares, erecti; capsulæ juniores inclinatae, mox cernuæ, oblongo-ovatæ, atro-rufæ, læves; operculum longum, tenue, acutum.—A præcedentibus omnibus, staturâ ubique plus duplò majore, et a F. *poly-podioides*, H. cui proximum, foliis latioribus, magis

acutis, pedicellis longioribus, capsulisque neutri-  
quam turbinatis differt.—Variat foliis remotius-  
culis.

§ § *Foliis subsecundis.*

6. D. *scoparium*, caule ramoso erecto ; foliis lanceolato-  
subulatis erecto-patulis ; pedicellis sub-solitariis ;  
capsulâ obliquâ ; operculo subulato. E. B. V. t.  
354. DILL. t. 46. f. 16. A, B.

*Bryum scoparium*. L.

— in sylvis.

Caules cæspitosi, circiter bipollicares, plerumque divisi, infernè tomento denso, ferrugineo tecti ; folia sparsa, subsecunda, summa approximata, erecta, infima patentia, remotiuscula, interdum lenitè falcata, omnia apices versus sub lente obsoletè serrulata, concavo-complicata, nervo lato concolore prædicta, luteo-viridia, siccitate stricta, neutriquam undulata, perichætialia lata, oblonga, enervia, longè aristata, tenerrima, circa pedicelli basin convoluta ; pedicelli, e ramis annotinis orti, plerumque solitarii, rarò gemelli, flavicantes, bipollicares ; capsulæ erectæ, vel aliquantillùm obliquatæ, oblongo-cylindraceæ, fuscæ ; operculum capsulæ longitudine, obliquum, tenué.

- † 7. D. *majus*, caule ramoso erecto-recurvo ; foliis lanceolato-subulatis falcatis ; pedicellis aggregatis ;

capsulâ obliquâ ; operculo subulato. T. 4. DILL.  
t. 46. f. 16. D.

— in rupibus.

Caules ramosi, erecti, sub-recutvi, palmates, et ultra ; folia e basi lanceolatâ, longè acuminata, longitudinaliter complicata, apices versus serrata, secunda, falcata, approximata, rigidiuscula, nervo usque ad apicem percurrente instructa, madore pallidè, sed lætè viridia, siccitate fuscescentia, perichætialia circa pedicelli basin convoluta, lata, oblonga, rotundata, obsolete uninervia, aristâ longâ, minutè serrulatâ terminata ; pedicelli bini, vel terni, raro solitarii, laterales, terminalesque ; capsulae oblongo-cylindraceæ, juniores virides, obliquæ, adultiores dilutè fuscæ, arcuatæ ; operculum capsulae ferè longitudine, subulatum, obliquum ; calyptre subulata, capsulam totam operiens, lateraliter fissilis.—A D. *scopario* et *undulato*, quibuscum hæc species hactenùs fuit commixta, staturâ majore, foliis omnibus secundis, falcatis, per totam longitudinem complicatis insigniter differt. Folia quoque siccitate nunquam undulata, ad apices magis quam in illis attenuata.—Exemplar apud Bantry lectum misit D. Stokes.

- \*8. D. *undulatum*, caule erecto ramoso ; foliis lanceolatis serratis undulatis ; pedicellis aggregatis ; operculo

subulato. DILL. t. 46. f. 16. c. (ex herb.) Musc.  
Suec. t. 3. f. 5.

*D. polysetum*. Swartz.

— in montosis,

Crescendi modo, staturâ, et habitu cum *D. scopario* convenit, sed folia conferta, multo minus secunda, imo sub-squarrosa, lanceolata, planiuscula, laetiùs viridia, nervo nigricante percursa, siccitate undulata, perichaetalia ovata, acuminata, nec aristata distinguunt. Capsula quoque magis arcuata, aliquantum latior.

9. *D. fuscocens*, caule erecto ramoso; foliis subulatis falcatis; pedicellis solitariis; capsula cernuâ; operculo subulato. T. 5. f. 1.

Caules sesquiunguiculares, plerumque divisi, densè cæspitosi; folia fuscescentia, conferta, longa, integerrima, nervo lato, concolor, valde obsoleto complicato-concava, siccitate nequaquam undulata, et rarò apice tortilia, perichaetalia angusta, lanceolata, longè aristata, enervia, pedicello arctè appressa, sed neutiquam convoluta; pedicelli solitarii, erecti, unguiculares, lutei; capsule obovatæ, cernuæ, maturitate arcuatæ, fuscæ; operculum, secundum exemplaria a Schradero missa, subulatum, capsulam longitudine subæquans.—Primus hanc speciem prope Edinam detexit D. Smithius, mox in rupibus circa La-

cum, Lough Bray dictum, legit D. Stokes.—  
Inter *D. scoparium* et *flagellare* est quasi media; ab hoc, colore fuscescente, capsula cernuâ, foliisque siccitate non tortilibus, ab illo, foliis integrerimis, perichaetialibus lanceolatis, et staturâ minore dignoscitur.

10. *D. flagellare*, caule erecto sub-ramoso; foliis lanceolato-subulatis sub-enervibus; capsula cylindraceâ erectâ; operculo subulato incurvo. St. cr. III. t. 1.

*Bryum flagellare*. Dicks.

— in rupibus.

Caules cæspitosi; foliâ approximata, secunda, plus minus falcata, nervo concolore, obsoletissimo percurso, siccitate sub-tortilia, infima fusco-ferruginea, summa flavidantia, nitida, perichaetalia intima lata, albicantia, tenerrima, oblonga, longè aristata, enervia, circa pedicellum convoluta; pedicelli unguiculares, flavi; capsule maturitate rutilantes; operculum capsule circiter longitudine, tenue, leniter arcuatum.—A præcedentibus, foliorum colore et nitore primo visu dignoscitur, et a *D. interrupto*, quocum conjungendum censem Bridelius, eadem notâ, capsulaque erectâ differt.

11. *D. heteromallum*, caule simpliciusculo; foliis secundis falcatis capillaceis; capsula ovatâ cernuâ; operculo subulato incurvo. St. cr. I. t. 26. DILL. t. 47. f. 37.

*Bryum heteromallum.* L.

— in sepibus.

Caules flexuose erecti, nunc vix bilineares, nunc ferè pollicares, plerumque simplices; folia lutescentia, nitida, e basi dilatata, vaginante, capillacea, longa, rigidiuscula, omnia secunda, falcata, nervo lato concolore prædicta; pedicelli pollicares e surculis annotinis oriuntur; capsulae cernuæ, maturæ glabræ, spadiceæ, siccitate sulcatæ; operculum capsulae ferè longitudine, incurvum, tenuæ.—D. *interrupto* affine, sed staturâ minore, foliis nec interruptè fasciculatis nec siccitate tortilibus discrepat.

\* 12. D. *rigidulum*, caule simple; foliis lanceolatis acuminatis falcatis rigidiusculis; capsula ovata cernuæ; operculo conico. Sp. Musc. t. 32. f. 8.—12. Musc. Suec. t. 3. f. 7.

— in argillosis.

Caules cæspitosi, erecti, bi-trilineares; folia luteo-viridia, nervo lato concolore concavo-compli-  
cata, in surculis junioribus longa, secunda, falcata, in annotinis breviora, sub-secunda, erecto-patula;  
pedicelli e surculis annotinis orti, seriores sub-  
æquant, erecti, pallidè rubri; capsulae ovatae,  
cernuæ, fusco-rubrae; operculum conicum, acutum—Prope Eblanam legerunt D. Scott et D.  
Stokes; prope Belfast D. Templeton.—D. *varis*

esse affine, sed distinctissimum surculis senioribus longis, foliisque illorum secundis, rectè observavit cl. Swartzius.

13. D. *callistomum*, caule simple abbreviato; foliis lanceolatis acuminatis confertis erecto-patulis; capsula cernuæ; operculo conico. Dicks. t. 7. f. 10.

*Bryum callistomum.* Dicks. — in rupibus.

Caules brevissimi, vix lineares, cæspitosi, simplices; folia conferta, longè acuminata, flavescenti-viridia, sub-secunda, nervo concolore carinata; pedicelli terminales, unguiculares; capsulae fuscæ, breves, ovatae, vel ovato-urceolatae, cernuæ; operculum, teste Dicksono, conicum.—Hanc stirpem tantummodo præcedentis esse varietatem, surculis senioribus destitutam, contendit cl. Swartzius, quod, cum neutram in loco natali viderim, aliis dijudicandum relinquo.—Foliorum forma in Dicksoni iconে latior quam in D. *rigidulo*, sed nec descriptio, nec exemplar, quod ab ipso accepi, ad hanc formam quadrat.—Fierine potest ut sit varietas a loco natali, rupestri, elatiore pendens?

\* 14. D. *subulatum*, caule simple, foliis basi dilatatis, setaceis erecto-patulis; capsula ovata cernuæ; operculo subulato. Sp. musc. t. 34. f. 1—5.

— in humidis.

*Caules gregarii, bilineares, erecti, stricti, simplices; folia luteo, vel saturatè viridia, basi multùm dilatata, amplexicaulia, mox setacea, uninervia, infima sub-secunda, lenitè curvata, summa erecto-patula; pedicelli ferè pollicares, fusi, erecti; capsulæ ovatæ, juniores luteolæ, maturæ spadiceæ, siccitate sulcatae; operculum capsulæ longius, acutissimum.—D. heteromallo affine, sed foliis brevioribus, nequaquam falcatis, et staturâ tenuiore dignoscendum. Ex Hibernâ misserunt D. Stokes et Templeton.*

15. *D. cerviculatum*, caule brevissimo simplice; foliis subulatis erecto-patulis enervibus; capsulâ cernuâ strumiferâ; operculo subulato. St. cr. III. t. 37. A.

*Bryum cerviculatum*. Dicks.

— in arenosis.

*Caules brevissimi, vix lineares, cæspitosi; folia lutescentia, nitida, e basi dilatata, amplexicauli, lanceolato-subulata, prorsùs enervia, erecto-patula, nunc sub-secunda, nunc undique patentia; pedicelli terminales, pallidi, erecti; capsule latè ovatae, sub-globosæ, basi apophysi exiguae, concolore donatae, maturæ rufæ, siccitate striatae; operculum longè rostratum, incurvum.—D. heteromalli varietatem primo visu simulat; sed staturâ duplò minore, foliis ener-*

vibus, capsulisque strumiferis satis superque differt.

16. *D. crispum*, caule simplice brevissimo; foliis vaginantibus capillaceis sub-distichis enervibus; capsulâ erectâ; operculo subulato. St. cr. II. t. 33. E. B. XVI. t. 115<sup>1</sup>.

*Bryum vaginale*. Dicks.

— in humidis arenosis.

*Caules cæspitosi, flexuosè erecti, vix lineares; folia lutescentia, basi lata, insignitè vaginantia, capillacea, sub-disticha, horizontaliter patentia, summa sub-secundâ, madore flexuosa, siccitate mirè crispa et contorta; pedicelli terminales, pollicares, erecti; capsulæ ovatae, fuscae, semper erectæ, siccitate striatae; operculum longè rostratum, rectum.*

17. *D. varium*, caule sub-simplice; foliis lanceolatis uninervibus patulis; capsulâ sub-cernuâ; operculo conico-rostrato incurvo. St. cr. II. t. 34. DILL. t. 50. f. 59. E. B. XVII. t. 1215.

*Bryum simplex*. L.

*E. gracile*; caule tenuiore; capsulis falcatis.

— in argillosis.

*Caules cæspitosi, bi-trilineares, interdum unguiculares, ut plurimùm simplices, erectiusculi; folia latè viridia, vel rubore aspersa, lanceolata, remotiuscula, nervo pallido, obsoleto lenitè cari-*

nata, directione perquam varia, sed infima plerumque sub-disticha, summa secunda, paullulūm arcuata, interdum omnia erecto-patula, siccitate nitida, neutiquam tortilia, sub lente pulcherrimè reticulata; pedicelli e surculis senioribus annotinisque orti, erecti, trilineares, rufo-fusci; capsulæ obovatæ, fusco-rutilantes, læves, modò erectæ, modò cernuæ; operculum plerumque conicum, interdum rostro brevi incurvo variat.—Var.  $\beta$ . in arenosis a D. Templeton lecta, caule gracili, foliis longioribus, acutioribus, capsulâ arcuatâ, operculoque capsulam sub-aquante, novam speciem simulat, et est forsitan distincta, sed, de stirpe tam variabili, non nisi cautissimè est agendum.

18. D. *rufescens*, caule simplice; foliis lanceolatis uninervibus sub-secundis remotis; capsulâ obovatâ erectâ; operculo conico sub-incurvo. DICKS. t. 8. f. 1. E. B. XVII. t. 1216.

*Bryum rufescens*. DICKS.

— in argillosis.

Præcedenti tam simile, ut annon potius pro varietate, quam distinctâ specie, annumerari debet, legitimè dubitari potest. Crescendi modo et foliorum formâ et dispositione prorsus congruunt, sed color in D. *rufescente* magis fuscescens, statura plerumque gracilior, caulis simplex, capsula erecta, folia sub lente tam mirè vasculosa, ut cl. Dick-

sonum, qui serrata dixit, fallerent. Fructûs forma utriusque eadem.

19. D. *aciculare*, caule ramoso; foliis oblongo-lanceolatis obtusis sub-falcatis; capsulâ ellipticâ erectâ; operculo subulato recto. St. cr. III. t. 33. DILL. t. 46. f. 25.

*Bryum aciculare*. L.

$\beta$ . *fluitans*; foliis laxis ovato-lanceolatis nigro-viridibus; calyptris nigris.

$\gamma$ . *gracile*; caule palmari; foliis linear-lanceolatis acutiusculis erecto-patulis.

$\delta$ . *pumilum*; caule trilineari; foliis nigricantibus.

— in saxis ad rivulos.

Caules cæspitosi, pollicares, interdum palmares, erecti, iterum atque iterum divisi, basi plerumque denudati; folia latè viridia, undique arcè imbricata, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, margine inflexa, integerrima, nervo obscuro concavo-carinata, apice falcata, sub-secunda; pedicelli *laterales*, unguiculares, fusci; capsulæ ellipticæ, seu elliptico-ovatæ, semper erectæ, fuscae, læves; operculum pallidum, basi rubrum, capsulæ ferè longitudinè, acutissimum; calyptre conica, acuminata, basi lacera.—Var.  $\beta$ , quam pro diversâ specie habuerunt Dillenius Brideliusque, caule fluitante foliorumque formâ et colore insigniter differt.— $\gamma$ , quam in comitatûs Wicklow montibus legi, foliis luteo-viridibus, erecto-patulis, acutis, neutiquam

falcatis, et habitu tenuiore distinctam speciem  
mentitur; et δ, quam, prope *Derry*, D. Brown  
legit, staturā pumilā longè a cæteris recedit.—Pe-  
ristomii dentes in hâc specie longi et tenues, unde  
inter *Dicrana* et *Trichostoma* ambigere ferè vi-  
detur.

¶¶¶ *Foliis directione æquali.*

20. *D. pellucidum*, caule sub-diviso; foliis lan-  
ceolatis carinatis patentibus; capsulâ ovatâ erec-  
tiusculâ; operculo conico incurvo. *DILL.* t. 46.  
f. 23.

*Dicranum aquaticum*. Ehr.

*Bryum pellucidum*. L.

— in humidis.

Caules cæspitosi, erecti, pollicares, et ultra,  
plerumque divisi; folia lætè viridia, pellucida,  
remotiuscula, basi vaginantia, madore horizonta-  
litè patentia, vel sub-reflexa, siccitate incurva,  
sub-tortilia, nervo valido complicato-carinata, mar-  
gine leniter undulata, minutissimè serrulata; pe-  
dicelli pollicares, laterales, erecti, pallidè fuscæ;  
capsulæ lævissimæ, nunquam striatæ, fuscæ,  
ovatæ, vel ovato-globosæ, erectiusculæ, maturitate  
apophysi exiguâ donatæ; operculum capsulâ du-  
plò brevius, obscurè rubens.—A præcedente,  
quocum habitu quodammodo convenit, capsulæ  
et operculi formâ statim dignoscitur,

21. *D. virens*, caule sub-diviso; foliis linear-lanceola-  
tis acuminatis carinatis reflexo-patulis; capsulâ  
oblongo-ovatâ cernuâ; operculo rostrato. *St. cr.*  
*III. t. 32.*  
— in argillosis madidis.

Staturâ, habitu, et crescendi modo cum præce-  
dente convenit. Folia dilutè viridia, e basi dilatata  
vaginante, longa, angusta, nervo concolore com-  
plicato-carinata, acuminata, margine undulata, ser-  
rata, madore reflexo-patula, apice sub-tortilia, sic-  
citate crispa, neutiquam appressa, vel incurva;  
pedicelli ut in *D. pellucido*; capsulæ oblongo-  
ovatæ, semper cernuæ, sub-falcatæ, fuscæ, læves,  
apophysi exiguâ, non nisi in vetustis conspi-  
ciendâ, instructæ; operculum capsulâ paullò bre-  
vius, incurvum, obtusiusculum.—Primus hanc  
stirpem, foliorum formâ a præcedente, cui per-  
quam affinis, primo visu distinguendam, in Sue-  
ciâ detexit D. Swartzius. Ex Hiberniâ, ubi a  
*D. Drummond* in sepibus argillosis irriguis, pro-  
pe fluvium *Larne*, est lecta, communicavit D.  
Templeton.

22. *D. squarrosum*, caule sub-simplice; foliis ovatis  
acuminatis carinatis reflexo-patulis; capsulâ ovatâ  
erectiusculâ; operculo conico. *DILL.* t. 46. f. 24.  
*Bryum palustre*. *Dicks.*

— *pellucidum*. *B. L.*

— in paludosis alpinis.

Caules cæspitosi, erecti, sesquipollicares, plerumque simplices; folia flavescenti-viridia, squarrosa, remotiuscula, basi vaginantia, latè ovata, mox attenuata, nervo obsoleto, concolore complicato-carinata, margine integerrima, sub lente reticulata, semper, vel siccitate, reflexa; pedicellus, capsula, et operculum cum penultimâ specie convenient, excepto quòd apophysis nullum unquam vestigium vidi.— Nomen, quod cl. Schraderus, in diario (V. p. 68.) huic stirpi indidit, servavi.— In Hiberniâ septentrionali esse a D. Brown lectam nuperrimè me per literas certiorem fecit am. Scott, sed exemplaria Hibernica nondum accepi.

23. *D. flavesens*, caule simpliciusculo; foliis linearilanceolatis acuminatis carinatis reflexo-patulis; capsulâ cylindraceâ erectâ; operculo rostrato. Dicks. t. 4. f. 5.

*Bryum flavesens*. Dicks.

— in saxis irriguis.

Caules erecti, cæspitosi, plerumque simplices, bipollicares; folia remotiuscula, vaginantia, saturatè viridia, apice ut plurimum flavescentia, nervo valido, obscuro complicato-carinata, madore reflexo-patula, siccitate flexuosa, margine revoluta, integerrima; pedicelli laterales, unguiculares, aurantiaci; capsulæ longæ, cylindraceæ, læves, erectæ, vel aliquantillùm obliquatæ, fuscae; opercu-

lum capsulâ plus duplò brevius, convexum, rostro brevi, tenui, acuto, incurvo.— Capsulæ forma et directio hanc speciem satis a congenibus distinguunt.

24. *D. viridissimum*, caule ramoso; foliis oblongolanceolatis confertis reflexo-patulis; capsulâ oblongo-ovatâ erectâ; operculo brevissimè rostrato. Dicks. t. 10. f. 18.

— in arborum truncis.

Caules cæspitosi, vix unguiculares, in ramos aliquot breves, sub-fastigiatos divisi; folia confertissima, lætissimè viridia, plana, nervo valido obscuro percursa, acuta, madore patula, apice reflexa, siccitate erecta, appressa, summa stellatim expansa; pedicelli, e surculis annotinis orti, vix unguiculares; capsulæ erectæ, principio ovatæ, mox oblongæ, fuscae, siccitate sulcatæ; operculum, teste Dicksono, brevissimè rostratum. Peristomium non vidi, unde an verè sit *Dicranum dubitato*; *Weissii* habitu quoque accedit.

25. *D. Celsii*, caule brevissimo sub-diviso; foliis oblongo-lanceolatis erecto-patulis; capsulâ cylindraceâ erectiusculâ; operculo conico. Sp. Musc. t. 33. f. 1.—4. Dill. t. 49. f. 54.

*Bryum Celsii*. L.

— in rupibus.

Caules cæspitosi, vix lineares; folia conferta, oblongo-lanceolata, acuta, rigidiuscula, nunc dilutè, nunc nigro viridia, nervo nigricante carinata, siccitate setacea; pedicelli ferè pollicares, purpurascentes; capsulæ maturitate obliquæ, striatæ, atro-purpureæ; operculum breve, conicum; peristomii dentes lutei.—Folia interdum ita corrosa occurunt, ut nervus tantùm restet.

26. D. *purpureum*, caule sub-dichotomo; foliis lanceolatis acuminatis erecto-patulis carinatis; capsulâ cylindraceâ obliquâ; operculo conico. Sp. Musc. t. 36. DILL. t. 49. f. 51.

*Mnium purpureum*. L.

β. *tenue*; caule elongato gracili; foliis remotiusculis. DILL. t. 40. f. 49?

*Bryum tenue*. DICKS.

γ. *bipartitum*; pedicellis sub-geminis; capsulis ovato-oblongis. DILL. t. 49. f. 50.

*Bryum bipartitum*. DICKS.

— in siccis.

Caules cæspitosi, erecti, a trilineari, ad ferè pollicarem altitudinem variant; folia amœnè viridia, laxiusculè imbricata, erecto-patula, acuta, nervo crasso complicato-carinata, siccitate erecta, sub-incurva; pedicelli, e surculis annotinis orti, non raro gemini, laterales, unguiculares,

splendidè purpurei; capsulæ cylindraceæ, vel oblongo-cylindraceæ, principio erectæ, dilutè virides, mox obliquatæ, atro-rufæ, siccitate sulcatæ, basis, optimè monente am. Smithio, apophysi exiguâ, ut tetragona fere videatur, donata; operculum breve, conicum, obtusiusculum, apice raro curvulum.—Var. β non, nisi surculis gracilibus, foliisque remotioribus, differre mihi videtur, sed an hujus quoque sit loci DILL. t. 48. f. 49. (*Dicranum laxum*, Brid.) cui operculum capsulæ longitudine, aristatum tribuit, legitimè dubitari potest.—γ, caule breviore, crassiore, foliis aliquantum latioribus, et capsulâ incrassatâ, speciem distinctam simulat, et huc, ni fallor, D. *purpurascens*, H. referri debet.—Summoperè polymorpha est hæc species, sed pedicellis nitidis, et operculi formâ semper ferè dignoscenda.—Ut verè discrepet *Bryum strictum*, DICKS. (*D. palustre*, Brid.) cui statura bipollucaris et ultra, folia angustiora, multum equidem timeo.

27. D. *glaucum*, caule ramoso; foliis confertis lanceolatis enervibus rectis; capsulâ cernuâ; operculo subulato curvulo. DILL. t. 46. f. 20.

*Bryum glaucum*. L.

— in humidis.

Caules cæspitosi, palmates, et ultra, supernè ramosi, fragillimi, pennâ olorinâ crassiores, foliis

albido-glaucis, concavis, erecto-patulis, densisimè imbricatis, sub lente reticulatis, vestiti; pedicelli sub pollicares; capsulae oblongæ, falcatæ, siccitate striatae, maturæ atro-fuscae; operculum capsulae ferè longitudine, acutissimum. Foliorum colore et texturâ hæc species *Sphagnum* simulat.

28. *D. flexuosum*, caule simpliciusculo; foliis subulatis enervibus; pedunculo flexuoso; capsula elliptica erecta; operculo cuspidato. Sp. musc. t. 38. f. 1—5. DILL. t. 47. f. 33. A.—E.

*Bryum flexuosum*. L.

- E. fragile*; sub-acaule; foliis sub-secundis. DILL. t. 47. f. 33. F. G.

*Bryum fragile*. DICKS.

- γ. piliferum*; foliis nigro-viridibus, apice piliferis. T. 5. f. 2. DILL. t. 32. f. 3.

*Sphagnum alpinum*. L.

- δ. elongatum*, caule palmari; foliis summis sub-secundis.

Caulis cæspitosi, erecti, bipollicares, plerumque simplices; folia undique imbricata, flavescenti-viridia, e basi aliquantum dilatata, subulata, longa, concaviuscula, prorsus enervia, erecto-patula, interdum subsecunda, siccitate striatae; operculum cap-

sulâ brevius, tenue, acutum; calyptra lateraliter fissilis, basi, sub lente, pulchrè fimbriata.—Var.  $\beta$ , caule brevissimo, fragillimo, distincta videtur, sed a loco natali siccior pendere crederem.— $\gamma$ , quam in madidis Cambriæ montibus copiosissimè legi, et quam in Hiberniâ septentrionali capsulis instructam tandem detexit D. Templeton, caules habet bi-trunciales, non minus quam in  $\beta$  fragiles, et folia nigro-viridia, nitidissima, pilo incano denticulato terminata; cæspitibus densissimis nascitur. *Bryum immersum*, DICKS. specie ab hâc discrepat, et *Weissii* forte annumerari debet.— $\delta$ , ob miram similitudinem cum *D. introflexo*, H. (Sp. Musc. t. 29. f. 1—7) a quo non, nisi foliis apice pilifero desitutis, quoad iconem differre videtur, pro varietate distinctâ descripsi: caules proceriores quam in  $\alpha$ , et folia summa longiora, et vel siccitate flexuosa sub-secunda.—Steriles hujus musci cæspites, quorum caules sub-pollicares, folia densissimè conferta, summa in bulbillum quasi congesta, misit D. Scott.

- + 29. *D. Scottianum*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis uninervibus; pedicello erectiusculo; capsula oblongâ cernuâ; operculo cuspidato. T. 6. f. 1.  
— in saxis.

Caulis cæspitosi, pollicares, crassi, erecti; folia conferta, undique dense imbricata, erecto-patula, stricta, nervo valido lenitè carinata, basi

lanceolata, longè acuminata, siccitate paullum incurvata, summa tantum dilutè viridia, cætera nigricantia, lurida; pedicelli terminales, sub-pollicares, erecti, vel arcuati; capsulae oblongo-cylindraceæ, cernuae, siccitate sulcatæ; operculum capsulae ferè longitudine, tenui, acutum.—Primus hanc speciem in saxis prope Swanlinbar detexit D. Scott, cuius nomen imposui.—A præcedente, cui maximè affinis, foliis uninervibus, capsularumque formâ statim dignosci potest.

- + 30. D. *ellipticum*, caule simpliciusculo; foliis linear-lanceolatis erecto-patulis; pedicello erecto; capsula ellipticâ; operculo cuspidato recto. T. 6. f. 2.

— in saxis.

Caules cæspitosi, erecti, vix unguiculares, simplices, vel juxta apices divisi; folia undique densè imbricata, lineari-lanceolata, obtusiuscula, margine leniter involuta, sub-concava, nervo lato concolore percursa, madore erecto-patentia, siccitate incurva, summa lutescentia, cætera nigra; pedicelli terminales, bilineares, folia aliquantum superantes, erecti, juniores pallidè fusi, maturi nigricantes, tortiles; capsulae ellipticæ, lèvissimæ, pedicellis concolores, effætæ ad basin sub-strumiferæ; operculum subulatum, gracile, acutissimum, capsula brevius, nigrescens; peristomii dentes breves, inflexi, leviter bifidi,

fusci; calyptram non vidi.—A D. *ovali*, quocum uno inter species Britannicas commisceri potest, saturâ multo minore, foliisque apice nunquam incanis, satis discrepat.—Hanc speciem in summis Montis Bulbein jugis detexit D. Brown, mihiq[ue] benevolè communicavit D. Templeton. Prope Snowdoni cacumen in mense Julio, A. D. 1802, abundè legi.—Huc, nisi fallor, Dille-nii t. 47. f. 29. *varietas atra*, referri debet.

31. D. *ovale*, caule ramoso; foliis lanceolato-subulatis apice incanis; capsula sub-ellipticâ erectâ; operculo cuspidato recto. St. cr. III. t. 34.

D. *ovatum*. Swartz.

*Bryum ovale*. Dicks.

— in saxis.

Caules cæspitosi, sub-pollicares, apices versus divisi, folia infima saturatè, summa lètè viridia, omnia lanceolata, acuminata, concava, apice incana, sub-denticulata, nervo concolore instructa, madore patula, siccitate erecta; pedicelli terminales, vix bilineares, erecti, rutilantes, folia sub-æquantes; capsulae ellipticæ, vel ovato-ellipticæ, ob magnitudinem conspicuæ, dilutè fuscae, siccitate substriatae; operculum rubrum, capsula duplò brevius, obtusiusculum, raro tantulum curvatum.—*Trichos-tomum heterostichum*, et *Grimmiam cribrosam tan-*

tum refert hæc species, ut ne cum illorum varietibus commisceatur est cavendum.—Varietatem caule vix bilineari misit D. Templeton.

32. *D. pulvinatum*, caule ramoso ; foliis ovatis piliferis ; pedicello arcuato ; capsulâ ovatâ immersâ ; operculo cuspidato. Sp. Musc. t. 40. f. 1—3. DILL. t. 50. f. 65.

*Fissidens pulvinatus*. H.

*Bryum pulvinatum*. L.

$\beta$ . *argentatum* ; staturâ graciliore ; foliis dilutè viridibus, siccitate nitidis. T. 3. f. 1.

— in muris.

Caules unguiculares, erecti, densè cæspitosi, pulvini instar congesti ; folia densè imbricata, ovata, concava, patula, nervo concolore, in pilum canum, foliâ longitudine superantem producto, percursa, madore saturatè viridia, siccitate luri-  
da ; pedicelli vix trilineares, principio erecti, mox arcuati, inflexi, ut capsulæ, quæ ovatae, vel subrotundæ, fuscae, siccitate sulcatæ, foliis im-  
mergantur ; operculum cuspidatum, capsulâ plus duplo brevius, obtusiusculum, plerumque rectum.  
—Var  $\beta$ , in Eblanae muris a D. Scott, et in muris prope Powerscourt, a D. Stokes lecta, foliis capsulisque dilutè sed lætè viridibus, siccitate splendentibus, quasi argentatis, et staturâ quo-  
dammodo graciliore, faciem tam diversam induit,

ut iconे digna mihi videretur.—Hæc species, præcedenti arctè affinis, crescendi modo, pedicello arcuato, foliorumque formâ, primo visu est dignoscenda.

33. *D. latifolium*, caule brevissimo simplice ; foliis oblongo-ovatis piliferis concavis ; capsulâ cylindraceâ erectâ ; operculo rostrato. St. cr. I. t. 33. DICKS. t. 10. f. 14.

*Bryum piliferum*. DICKS.

*Swartzia pilifera*. BRID. (in Schrad. diario.)

— in aggeribus.

Caules cæspitosi, lineares ; folia conferta, stellatim expansa, dilutè viridia, nervo crasso, in apicem piliformem producto carinato-concava ; pedicelli pollicares, fusco-rubentes, erecti ; capsulæ cylindraceæ, vel cylindraceo-oblongæ, læves, semper erectæ ; operculum capsulæ ferè longitudine, rectum, obtusiusculum.—Folia lata pilifera hanc speciem satis a congeneribus distinguunt. Peristomii dentes pallidi tam profundè finduntur, ut annone rectius *Trichostomis*, quæ habitu magis refert, annumeretur, dubitare licet. Synonyma supra adducta, fide exemplarium e Lapponiâ missorum, a Dickson communicatorum, et in Herbario Linnæano servatorum, citavi.

14. POLYTRICHUM.\* SCHREB. Gen.  
Pl. n. 1660. HEDW. Fund. II. p. 90.  
t. 7. f. 37.

*Caps.* oblonga, vel quadrangula. *Perist.* simplex, dentibus triginta-duobus brevibus, incurvis, apicibus membrana plana connexis. *Calyptra* pilosa.

§ *Capsulis apophysi insidentibus.*

1. *P. commune*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis serrulatis recurvis; capsulâ oblongâ tetraedrâ; operculo umbonato. DILL. t. 54. f. 1. E. B. XVII. t. 1197.

— in cricetis et sylvis.

\* Plurimæ hujus generis species calyptra dupli gaudent, quod, primum a Leersio observatum, non ita multo post Curtisius quoque noster detexit, et pro characteris generici nota essentiali adhibuit. Idem etiam fecit amicissimus Menzies, qui, in Societatis Linnaeanæ actis, hoc genus admirabili monographia illustravit. Neutquam tamen hoc in omnibus speciebus valet, nam in *P. MAGELLANICO*, *HERCYNICO*, et *UNDULATO*, frustra queritur, et haæ species non, nisi ægerime, a reliquis divellerentur.---Genus *POLYTRICHUM* primus instituit Dillenius, et stirpes, e quibus constat, habitu formaque tam arcte inter se congruunt, et tantum a cæteris muscis discrepant, ut nihil sere naturæ magis conveniens in Systemate reperitur.

Caulium longitudo pro loci natalis humore diversissima, nunc vix pollicaris, nunc sesquipedalis, et ultra. Caules simplices, incrementis annuis proliferi, et quasi \*annulati, erecti; folia approximata, lætè, vel fulvo viridia, longa, e basi vaginante, membranaceâ, lanceolata, longè acuminata, margine argutè serrata, enervia, sub-concava, rigidiuscula, madore reflexa, siccitate erecta, apicibus tamen patentibus, perichaetalia membranacea, albiantia, integra, longissima, semper erecta, apice capillacea; pedicelli terminales, erecti, sub-palmares, purpurascentes, nitidi; capsulae erectæ, tetragonæ, rufescentes, maturitate cernuæ, apophysi exiguæ, subrotundæ insidentes; operculum convexum, medio in umberone longiusculum acutum assurgens, orâ pulchrè rubrâ; calyptra duplex, interior parva, membranacea, exterior conica, e pilis areis densissimè intertextis composita.

\* Idem, quod in hujus musci caulinis est observandum, *FUCI LUMBRICALIS* quoque annulos, de quibus Botanici tantum disseruerunt, haud dubie efficit: suruli scilicet seriores ex annotinorum medio orti, et in eadem linea progredientes, speciem annulatam ob gracilitatem necessarie præbent.---Confer "Synopsis of the British Fuci." p. 319.

2. *P. piliferum*, caule simplice; foliis lanceolatis integerrimis apice piliferis; capsulâ ovatâ tetrædrâ; operculo rostrato. DILL. t. 54. f. 3. E. B. XVII. t. 1199.

*P. commune. γ. L.*

— in ericetis.

Præcedenti simillimum, unde a Linnæo multisque aliis pro varietate, a loco natali siccior pendente, est habitum. Huic autem sententia ascribere nequeo. In plurimis quidem convenient, sed caules in *P. pilifero* semper abbreviati, basin versus longè nudi; tota planta vix bipollicaris; color nigricans; folia densè conferta, brevia, siccitate cauli appressa, margine integerrima, latiora, magis carnosa, apice pilo incano denticulato instructa; capsula brevior; apophysis matura atro-purpurea; operculum plerumque breve, rostratum, curvulum, interdùm, ut in exemplaribus a D. Templeton communicatis, capsulæ ferè longitudine, tenue, acuminatum, rectum.

3. *P. juniperinum*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis integerrimis recurvis; capsulâ oblongâ tetrædra; operculo umbonato. Sp. Musc. t. 18. f. 6—10. Act. Soc. Linn. IV. t. 6. f. 4. DILL. t. 54. f. 2. E. B. XVII. t. 1200.

*P. commune. β. L.*

— in ericetis.

Crescendi modo, colore, et foliorum fructusque formâ, hæc species penultimam refert, sed staturâ minore, tenuiore, et foliis integerrimis dignoscitur. Habitu inter *P. commune* et *piliferum* est quasi media.—Dillenii exemplaria cum nostris omnimodè convenire mihi sunt visa, sed folia serrata descriptis et delineavit. In exemplaribus quoque a Swartzio et Menziesio communicatis folia nonnulla integerrima, alia, præsertim apices versus, serrata occurunt: hinc esse *P. communis* varietatem, ex loco natali sterili arido pendentem, nequeo non suspicari.

4. *P. strictum*, caule ramoso; foliis lanceolato-subulatis erectiusculis integerrimis; capsulâ oblongâ tetrædrâ; operculo umbonato. Act. Soc. Linn. IV. t. 7. f. 1.

— in sterilibus.

A *P. juniperino* (teste cl. Menziesio) caule ad basin diviso, staturâ ubique minore, foliis brevioribus, rigidioribus, magis erectis, et ramorum ad apices confertis differt. Statura quoque ubique crassior. An tamen revera distinctæ sint species dubitari potest, mihique equidem *P. strictum* tantummodo varietas casu incrassata videtur.

5. *P. attenuatum*, caule simplice; foliis linear-lanceolatis serrulatis reflexis; capsulâ oblongâ tetrædrâ,

basi constrictâ, cernuâ. Sp. Musc. t. 19. f. 1. Act. Soc. Linn. IV. t. 6. f. 2. E. B. XVII. t. 1198.

*P. formosum*. H.

*P. aurantiacum*; capsulis ovatis tetraedris aurantiacis.

*P. aurantiacum*. Hoppe.

— in montosis.

Caules sub-bipollicares, basin versus nudi; folia remotiuscula, dilutè fulvo-viridia, longa, acuta, madore magis quam in præcedentibus reflexa, lenitè canaliculata, margine manifestè serrata, siccitate erectiuscula, cauli appressa; pedicelli bipollicares, basi purpurei, supernè crocei, erecti, terminales; capsulae oblongæ, tetragonæ, semper cernuæ, pallidè virescentes, basi constrictæ, ut apophysi obsoletâ instructæ videantur; operculum conicum, medio in rostrum curvulum assurgens, orâ amoenè rubrâ; calyptæ ut in præcedentibus.—Var. *P.*, a D. Stokes apud Powerscourt lecta, staturâ humiliore, foliorum colore nigro-viridi, capsularum aurantiaco, et capsulis brevioribus, sub-ovatis dignoscitur. Hoppii synonymon, fide exemplarium a Schradero missorum, huc retuli; diffidentissimè tamen feci, cum a Swartzio pro *P. gracilis* varietate conseatur, et exemplaria, in Funckii\* opera

conservata, distincta videantur.—Staturâ tenui, capsulâ cernuâ, apophysi obsoletâ, et foliis reflexis, *P. attenuatum* a *P. communi*, cui simillimum, differt.

6. *P. gracile*, caule simplice; foliis lanceolato-subulatis serrulatis recurvis; capsulâ obovatâ sub-angulatâ, basi constrictâ, obliquâ. Act. Soc. Linn. IV. t. 6. f. 3. Musc. Suec. t. 8. f. 16.

*P. longisetum*. Swartz.

— in montosis.

Caules palmates, et ultra, graciles, proliferi; folia breviuscula, conferta, margine luculentè serrulata, obscurè viridia, canaliculata, madore recurvopatula, siccitate erecta, appressa, perichaetalia cæteris similia; pedicelli terminales, bi-tri-pollicares, plerumque pallidè rubescentes, interdum aurantiaci; capsulae juniores ellipticæ, erectæ, maturæ obovatæ, cernuæ, obscurè angulataæ, apophysi obsoletæ insidentes; operculum et calyptæ ut in præcedente.—*P. communi* et *attenuato* simillimum, sed capsulae obovatæ angulis obsoletis, et staturâ gracili, ab utroque dignoscendum. Variat, teste cl. Swartzio, pedicellis brevibus.

7. *P. alpinum*, caule ramoso; foliis lanceolato-subulatis serrulatis; capsulâ elliptico-ovatâ cernuâ, apophysi

\* Cryptogamische gewachse des Fichtelgebirgs.

obsoletâ ; operculo curvirostro. Sp. Musc. t. 19.  
f. 2. DILL. t. 55. f. 4.

— in montosis.

Caules plerumque sub-bipollicares, interdum spithamæi, et ultra, supernè vagè ramosi ; folia laxiusculè imbricata, e basi membranaceâ vaginante lanceolata, longè acuminata, angusta, rigidiuscula, obscurè viridia, vix carinata, marginè luculentè serrata, madore reflexo-patula, siccitate erecta; pedicelli e surculis senioribus, rarò ex annotinis, orti, sesquipollicares, ericti, fusco-crocei ; capsulæ ju-niores ellipticæ, dilutè glauco-virescentes, apophysi parvâ obsoletâ ad basin instructæ, maturæ ovatæ, fuscae, effœtæ globosæ, nigræ, semper cernuæ ; operculum nunc conicum, nunc, ut sæpius vidi, e basi conicâ in rostrum acutum recurvum assurgens ; calyptæ ut in præcedentibus.—Operculi capsulæque formâ multum ludit hæc species, et interdum absq[ue] apophysi occurrit; hinc P. arcticum, Swartzii (Musc. Suec. t. 8. f. 17.) esse varietatem capsulis solito magis gracilibus, et operculis longioribus, fieri nequit quin suspicer ; et ut verè P. septentrionale specie discrepet dubito, cum Polytricha ferè omnia, pro loci natalis, vel ætatis mutationibus, formâ summoperè variare solent.

§§ Capsulis absque apophysi.

8. P. urnigerum, caule ramoso ; foliis lanceolatis acuminatis serratis patulis ; capsulâ cylindraceâ erectâ ;

operculo acuminato. Sp. Musc. t. 22. f. 5—7.  
DILL. t. 55. f. 5. E. B. XVII. t. 1218.

— in montosis.

Caules nunc unguiculares, nunc spithamæi, basi plerumque nudi ; rami plurimi, vagi, sæpius iterum divisi, conferti, fastigiati ; folia approximata, modicè canaliculata, serrata, infima fusco-spadicea, summa pallidè glauco-viridia, pulcherrima, omnia madore horizontaliter patentia, siccitate erecta, cauli appressa, stricta, neutiquam incurva, vel tortilia ; pedicelli, e ramis annotinis orti, laterales, sesquipollicares, rubelli ; capsulæ cylindraceæ, læves, glauco-virescentes, semper erectæ ; operculi rostrum parvum, acutum, curvulum.—Capsularum formâ, et pedicellis nunquam non lateralibus, hæc species a præcedente, cui primo intuitu similis, affatim potest dignosci.

9. P. rubellum, caule subramoso ; foliis linear-lanceolatis obtusiusculis serratis erectis incurvis ; capsulâ cylindraceâ erectiusculâ. Act. Soc. Linn. IV. t. 7. f. 3.

P. pulverulentum. REYN.

— in ericetis.

Caules sub-pollicares, simplices, vel ramosi ; folia laxè imbricata, carnosa, obscurè viridia, margine

serrata, semper, vel madore, erecta, et conniventia, siccitate insigniter incurva; pedicelli, e surculis an- notinis et senioribus orti, sesquipollares, erecti, solitarii; capsulae ut in praecedente; operculum, teste cl. Menziesio, subulatum.—Hanc speciem primus a *P. aloide* disjunxit, et descripsit Menzie- sius, qui staturā elatiore, caule ramoso, foliorumque carinā denticulatā, differre perhibet: e propriis tamen observationibus suspicatur D. Templeton, *P. aloidem* secundo tertiove florendi anno in *P. rubellum* transire, quod haud absimile videtur. Utriusque folia per totam longitudinem non rarò serrata occurunt. *P. pulverulentum*, plantam du- biis diu vexatam, exemplarium ab ill. R. A. Hed- wigio missorum fide, huc retuli: iconem in Act. Laus. nondum vidi.

10. *P. aloides*, caule simplice abbreviato; foliis linear- lanceolatis obtusiusculis serratis patulis; capsula cylindraceā erectiusculā, St. cr. I. t. 14. DILL. t. 55. f. 7.

*Mnium polytrichoides*. L.

— in arenosis.

Præcedenti simillimum; sed caules vix bilineares, folia madore patula, operculi rostrum exiguum, acutum, curvulum. Plantæ totius altitudo circiter bipollcaris. Folia longitudine variant, et nunc conferta, nunc remotiuscula occurunt.—A *P. ur-*

*nigero*, pro cuius varietate nanā ob capsularum similitudinem fieri potest ut prætermittatur, foliis car- nosis, obtusiusculis, siccitate incurvis, certissimè dignoscitur.

11. *P. nanum*, sub-acaule; foliis lanceolatis obtusis, apice serrulatis, erectis; capsulā subrotundā cernuā. St. cr. I. t. 13.

*Mnium polytrichoides*. L.

— in ericetis.

A præcedente, capsularum formā, foliisque, nisi ad apices, integris, vel obsoletissimè tantūm serratis, primā facie differt; caulis quoque brevior, et cap- sulae semper inclinatae: cæteris convenientiunt.—Pedi- cellorum in hâc specie longitudo perquam incerta, plerumque vix sesquiunguicularis, sed interdum, ut in exemplari a D. Templeton communicato, bipollcaris.—Illust. Linnæus, qui capsulae apo- physin *Polytrichorum* characterem genericum maximè essentialē duxit, hanc speciem et præcedentem, quod illa deficeret, *Mniis*, invi- tissimā naturā, associavit.

12. *P. subrotundum*, sub-acaule; foliis linear-lanceola- tis obtusiusculis integerrimis erecto-patulis; cap- sulā turbinatā erectā; operculo curvirostro. Musc. Succ. t. 9. f. 19. Sp. Musc. t. 21. f. 7—9. DILL. t. 55. f. 6. A—F.

*P. pumilum.* H. Swartz.

— in ericetis.

*P. nanum* et *subrotundum*, species simillimas, et a Dillenio Bridelioque confusas, primi disjunxerunt Swartzius et Menziesius. Folia huic integra, pedicelli vix unguiculares, capsulae turbinateae erectae, teste Swartzio, distinguunt.—Ipse tamen Swartzius *P. subrotundi* folia nonnunquam obscurè serrata dicit, et ita depixit, et in Hedwigii iconē, supra citatā, capsulae subrotundae, nec turbinatae, delineantur; fierine ergo potest ut meræ sint varietates?—diffidentissimè quāero, cūm *P. subrotundum* in loco natali nunquam legerim, et modò unum atque alterum exemplar viderim.—Dillenii t. 55. f. 6. sub hāc specie, ut supra, Menziesii auctoritati obtemperans, protuli.

+ 13. *P. Dicksoni*, caule sub-simplice; foliis linear-lanceolatis obtusis serratis erecto-patulis; capsula cylindracea erecta; operculo conico. T. 10. f. 2.

— in siccis.

Caules unguiculares, saepius simplices, interdum ad basin bifurci; folia obscurè viridia, ferè linearia, latiuscula, obtusa, margine et carinâ serrata, canaliculata, conferta, erecto-patula, siccitate vix incurva, vel conniventia; pedicelli plerumque surculis se-  
rioribus, raro ex annotinis orti, folia vix supe-

rantes, dilutè rubri, erecti, solitarii; capsulae cylindraceae, breves, glauco-virescentes, laves, semper erectae; operculum conicum; calyptra, ut in præcedentibus omnibus, duplex, interior membranacea, virescens, exigua, exterior conica, ferrugineo-fusca, e villis densè intertextis composita.—Hanc stirpem in sepibus arenosis proprie *Yarmouth* primus detexit cl. Dicksonus, cujus nomine insignitur. Ex Hiberniâ, ubi prope *Derry* legit D. Brown, misit D. Templeton.—Magnitudine cum præcedente convenit, sed capsularum forma, et folia luculentè serrata ne pro ejus varietate censeatur prohibent. *P. aloideum* proprius referre mihi videtur, et, ni omnia quotquot vidi exemplaria eandem staturam cunctaque habitum servarent, hanc esse stirpem casu aliquo mutatam, cum Schwaegrichenio, cui olim misi, crederem. Operculi quoque formâ a *P. aloideum* discrepat, quâ de re, Dicksono Swartzioque annuentibus, novam speciem in præsenti duco.

14. *P. undulatum*, caule simplice; foliis lanceolatis serratis; capsula cylindracea cernua; operculo subulato; calyptrâ nudâ. St. cr. I. t. 16, 17. DILL. t. 46. f. 18. E. B. XVII. t. 1220.

*Bryum undulatum.* Huds.

— in sepibus.

Caules pollicares, et ultra, erecti, simplices; folia lætè viridia, inferiora remotiuscula, summa conferta, omnia lanceolata, acuta, nervo valido ob-

scuro modicè carinata, margine distinctè serrata, et leniter undulata, pellucida, sub lente minutè reticulata, siccitate complicata, crispa, contorta, nigricantia; pedicelli terminales, erecti, rubro-fusci; capsulae longæ, cylindracea, laeves, cernuae, ut plurimum incurvæ, maturæ spadiceæ; operculum capsulae ferè longitudine, e basi convexâ subulatum, tenuë, plerumque rectum; calyptra albescens, cylindracea, glabra, apice modò pilorum quasi rudimentis muricata.—DILL. t. 46. f. 19, quam Hedwigius pro merâ hujus stirpis varietate habuit, et quam, sub P. *controversi* nomine, descripsit Bridelius, mihi quidem exemplaria Dilleniana lustranti, species distincta est visa.—*Polytricha* in *Brya*, L. per P. *undulatum* transeunt; peristomium cum illis, cum his calyptram pilis destitutam habet communem. Quoad habitum, et foliorum formam, texturamque, ambiguum.

15. ORTHOTRICHUM.\* SCHREB. Gen.  
Pl. (sub Weissiae nomine) n. 1648.  
HEDW. St. cr. II. p. 96.

\* *ORTHOTRICHA*, si crescendi modus habitusque respiciantur, natura arctissime inter se connexa, et tam vere sui generis videntur, ut potius ejusdem stirpis varietates, quam distinctæ

*Caps.* oblongo-ovata. *Perist.* duplex: exteriorius dentibus sedecim, per paria approximatim, reflexilibus; interiorius totidem filiformibus; interdum deest. *Calyptra* conica, sulcata, pilis erectis sparsis plerumque hispida.

1. O. *crispum*, foliis linearibus acutis, siccitate crispis; pedicellis supernè incrassatis; capsula pyriformi; operculo conico-acuminato. St. cr. II. t. 35. DILL. t. 55. f. 11. E. B. XIV. t. 996.

*Bryum striatum*. §. L.

*Polytrichum striatum*. §. Huds.

— in arboribus.

species, primo intuitu censerentur. Musci tamen nulli, quoad characteres genericos, tam abnormiter ludunt, et tam ægre definiuntur; peristomii enim interni dentes sunt perquam fugaces, et formas incerte, in quibusdam quoque speciebus vel planè desunt, vel saltem nondum sunt detecti; peristomiumque externum nunc octo, nunc sedecim esse dentatum perhibetur. Hoc autem ex errore dictum credo, cum in singulis dentes principio per paria tam firme agglutinantur, ut difficuler disjungantur, et attentissime observanti octo tantum videantur. Calyptra quoque, quæ pilis erectis, sparsis, sub lente, Confervarum instar, articulatis, in plurimis speciebus est hirta, non raro omnino calva occurrit. Hedwigius, qui genus *ORTHOTRICHUM* instituit, has stirpes primo *GRIMMIIS*, Dillenius *POLYTRICHIS* conjunxit; annon autem rectius *PTEROGONIIS*, vel *NECKERIS*, quas habitu magis referunt, associarentur?

Caules dense cæspitosi, pulvini instar congesti, sub-pollicares, ramosi; folia arctè imbricata, lutescentia, basi ovata, mox linearia, longa, acuta, nervo valido carinata, madore patula, siccitate mirè contorta; pedicelli luteo-virides, laterales, terminalesque, bi-tri-lineares, foliis longiores, supernè incrassati, et in capsulam concolorem, erectam, madore lævem, pyriformem, siccitate sulcatam, subcylindraceam, sensim tumescentes; operculum conicum, brevitè acuminatum, rectum; calyptre conica, laxa, et, ut in omnibus *Orthotrichis*, integra secedens, pilis auricis hirta; peristomii externi dentes sedecim, breves, interni totidem, filiformes, conniventes.—Foliis linearibus, siccitate crispis, hæc species a reliquis statim dignoscitur. Crescendi modus pulvinatus omnibus idem.

2. *O. anomalum*, foliis lanceolatis obtusiusculis, margine revolutis; peristomio interno nullo; calyprâ pilosâ, basi crenulatâ. St. cr. II. t. 37. DILL. t. 55. f. 9.

*O. saxatile*. BRID.

*Bryum striatum*. β. L.

— *tectorum*. WITTH.

*Polytrichum striatum*. β. Huds.

— in saxis.

Caules pulvinati, sesquiunguiculares, plerumque divisi; folia nigro-viridia, densè imbricata, lanceo-

lata, obtusiuscula, nervo valido carinata, madore erecto-patula, siccitate cauli appressa, recta; pedicelli vix bilineares surculos superant, quâ notâ hæc species statim et certissimè a sequente dignoscitur; capsulae maturæ ovatae, virescentes, effœtae cylindraceæ, fuscæ, sulcatæ; operculum e basi convexâ in rostrum breve, obtusum, rectum desinit; calyptre pilis sparsis albicantibus hirta, basi minutè crenulata, pro capsulae ætate, nunc conica, nunc campanulata.—Variat calyprâ calvâ.

3. *O. striatum*, foliis lanceolatis acutis, margine revolutis; peristomio interno sedecim-dentato; calyprâ pilosâ integrâ. St. cr. II. t. 36. DILL. t. 55. f. 8.

*Bryum striatum*. α. L.

*Polytrichum striatum*. Huds.

β. foliis siccitate crispis.

— in arboribus.

Præcedente duplo majus: surculi ramosi, pollicares, et ultra, pulvinati; folia pallidè viridia, laxius imbricata, reflexo-patula, acuta, nervo crasso carinata, siccitate cauli appressa, neutiquam crispatâ, summa interdum, nec semper, apice erosa; capsulae oblongæ, dilutè fuscæ, siccitate sulcatæ, sub-sessiles, pedicellis lateralibus, terminalibusque, caulinis plerumque brevioribus; operculum, ut in præcedente; calyptre conica, sulcata, basi integra,

nisi casu laceretur; peristomii externi dentes sedecim, oblongo-triangulares, fusti, interni totidem albicantes, articulati.—Var β, quam ex Hiberniā misit D. Scott, foliis siccitate crispis, contortisque, *O. crispum* primo visu simulat, sed hūc procul dubio est referenda; sphærulas exiguae fuscas, insecti cujuſdam fortè ova; foliorum apici plerumque adhærent, unde propiori investigationi mox subjiciendam fore spero.—Varietatem pumilam, gracilem, calyprā calvā, a D. Stokes accepi.

4. *O. affine*, foliis lanceolatis carinatis, margine revolutis; peristomio interno octo-dentato, calyprā pilosā sub-integrā.

— in arboribus.

Amicissimi Schraderi summæ auctoritati obtemperans, hanc speciem a præcedente distinctam sisto; rectè necne dubitare fateor.—Crescendi modo, staturā, colore, foliorum situ formâque, capsulis, operculis, calyprisque convenient; sed peristomii interni dentes modò octo, et folia summa, teste Bridelio, numquam apice erosa reperiuntur.

- † 5. *O. rivulare*, foliis oblongis concavo-carinatis obtusis erecto-patulis sub-secundis; capsulâ sub-pyriforme sessili; calyprā calvā. T. 8.

— in saxis in rivulis.

Caules erecti, minus quam in reliquis cæspitosi, bipollares, et ultra, ramosissimi, infernè nudi; folia nigro-viridia, densè imbricata, sub-secunda, oblonga, vel ovato-oblonga, obtusa, margine integerima, nec, nisi apicem versus, revoluta, erecto-patula, nervo crasso concolore concavo-carinata, siccitate stricta, cauli appressa; pedicelli brevissimi, laterales, terminalesque; capsulæ oblongo-pyriformes, basi angustatæ, juniores virescentes, læves, maturæ fuscellæ, siccitate sulcatæ, foliis subcelatæ; operculum e basi convexâ brevitè umbonatum; calyptre campanulata, sulcata, virens, calva, margine lacera; peristomii dentes sedecim, sèpè, vel maturi, ita geminati ut octo modò videantur, reflexiles, interni totidem filiformes, inflexi, minimè, quantum vidi, articulati. Hanc speciem, a reliquis omnibus, staturâ majore, crescendi modo, colore, et foliis sub-secundis, toto cælo distantem, in rivulis prope Balbriggen detexit D. Scott, et prope Denyaghy D. Templeton: eodem more ab *O. striato*, quo *Grimmia rivularis* a *G. apocarpâ*, differre videtur.

6. *O. nudum*, foliis lanceolatis carinatis, margine revolutis; peristomio interno nullo; calyprā calvā.  
Dicks. t. 10. f. 13.

— in arboribus.

Caules pulvinati, vix trilineares, simplices vel divisi; folia saturatè viridia, lanceolata, carinata,

margine revoluta ; capsulae sub-sessiles, terminales, ovato-oblongae, striatae, foliis sub-celatae ; calyptra conica ; peristomii dentes colore aurantiaco, reflexiles.—Descriptionem, ad exemplar ab ipso Dicksono missum, cum Hibernicis collatum, elaboravi, sed icon supra laudata plantam aliquantum majorem designare videtur. Staturā minore calyptrāque calvā demptis, vix ullum inter *O. nudum* et *striatum* discrimen reperio ; peristomii enim interni dentes, qui in *O. nudo* semper deesse perhibentur, in singulis speciebus sunt ita, fugaces, ut, ne illis nimium nitens in errorem inducatur, iterum atque iterum monendus est tyro.

7. *O. pumilum*, caule simplice ; foliis lanceolatis carinatis acutis, margine revolutis ; peristomio externo octo-dentato ; calyprā calvā. Musc. Suec. t. 4. f. 9.

— in arboribus.

Eiusdem cum *O. nudo* magnitudinis; sed differt caulibus simplicibus, vel ad basin modò divisis, habitu tenuiore, foliis acuminatis, peristomio interno. Color lætè viridis, pedicelli longitudinis incertæ, nunc brevissimi, ut capsulae foliis tegantur, nunc surculos superantes ; capsulae oblongo-cylindraceæ, siccitate sulcatæ ; operculum convexum, brevitè umbonatum, luteo-viride ; calyptra campanulata, tota glabra ; peristomii externi dentes per paria connati, nunquam, quantum observavit

Swartzius, vel quantum ipse vidi, vel maturi, dissidentes, ut octo tantum in descriptione specificâ dixerim ; peristomii interni, teste Swartzio, dentes octo, cum externis alternantes.—Primus hanc speciem in Sueciâ detexit cl. Swartzius, et exemplaria, ex ipsis Linnæi horto, benevolè mihi communicavit D. Mohrius : in Hiberniâ legerunt D. Brown et Scott.

8. *O. diaphanum*, caule sub-simplice ; foliis lanceolatis acuminatis, margine revolutis, apice diaphanis serrulatis ; calyprā sub-pilosâ. T. 9. f. 1.

— in arborum truncis.

Caules pulvinati, plerumque simplices, bi-trilineares ; folia densè imbricata, lætè-viridia, lanceolata, acuminata, nervo crasso concolore concavo-carinata, madore erecto-patula, siccitate appressa, stricta, sub lente minutissimè reticulata, apice diaphana, serrulata, margine revoluta ; pedicelli brevissimi, terminales, et, ut rectè observavit Schraderus, in capsulam neutiquam confluentes ; capsulae foliis sub-celatae, ovatae, læves, effæcta oblongæ, siccitate striatae, operculum convexum, obtusè umbonatum ; calyptra campanulata, sulcata, pilis raris, sèpè glabra ; peristomium ut in *O. striato*.—Foliorum apice incano hæc species a præcedentibus statim dignoscitur. *Dicranum pulvinatum* primo visu mirè simulat. *O. diaphanum*, Dicks. (IV.



p. 5.) quoad descriptionem ad hanc speciem, quoad iconem ad sequentem pertinere videtur.

† 9. *O. aristatum*, caule sub-simplice; foliis oblongo-spatulatis retusis piliferis; calyprâ calvâ. T. 9. f. 2. Dicks. t. 10. f. 12.

*O. diaphanum*. Dicks. (quoad iconem.)

— in arborum truncis,

Hanc stirpem a præcedente specie satis differre fateor mihi nondum constare. Abundantè utramque in Suffolciâ legi, habituque tam insignitè discrepant, ut pro distinctis in præsenti sistere tutissimum judicavi. Color in *O. aristato*, vel madefacto, nigro-viridis, absque ullo nitore, in siccato, tristissimus; folia, ut plurimum, apice retusa, sæpè rotundata, sed hoc quodammodo incertum, verè pilifera, nervo extra apicem producto, nec, ut in præcedente, parenchymatis defectu diaphana, pili minus evidentè sunt serrati, et margines vix, aut ne vix, sunt revoluti. Cæteris convenient, nisi quòd calyptra, quantum vidi, nunquam pilosa occurrat.—*O. aristatum* prope Eblanam detexit D. Stokes.

## 16. NECKERA. SCHREB. Gen. Pl. n.

1658. HEDW. Fund. II. p. 93. t. 8.

f. 47.—49.

*Caps. oblonga*. *Perist. duplex*: *exterius dentibus* sedecim, acutis, *interius ciliis* totidem, distinctis, cum dentibus exterioris alternantibus. *Fl. laterales*.


### § *Foliis distichis*.

1. *N. crispa*, caule ramoso complanato; foliis oblongis apiculatis enervibus undulatis; operculo rostrato incurvo. DILL. t. 36. f. 12. E. B. IX. t. 617.

*Hypnum crispum*. L.

— in rupibus.

Caules erectiusculi, spithamæ et ultra, complanati, ramis vagis, bifariis, situ et longitudine variis, abnormiter pinnati; folia lætè viridia, siccitate pulcherrimè splendentia, ceu vernice oblita, disticha, patentia, imbricata, concaviuscula, oblonga, mucrone exiguo acuta, transversè undulata; perichætialia oblongo-subulata, omnia enervia; pedicelli perichætio longiores, unguiculares, dilutè rubri; capsulæ ovatæ, fuscæ, erectæ; operculi rostrum longum, tenue, incurvum.—A *N. pennatâ* et *undulatâ* capsulæ pedunculatæ, ab *H. undulato* foliorum color, capsulæque erectæ distinguunt.



§§ *Foliis undique imbricatis.*

2. *N. heteromalla*, caule sub-simplice; foliis ovatis uninnervibus patulis; capsulis cylindraceis sub-sessilibus secundis; operculo conico. St. cr. III. t. 15.  
DILL. t. 32. f. 6. E. B. XVII. 1180.

*Sphagnum arboreum*. L.

*Fontinalis secunda*. With.

— in arborum truncis.

Radix repens; caules erecti, unguiculares, simplices, vel ramo uno alteroque prope basin, horizontali, brevissimo instructi; folia undique imbricata, saturatè viridia, approximata, ovata, acuta, concava, nervo crasso, concolore, prope apices evanescente instructa, madore horizontaliter patula, siccitate cauli appressa; perichaetalia oblonga, longè apiculata, pallida, sub-enervia, capsulas laterales, brevissimè pedicellatas, semper secundas superantes; operculum conico-acuminatum, rectum. DILL. t. 85. f. 18, quam plurimi Botanici ad hanc speciem referendam censuerunt, *Pterogonii julacei*, licet ipse abneget, fide sui herbarii varietatem crederem.

3. *N. curtipeduncula*, caule ramosissimo; foliis ovatis acuminatis uninervibus patulis; capsula ovata; operculo rostrato. DILL. t. 43. f. 69.

*Hypnum curtipedunculum*. L.

— in rupibus.

Caules prostrati, spithamei, vel dodrantales, abnormiter divisi, interdum sub-pinnati; ramì apice incrassati; folia conferta, amoenè viridia, summa luteola, madore patula, siccitate stricta, nitida, concaviuscula, ovata, in apicem acutissimum, tenerrimè sub lente serrulatum producta, nervo crasso, obscuro, juxta apices evanescente; perichaetalia oblongo-subulata, convoluta, enervia; pedicelli laterales, vix unguiculares; capsulae ovatae, erectae, pallidè fuscæ, effætæ sub-pendulæ; operculum, fide Bridelii, e basi conicâ rotatum, rostello sub-obliquo.

4. *N. viticulosæ*, caule repente; ramis erectis simpliciis; foliis ovato-linearibus uninervibus subrecurvis; capsula cylindracea; operculo pyramidato. Sp. musc. t. 48. f. 4—8. DILL. t. 39. f. 43. E. B. IV. t. 265.

*Hypnum viticulosum*. L.

— in arboribus.

Caulis repens, ramosus; rami sesquipollicares, erecti, teretes, simplices, vel semel atque iterum vagè divisi; folia approximata, luteola, madore patula, apice recurva, rariùs sub-secunda, siccitate cauli appressa, absque nitore, basi ovata, lata, mox angustiora, linearia, obtusiuscula, concava, nervo albicante, subdiaphano; perichaetalia parva, ovato-subulata, obsoletè uninervia, pedicelli subpollicares, crocei; capsulae cylindraceæ, graciles, dilatè subfuscæ, erectæ; operculum tenuè, rectum, acutum.

**17. BUXBAUMIA. SCHREB.** Gen. Pl. n. 1659. HEDW. Fund. II. p. 95. t. 9. f. 51, 52.

*Caps.* ovata, obliqua, basi hinc ventricosa.

*Perist.* duplex; *exterius* dentibus sedecim brevibus, truncatis, *internus* membrana plicata.

1. *B. aphylla*, capsulâ pedicellatâ; foliis nullis. DILL. t. 68. f. 5. Fl. Dan. t. 44.

Pedicellus, basi in bulbillum nigrum sub-vilosum tumidus, unguicularis, fusco-rubens, nitidus, erectus; capsula pallidè concolor, ovata, gibba, *Pisi sativi* seminis ferè magnitudine.—Singulare in Muscologia phænomenon planta foliis, vel minimis, nullo crescendi tempore instructa.—Unum modò hujus *Buxbaumia* exemplar Hibernicum, quod in herbario suo apud hortum Glasnevinensem servat D. Wade, seque in rupibus prope Killarney legisse perhibuit, adhuc vidi, quâ de re descriptionem ad Germanica elaboravi.

2. *B. foliosa*, capsulâ sub-sessili, foliis linearis-subulatis erectis uninervibus cinctâ. DILL. t. 32. f. 13. E. B. V. t. 329. Fl. Dan. t. 249. f. 3.

*Phascum montanum.* Huds.

— in rupibus.

Stirps solitaria, *Vicia sativa* seminis ferè magnitudine; capsula oblongo-ovata, hinc gibba, e viridi albescens, caule vix sesquilineari fulta; operculum longè conicum; folia alba, diaphana, membranacea, nervo lato viridi cuspidata, tenerrima, interdum hic illic sparsim denticulata, neutiquam, ut Swartzius dixit, quantum vidi, obtusa.—Cavendum est ne Tyrone botanici hanc plantulam cum *Phasco subulato*, a quo statuâ duplò majore, colore albicante, peristomioque differt, commisceant.

**18. FUNARIA. SCHREB.** Gen. Pl. n. 1650. HEDW. Fund. II. p. 95. t. 10. f. 58—60. Koelreutera. H.

*Caps.* obconica. *Perist.* duplex; *exterius* dentibus sedecim, obliquis, cuneiformibus, apice cohærentibus; *internus* membrana, in sedecim cilia plana divisa.

*F. hygrometrica.* DILL. 52. f. 75. E. B. V. t. 342.

*Mnium hygrometricum.* L.

— in humidis.

Sub-acaulis ; folia dilutè viridia, pauca, congesta, latè ovata, acuta, concava, conniventia, nervo obscurò percursa, sub lente mirè reticulata; pedicelli bipolligares, crocei, erecti, apices versus arcuati; capsulae basi attenuatae, pyriformes, obliquè pendulae; calyptra albescens, ventricosa, quadrangula, capsulam juniorem tegens, adultioris apici horizontaliter insidens; operculum minutum, plano-convexum, flavum, orâ amoenè coccineâ.—Una modò hujus generis species adhuc vulgatur, sed alteram, foliis angustis, strictissimis, capsulâ gracili notabilem, ex Hispaniolâ missam, possidet cl. Smithius; et tertiam, sub F. Muhlenbergii nomine a cl. R. A. Hedwigio mox describendam, in Americâ septentrionali detexit D. Muhlenberg.

19. BARTRAMIA. SCHREB. Gen. Pl. n.  
1654. HEDW. St. cr. II. p. 111.

\* Genus *BARTRAMIAM* primus in Stirpibus Cryptogamicis instituit Hedwigius, sed, peristomii interni forma, florumque masculorum situ plus æquo nitens, quasdam species, *BARTRAMIS* evidentissimè conjungendas, inter *MNIA* reliquit. Mox in Schraderi diario (IV. p. 181) Swartzius characterem genericum auspiciatissimè emendavit, ut *MNIUM MARCHICUM, FONTANUM, et SPHÆRICARPON* etiam reciperet, genusque pulcherrimum, quod naturæ omnino conveniret, capsulisque sphæri-

*Caps. sphærica*, siccitate sulcata: *Perist.* duplex; *exterius* dentibus sedecim cuneiformibus, *interius* membrana carinata, sedecim-partita, lacinulis bifidis.

§ *Pedicellis caulem superantibus.*

1. *B. fontana*, caule ramoso, ramis fasciculatis sub-simplicibus; foliis ovatis acuminatis, apice serrulatis; capsulâ obliquâ. DILL. t. 44. f. 2. E. B. VI. t. 390.

*Mnium fontanum*. L. H.

*Bryum fontanum*. E. B.

*B. pumilum*; caule abbreviato simpliciusculo; foliis lanceolatis. T. 10. f. 1.

— in paludibus.

Caules bipolligares, cæspitosi, infernè ferrugineo-tomentosi, in ramos aliquot teretes, simpliciusculos, fasciculatos, plerumque basin versus divisi; folia lutescentia, laxiusculè imbricata, latè ovata, acuminata, nervo concolore, extra apicem procedente,

cis a *BRYO* statim posset dignosci, efficeret. Flores in *M. CRUDO* et *PSEUDO-TRIQUETRO* hermaphroditos reperiri perhibet Swartzius, ad-jungitque, “peristomio interno ejusdem structuræ gaudent omnes *BARTRAMIAE*, membrana nempe est plicato-carinata, plus minus profunde 16-partita, lacinulis bifidis, erubibus apices inflexos dentium perist. ext. recipientibus. In sola specie, qua *HALLERIANA* dicitur, haec membrana magis conica, et apice interdum inordinate finditur, sæpe tamen *CRISPÆ, POMIFORMI*, et *OEDERIANÆ* consimilem vidi.”

brevitèr cuspidata, madore erecto-patula, siccitate cauli appressa, sub lente pulchrè reticulata, et minutissimè, præsertim apices versus, serrata; pedicelli sub-bipollicares, erecti, laterales; capsulæ sphæricæ, juniores, virescentes, læves, effætæ pallidè fuscæ, sulcatæ; operculum convexum, umbone brevi.—Var.  $\beta$ . in Hiberniâ ab am. Scott lecta, habitu insigniter ab  $\alpha$  recedit; unde pro distinctâ specie primò enumeraveram: differt caulibus densissime cæspitosis, vix sesquiunguicularibus, plerumque simplicibus; foliis intensius viridibus, nec acuminatis, nec cuspidatis, multò luculentius serratis; pedicellis brevioribus; staturâ denique ubique graciliore.

2. *B. pomiformis*, caule simpliciusculo; foliis subulatis serratis patulis; capsulâ erectâ; operculo plano.  
DILL. t. 44, f. 1. E. B. XIV. t. 998.

*Bryum pomiforme*. L.

—. in siccis.

Caules cæspitosi, sub-unguicularès, plerumque simplices, interdum divisi; folia conferta, luteo-viridia, longa, undique patula, margine serrata, nervo valido concolore concaviuscula, siccitate sub-crispata; pedicelli pollicares, erecti, pallidè rubri, ortu terminales, mox axillares; capsulæ sphæricæ, dilutè virides, erectæ, effætæ striatæ, lutescentes, aliquantum inclinatæ; operculum minutum, planum.—Foliorum longitudine multùm

Iudit hæc species, et exemplaria quorum statuta solito duplò major misit D. Templeton.—*B. crispa*, Swartzii, perquam refert, hujus autem caules bi-tri-pollicares, pedicelli breves, folia remotiuscula, mirè crispa. *B. gracilis*, Flörke, (Fl. Dan. t. 478) foliis latioribus linear-lanceolatis ab utrâque dignoscitur.

§§ *Pedicellis caule brevioribus.*

3. *B. Halleriana*, caule sub-diviso; foliis subulatis serratis erecto-patulis; pedicellis lateralibus erecti-usculis; operculo conico. St. cr. II. t. 40. E. B. XIV. t. 997.

*Bryum laterale*. Huds.

— in rupibus.

Caules cæspitosi, bi-tri-pollicares, plerumque divisi, fragiles, foliis dilutè fulvo-viridibus, longis, subulatis, sub-secundis, remotiusculis, nervo valido carinatis, serratis, undique patulis, siccitate crispulis vestiti; pedicelli vix bilineares, laterales, erecti-usculi, vel capsularum pondere aliquantulum arcuati; capsulæ juniores virides, sphæricæ, læves, effætæ oblongæ, fuscescientes, sulcatæ; operculum conicum, basi pulchritè rubrum.—Musi hujus varietatem, cui surculi ferè spithamæi, folia densè imbricata, in rupibus pro e Lough-Bray legi.

4. *B. arcuata*, caule ramoso; foliis lanceolatis serratis striatis recurvo-patulis; pedicellis lateralibus ar-

euatis; capsulis pendulis. DILL. t. 39. f. 36. DICKS.  
t. 7. f. 3. E. B. XVIII. t. 1237.

*Mnium arcuatum.* DICKS.

*Hypnum chrysocomum.* DICKS.

— in alpinis.

Caules cæspitosi, palmares, erecti, vagè ramosi; folia lutescentia, nitida, tomento denso fusco ad basin obsita, sub-reflexa, lanceolata, acuminata, nervo validiusculo, concolore, striisque lateralibus prædicta, modicè carinata, margine distinctè serrata, siccitate squarrosa, summa stellatim expansa; pedicelli sub-unguiculares, fusco-rufi, laterales, arcuati; capsulæ sphæricæ, pendulæ, juniores virescentes, læves, effœtæ fuscescentes, sulcatæ; operculum minutum, plano-conicum.—Species pulcherrima, montium Cambro-Britannicorum, et Hibernicorum, ubi, teste D. Templeton, abundè legitur, decus. Capsulæ rarissimè occurrunt, et foliis semper ita celantur ut nisi attentissimè observantem fallerent.

20. *BRYUM.\* SCHREB.* Gen. Pl. n.  
1651. HEDW. Fund. II. p. 94.

\* Tot genera Hedwigiana sub *BRYI* nomine conjungendo tam audacter egi, ut quæ me ad hoc impulerunt, causas brevitè exponere operæ fore pretium spero. Florum masculorum, raro absque moles-

*Mnium.* HEDW. Fund. II. p. 94. t. 5.  
f. 23. Smith, in E. B. p. 1238.

*Webera.* HEDW. Fund. II. p. 95.

*Pohlia.* SCHREB. Gen. Pl. n. 1649.  
HEDW. St. cr. I. p. 96.

*Meesia.* SCHREB. Gen. Pl. n. 1653.  
HEDW. Fund. II. p. 97. t. 9. f. 56, 57.

via detegendorum, situm et formam, vel peristomii interni differentias minutas, quæ oculum, nisi fortè armatum, effugiunt, ad characteres genericos stabiliendos neutiquam satis duco: hæ nota enim, e plantarum exiguarum partibus maximè exiguis desumptæ, non modo tyroni, sed et Botanico maximè perito, difficultates quotidie objiciunt. *BRYUM*, *MNIUM*, et *WEBERAM* idcirco modo disjunxit Hedwigius, quia flores masculi in primo dioeci capituliformes, in altero dioici disciformes, in tertio monoici occurrant; *MNIA*, ob capsulas ætate et siccitate sulcata, a *BRYIS*, quorum capsule semper læves, segreganda censem am. Smithius: *POHLIAM*, ob peristomium internum æqualiter sedecimpartitum, et *MEESIAM*, ob peristomii externi dentes breves obtusos, interni acutos, opere reticulato plerumque connexos, a *BRYO*, cuius peristomium internum in lacinias capillares cum latiusculis alternantes finditur, separavit Hedwigius. Schreberus quoque, et Swartzius *MEESIAM* *POHLIAM*que pro distinctis generibus habent; et has stirpes habitu a *BRYIS* distare non is sum qui inficias eam. An rectè igitur fecerim vehementè dubito, aliisque dijudicandum relinquo. Interim plantas singulis generibus ab Hedwigio annumeratas sibi invicem proximas disposui, ut ii, qui vestigiis Hedwigianis instare mallent, id in hoc etiam opusculo facere possint.

*Caps.* ovato-oblonga. *Perist.* duplex: exteriū dentibus sedecim, latiusculis, interius membrana laciñiata. *Fl.* fæminei terminales.

1. *B. conoideum*, caule diviso; foliis oblongo-lanceolatis confertis erecto-patulis; capsulâ pyriformi erectâ; operculo rostrato, rostro incurvo. *Dicks.* t. 11. f. 2. *E. B. XVIII.* t. 1239.

*Vig. Don*

— in arboribus,

Caules vix sesquilineares, erecti, bifurci; folia conferta, lætè viridia, integerrima, undique densè imbricata, nervo valido, nigricante percursa, sub lente minutè punctata, siccitate appressa, et incurva; pedicelli terminales, unguiculares, straminei, semperque, monente D. Templeton, sub-declinati; capsulæ lutescentes, siccitate sulcate; operculum planum, centro in rostrum longum assurgens.—*A. B. androgyno*, cui uni affine, staturâ triplò minore, foliis confertis, capsulæ operculique formâ differt. Peristomium internum primus observavit oculatissimus D. Templeton, iconemque et descriptionem benignè communicavit.

2. *B. androgynum*, caule sub-simplice; foliis oblongo-lanceolatis remotiusculis patentibus; capsulâ cylindraceâ erectâ; operculo conico. *DILL.* t. 31. f. 1.

*E. B. XVIII.* t. 1238.

*Mnium androgynum.* L:

— in umbrosis.

Caules cæspitosi, sub-pollicares, plerumque simplices; folia lutescentia, pellucida, sub lente punctata, nervo obscuriore, modicè carinata, siccitate erectiuscula; pedicelli ferè pollicares, erecti, straminei; capsulæ pallidæ, erectæ, vel tantillùm obliquatae, siccitate striatae; operculum capsulae concolor, exactè conicum; flores dioici.—Cavendum est ne plantulæ hujus musci masculæ cum *Tetraphi pellucidâ* confundantur: foliis angustioribus, surculis longioribus, et tenuioribus differunt.—Capsulæ in hâc stirpe rarissimè deteguntur, sed flores masculi globosi, pedunculati, nudi, non raro occurunt.

3. *B. palustre*, caule dichotomo; foliis lanceolatis acuminatis erecto-patulis; capsulâ oblongâ obliquâ; operculo conico. *E. B. VI.* t. 391. *DILL.* t. 31. f. 3.

*Mnium palustre.* L. H.

*B. ramosum*; floribus masculis pedunculatis. *DILL.* t. 31. f. 4.

*Mnium ramosum.* *Fl. Ang. (ed. prima.)*

— in palustribus.

Caules cæspitosi, bipollicares, et ultra, bifurci, vel dichotomi, tomento fusco infernè obsiti ; folia undique densè imbricata, rariùs subsecunda, lutescentia, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, lenitè undulata, pellucida, nervo crassiusculo rufescente carinata ; pedicelli erecti, bipollicares, rufo-fusci, & surculis annotinis orti ; capsulæ pallidæ, siccitate sulcatæ ; operculum exactè conicum ; flores masculi terminales, sessiles, foliis rosæ instar expansis obsiti.—Var β, quæ habitu graciliore differt, floribusque masculis longè pedunculatis speciem ramosam induit, et quam pro distinctâ stirpe habuerunt Dillenius et Hudsonus, in Hiberniæ paludosis legit D. Scott.

4. *B. elongatum*, caule simplice ; foliis linear-lanceolatis patulis ; capsulâ sub-cylindraceâ, basi attenuatâ, inclinatâ ; operculo conico. St. cr. I. t. 36.

*Pohlia elongata*. H.

— in saxis humidis.

Caules cæspitosi, bi-tri-lineares, rarò divisi ; folia lætè, sed saturatè viridia, densè imbricata, angusta, acuta, integerrima, margine tantillùm incrasata, et quasi sub-revoluta, nervo crasso concolore percursa, madore patula, siccitate appressa ; pedicelli pollicares, erecti, rubentes, in capsulam dilutè flavam, cylindraceo-clavatam, duas ferè lineas lon-

gam, primò erectiusculam, mox inclinatam, et de-mùm sub-horizontalem, sursùm tumescentes ; operculum conicum, rubellum, apice minutè mammillatum ; peristomium internum æqualiter sedecim-partitum.—Hanc speciem in herbario Dilleniano, cum *B. nutante* commixtam, detexit am. Smithius.

5. *B. dealbatum*, sub-acaule ; foliis lanceolatis acutis sub-serratis patulis ; capsulâ pyriformi incurvo-obliquâ ; operculo convexo. Sp. Musc. t. 41. f. 6—9. Dicks. t. 5. f. 3. Musc. Suec. t. 5. f. 10.

*Meesia dealbata*. Swartz. H.

— in arenosis.

Caules brevissimi, vix lineares ; folia albicantia, conferta, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, breviter acuminata, apices versus obsoletè serrata, sub lente reticulata, nervo crassiusculo, prope apicem evanescente, carinata ; pedicelli sesquipollicares, erecti, rubentes ; capsulæ juniores albidæ, mox fuscantes, elongato-pyriformes, paullùm arcuatae ; operculum brevissimum convexum ; peristomii interni dentes reticulati, conniventis, externos obtusos longitudine multùm superantes.—Foliorum colore et formâ, staturâque minore, a *B. trichode*, cui perquam affine, differt.

- \* 6. *B. triquetrum*, caule simplice ; foliis ovato-lanceolatis acuminatis patulis ; capsulâ cylindraceo-pyri-

formi incurvo-obliquâ ; operculo conico. St. cr. I. t. 21, 22.

*Meesia longiseta.* H.

— in turfosis.

Caules cæspitosi, simplices, plerumque elongati, sesquiplicares, et ultra, foliis remotiusculis, tomento ferrugineo interposito, laxè vestiti, interdum vix trilineares, densè foliosi ; folia lätè viridia, ovato-lanceolata, acuminata, integerrima, sub lente reticulata, nervo fusco percursa, modicè concava, madore patula, siccitate sub-flexuosa ; pedicelli palmates, et ultra, flavo-rutilantes, debiles, flexuosè erecti ; capsulæ juniores dilutè virescentes, adultæ fuscæ, læves, graciles, nunc sub-cylindraceæ, nunc angustè pyriformes, paullùm arcuatæ ; operculum, fide Hedwigii, longe conicum, et peristomii interni dentes longi, non connexi. — Folia lätè viridia integerrima, et caules elongati hanc speciem a præcedente, foliorum forma a *B. trichode* affatim distinguunt : operculo conico ab utroque differt. — Ad lacûs cujusdam in Hiberniâ septentrionali margines nuperrimè est a D. Scott detecta.

+ 7. *B. obtusifolium*, caule simpliciusculo ; foliis ovatis obtusis concavis conniventibus ; capsulâ obovatâ obliquâ ; operculo umbonato.

T. 11. f. 1.

— in glareosis.

Caules cæspitosi, vix bilineares, simplices, vel bifurci ; folia saturatè et obscurè viridia, laxiusculè imbricata, ovata, brevia, integerrima, obtusiuscula, nervo crasso ferè concolore percursa, concava, sub lente minutè punctata, madore conniventia, siccitate incurva, cauli appressa ; pedicelli, e ramis annotinis orti, erecti, rufescentes, sub-unguiculares ; capsulæ obovatae, rufo-fuscae, inclinatae, lævisissimæ ; operculum convexum, umbone exiguo, curvulo, acuto instructum ; peristomii dentes pallidi, rubri, incurvi : calyptram non vidi. — Hanc speciem, a reliquis omnibus habitu et foliis toto cælo distantem, humi in glareosis prope Eblanam, A. D. 1802, perparcè legi : doleo quòd locùs natalis e memoriam excederit.

§§ *Capsulis pendulis.*

8. *B. nutans*, caule simplice ; foliis ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis patulis ; capsulâ oblongâ ; operculo convexo umbonato. St. cr. 1. t. 4. DILL. t. 50. f. 61.

*Webera nutans.* H.

*Bryum sericeum.* Huds.

— in montosis.

Caules cæspitosi, sub-unguiculares, basi denucati ; folia lätè virentia, inferiora dissita, superiora conferta, latè lanceolata, concava, sub lente serrulata, nervo crassiusculo, pallidè rufescente in-

structa, madore conniventia, siccitate erecta, stricta; pedicelli bi-tri-pollicares, aurantii, nitentes, erecti, apice paullum arcuati; capsulae juniores oblongae, virides, maturae luteo-fuscæ, turbinatae, basi constrictæ; operculum convexum, umbone minuto.

— Musci hujus plantulas, surculis *Dicrani* flexuosi sterilibus ita commixtas ut idem uterque videretur, et nisi attentissimè observantem fallerent, misit D. Templeton, fierique potest ut simile quiddam cl. Dillenium, qui caules steriles elongatos, quandoque ramosos dicit, deceperit.

9. *B. aureum*, caule simplice; foliis setaceis flexuoso-recurvis; capsula pyriformi; operculo convexo umbonato. St. cr. I. t. 3. DILL. t. 50. f. 60. E. B. VI. t. 389.

*Webera pyriformis*. H.

*Mnium pyriforme*. L.

*Bryum pyriforme*. Swartz.

— in montosis.

Caulès densè cæspitosi, bi-tri-lineares, infernè nudi; folia pulchrè flavo-viridia, laxè imbricata, longa, setacea, et ferè capillacea, cùm sicca, tūm madida flexuose horizontalia, vel recurva, nervo lato concolore instructa; pedicelli terminales, sesquipollicares, debiles, flexuose erecti, supernè arcuati, rubescentes; capsulae pyriformes, medio constrictæ, pendulæ, juniores dilutè virides, ma-

turæ fuscæ; operculum convexum, obsoletè umbonatum, ejusdem cum capsula coloris.—Species pulcherrima, præcedente ubique minor et tenuior; foliis setaceis, pallidè sed splendide viridibus, capsulae formâ statim a reliquis dignoscenda.

10. *B. carneum*, caule sub-simplice, foliis lanceolatis remotiusculis erecto-patulis; capsula ovatæ; operculo convexo umbonato. St. cr. I. t. 30. DILL. t. 50. f. 69. E. B. V. t. 360.

*Bryum delicatulum*. H.

\* *B. pulchellum*; foliis approximatis; capsulis subglobosis. st. cr. III. t. 38. B.

*Bryum pulchellum*. H.

— in humidis.

Caules vix sesquiunguiculares, ut plurimum simplices; folia plerumque albescenti, interdum saturatè viridia, pellucida, remotiuscula, lanceolata, acuta, vel breviter acuminata, sub lente reticulata, nec raro tenuissimè serrulata, nervo fuscescente percursa; pedicelli dilutè rubri, sub-unguiculares, erecti, apice arcuati; capsulae pendulæ, juniores carneæ, maturæ atro-rufæ, nunc oblongo-ovatæ, nunc sub-globosæ; operculum convexum, umbone obtuso.—Var. *B. quam*, exemplarium a Swartzio missorum, et iconis Hedwigianæ fide huc protuli, vix nisi foliis approximatis, capsulis aliquantum magis subrotundis, pedicellisque longioribus dif-

ferre videtur, unde pro varietate modò habui; sed a tanti ponderis viris non nisi diffidentissimè est dissentendum; et, si errārim, 'discere et audire et meliori credere volo.' In saltu *Dargle* dicto legit D. Stokes.—Varietatem *B. carnei* caulibus sesquipollicaribus olim mihi dedit vir amicissimus, H. Davies.

11. *B. capillare*, caule sub-ramoso; foliis obovatis obtusis concavis piliferis, siccitate involutis; capsulâ oblongo-cylindraceâ. DILL. t. 50. f. 67.  
— in sepibus.

Caules densè cæspitosi, bi-tri-lineares, plerumque divisi; folia lætissimè viridia, arctè imbricata, e basi angustâ obovata, obtusa, integerrima, lata, sub lente reticulata, nervo fusco, in pilum album brevem exente concava, madore erecto-conniventia, siccitate tortuosa, et circa caulem spiraliter involuta; pedicelli e surculis annotinis orti, pollares, erecti, rutilantes, supernè arcuati; capsulae pendulae, graciles, ex oblongo cylindraceæ, flavofuscæ; operculum pulchrè sanguineum, convexo-conicum, umbone minuto, obsoleto.

12. *B. caspiticum*, caule sub-ramoso; foliis ovato-acuminatis cuspidatis, siccitate strictis; capsulâ oblongo-ovatâ; operculo plano unbonato. DILL. t. 50. f. 66. A—E.  
— in arenosis.

Præcedenti simillimum, ut pro varietate facilè prætermittatur: differt caulibus vix linearibus, foliis obscuriùs viridibus, siccitate erectis, strictis, nec tortuosis, basi ovatis, apice attenuatis, et in cuspidem longum sensim desinentibus, capsulâ duplò breviore, oblongo-ovatâ, operculoque neutram convexo-conico, sed plano, umbone, in centro, brevi, acuto.—Pedicelli in hac specie nunc rubri, nunc splendide purpurei, interdum, ut et capsulae, sanguinei; folia, circa caules breves densè imbricata, connivent, ut surculi juniores steriles bulbillos referant, et ne pro *Phasco* quodam immaturo legantur est cavendum.—Varietatem hujus musci, quæ foliis longis, lanceolato-subulatis, remotiusculis, speciem distinctam simulat, a cl. Swartzio et Templeton accepi.

13. *B. bicolor*, caule sub-ramoso; foliis ovato-lanceolatis acuminatis, siccitate strictis; capsulâ ovatâ; operculo convexo umbonato. T. 11. f. 2. DILL. t. 50. f. 66. F. G.  
— in arenosis.

Caules brevissimi, vix lineares, plerumque bifidi, teretes; folia fusco-viridia, conferta, densissimè imbricata, ovato-lanceolata, acuminata, sub lente reticulata, nervo crasso concava, madore erecto-patula, siccitate stricta; pedicelli e surculis annotinis orti, unguiculares, erecti, rubri, nitidi, supernè arcuati; capsulae ovatae, vel sub-globosæ,

abbreviatæ, rufo-fuscæ, læves, pendulæ ; operculum convexo-conicum, umbone exiguo, acuto.—Pedicellis brevibus, capsulisque sub-globosis, basi neutram attenuatis, hæc species a præcedente, quâcum conjunxerat Dillenius, præcipuè differt ; segregatim sine lege crescere cl. Dicksonus perhibet, cæspitosam tamen semper reperi. Habitu inter B. cæspiticium et argenteum est quasi media. Ex Hiberniâ misit D. Scott.

14. *B. argenteum*, caule simplice terete ; foliis ovatis concavis arctè imbricatis piliferis ; capsulâ ovatâ. DILL. t. 50. f. 62.

— in muris.

Caules conferti, sub-bilineares, tenues, insigniter teretes ; folia arctissimè imbricata, latè ovata, obtusiuscula, albescens, siccitate splendentia, veluti argentata, sub lente reticulata, nervo concole, nunc valido, nunc ferè obsoleto, in pilum brevem desinente instructa ; pedicelli, surculorum ad basin orti, erecti, unguiculares, rubri, superne arcuati ; capsulæ subfuscæ, nitidæ, pendulæ, breves, juniores oblongæ, maturæ ovatæ ; operculum conicum, acutum, saturatè rubrum.—A speciebus Hibernicis omnibus, sequentem si excipias, colore ramisque teretibus primo visu dignoscitur. *B. julaceum*, Schrad. (DILL. t. 50. f. 63.) cui maximè affine, statûrâ triplò minore, foliis muticis, et cap-

sulcarum formâ differt. Varietatem, caulis ferè unguicularibus, interdum bifurcis, legit D. Stokes.

15. *B. Zierii*, caule simplici sculo terete ; foliis ovatis concavis arctè imbricatis apiculatis : capsulâ clavatâ. Sp. Musc. t. 44. f. 1—4. DICKS. t. 4. f. 10. E. B. XV. t. 1021.

— in saxis.

A præcedente, quod habitu, magnitudine, crescendi modo, et colore multùm simulat, foliis apice nunquam piliferis, capsularumque formâ, longè diversâ, differt.—Caules plerumque simplices, interdum semel atque iterum divisi, insigniter teretes ; foliorum nervus fuscescens ; folia sub lente reticulata, latè ovata ; operculum conicum ; capsulae fusco-virides, elongatæ, bilineares, juniores cylindraceo-clavatae, maturæ formam mutant, ipsæque ovatæ, apophysi longæ obconicæ insidere videntur.—Ab hâc specie *B. julaceum*, Schrad. foliis muticis obtusis, et statûrâ altiore, magis gracili, affatim dignoscitur.

16. *B. annotinum*, caule simplice ; foliis lanceolatis acuminatis erectis remotiusculis ; capsulâ oblongâ ; operculo umbonato. Sp. Musc. t. 43. DILL. t. 50. f. 68. Schrad. journ. IV. t. 3. C.

*Mnium annotinum*. L.

— in arenosis humidis.

Caules unguiculares, erecti ; folia laxè imbricata, pellucida, in surculis sterilibus linearis, in fructiferis ovato-lanceolata, brevitè acuminata, pallidè viridia, nervo fusco validiusculo concavò-carinata, sub lente reticulata, et tenuerrimè serrulata ; pedicelli, surculorum ad basin orti, sesquipollulares, carnei, erecti, supernè lenitè arcuati ; capsulae juvinales oblongæ, mox oblongo-pyriformes, pendulae, semper pallidæ, læves ; operculum convexo-conicum, obtusè umbonatum.—Foliorum color, statura major, et capsularum forma hanc stirpem a *B. carneo*, cui maxime inter species præcedentes affine, distinguunt.—*B. annotini* surculos bulbiferos, sub *Trentepohlia* nomine, pro novo genere olim esse descriptos, Botanicis satis superque notum.

17. *B. compactum*, caule simpliciculo ; foliis linear-lanceolatis acuminatis approximatis serratis erectis ; capsula obovatæ ; operculo convexo. DICKS. t. 11. f. 11.

— in paludibus.

Caules densè cæspitosi, erecti, vix unguiculares, basi denudati, fusi, simplices, vel prope radicem bifurci ; folia angustè lanceolata, longè acuminata, approximata, erecta, stricta, arctissimè imbricata, luteo-viridia, nervo crasso concolore carinata, margine incrassata, sub-revoluta, et, præsertim apices

versus, luculentè serrata, siccitate cauli appressa ; pedicelli terminales, erecti, rutilantes, nitidi, supernè paullum arcuati ; capsulae ovatæ, breves, fuscaæ, pendulae, læves, effætæ ore dilatato, turbinatae ; operculum, teste Smithio, convexum, umbonatum.—Haec species, quam cl. Dicksonus primus descripsit, a *B. bicolore*, cui proxima, foliis linear-lanceolatis serratis statim dignoscitur.

18. *B. alpinum*, caule ramoso ; foliis lanceolatis acutis confertis erectis ; capsula oblonga ; operculo convexo umbonato. DILL. t. 50. f. 64  
— in montibus.

Caules cæspitosi, sesquipollulares, fragiles, teretes, varie divisi ; rami fastigiati, stricti ; folia confertissima, arctè imbricata, insigniter atro-rubentia, nitida, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, nervo nigricante percusa, et modice carinata, tactu mollia, madore erecta, siccitate appressa, stricta ; pedicelli, surculorum ad basin orti, sub-pollicares, et ultra, surculis longiores, purpurascentes, erecti, supernè arcuati ; capsulae pedicellis concolores, oblongæ, pendulae, læves, effætæ sub-turbinatae ; operculum capsula aliquantum pallidius, obtusè umbonatum ; peristomii dentes lutei.—Caulibus elongatis, ramosis, crassioribus, habituque toto a præcedente reddit, et colore ubique atro-rubente primo visu a reliquis dignoscitur.

19. *B. turbinatum*, caule sub-simplice; foliis ovato-lanceolatis approximatis patulis; capsula pyriformi; operculo conico umbonato. St. cr. III. t. 8.  
DILL. t. 51. f. 74.

*Mnium turbinatum*. H.

— in palustribus.

Caules vix unguiculares, plerumque simplices; folia laxiusculè imbricata, obscurè fusco-rubentia, ovato-lanceolata, acuta, et brevitè cuspidata, nervo crasso nigricante carinata, madore patula, siccitate complicata, et flexuosa, perichaetalia lanceolata, acuminata; pedicelli, e surculis annotinis orti, sesquipollicares, rubentes, nitidi, erecti, supernè arcuati; capsulae pendulæ, semper pyriformes, fusco-rutilantes, læves, ore in junioribus contracto, in effœtis patulo; operculum conicum, minutè umbonatum.—Species hæc inter *B. alpinum* et *ventricosum* ferè media; ab illo, caulis brevioribus, foliis latioribus, neutiquam confertis, patulis, siccitate flexuosis, colore pallidiore, et capsulis pyriformibus, ab hoc, ut Dillenii verbis utar, “caulis surculis, et setis brevioribus, capsulis in extremitate crassioribus, et pyriformibus, foliis crebrioribus, brevioribus, profundè carinatis, in siccâ complicatis, et capillaceis,” differt.

20. *B. ventricosum*, caule sub-diviso; foliis ovato-lanceolatis acuminatis erecto-patulis; capsula oblonga;

operculo convexo umbonato. St. cr. III. t. 7.  
DILL. t. 51. f. 72.

*Mnium pseudo-triquetrum*. H.

— in palustribus.

Caules cæspitosi, jam simplices, jam proliferi, et ramosi, longitudine ab unguiculari ad sesquipollicarem variant, infernè rubro-tomentosi, supernè foliosi; folia plerumque luteo, interdum purpurascen- ti-viridia, in surculis annotinis arctè, in senioribus laxiusculè imbricata, sub-diaphana, sub lente reticulata, ovata, vel ovato-lanceolata, brevitè acuminata, madore erecto-patula, siccitate erecta, lenitè flexuosa, nervo nigricante, valido, ad apices aliquantillùm extante percursa, concavo-carinata; pedicelli, e surculis annotinis orti, ferè palmates, infernè purpurei, supernè crocei, nitidi; capsulae pallidæ, læves, oblongæ, graciles, deorsum angustatae, pendulæ, effœtæ rariùs sub-turbinatae; operculum minutissimè umbonatum.

21. *B. bimum*, caule diviso prolifico; foliis lanceolatis acutis erecto-patulis remotiusculis; capsula oblonga; operculo conico. DILL. t. 51. f. 73.

— in paludibus.

Caules cæspitosi, bipollicares, et ultra, infernè simplices, supernè in surculos plurimos, filiformes,

elongatos divisi, quâ notâ præcipue a præcedente dignoscitur; folia remotiuscula, lutescentia, lineari-lanceolata, acuta, at nequaquam acuminata, nervo nigricante, ad apices aliquantillùm extante percussa, carinata, madore erecto-patula, siccitate appressa, sub-tortilia; pedicelli et capsulæ cum *B. ventricoso* convenient, sed operculum in exemplaribus nostris conicum, acutum, nec, ut Dillenius descripsit, breve et obtusum.—Hanc stirpem esse cum præcedente conjungendam contendit Hedwigius, negant Dillenius et Swartzius; crescendi modo valde discrepant, unde pro distinctis in præsenti habere tutissimum duxi, sed, cum *B. bimum* in loco natali nunquam legerim, nihil pro certo affirmare ausim.

22. *B. hornum*, caule simplice; foliis oblongo-lanceolatis serratis patulis; capsulâ oblongo-ovatâ; operculo conico obtuso. DILL. t. 51. f. 71.

*Mnium hornum*. L. H.

— in nemorosis.

Species pulcherrima, foliis luculentè serratis statim dignoscenda.—Caules cæspitosi, erecti, ferè pollicares, basi tomento fusco obsiti, simplices; folia laxiusculè imbricata, dilutè viridia, oblongo-lanceolata, acuta, pellucida, sub lente, *Jungermaniarum* instar, reticulata, margine argutè et distinctè serrata, nervo crasso concolore modicè cari-

nata, madore patula, siccitate erectiuscula, sub-tortilia, nec rarò longitudinaliter complicata; pedicelli terminales, bipolligares, rutilantes, erecti, apices versus elegantè, colli olorini instar, arcuati; capsulæ oblongo-ovatæ, dilutè fuscae, pendulæ, læves; operculum breve, conicum, obtusum; flores masculi discoidei, terminales, foliis rosaceè expansis cincti, valdè conspicui.

23. *B. marginatum*, caule simplice; foliis ovato-lanceolatis obsoletè serratis remotiusculis patulis; capsulâ ovatâ; operculo rostrato. DICKS. t. 5. f. 1.

*B. serratum*. Schrad.

— in nemorosis alpinis.

Caules cæspitosi, sesquiunguiculares, erecti, simplices, infernè nudi, supernè foliosi, rufo-fusci; folia remotiuscula, saturatè viridia, infima ovato-lanceolata, acuta, superiora magis angusta, omnia margine incrassata, et obsoletè serrata, ut non rarò sub-integra videantur, nervo crasso nigricante percussa, carinata, sub lente reticulata, madore patula, siccitate lenitè tortilia; pedicelli terminales, unguiculares, dilutè rubri, apice arcuati; capsulæ ovatæ, pendulæ, læves, pedicellis concolores; operculum conicum, rostro brevi, recurvo; flores masculi discoidei, terminales, foliis rosaceè expansis cincti.—Hanc stirpem in saltu, *Dargle dicto*, detexit am. Stokes. Schraderi synonymon exem-

plarium ab ipso missorum fide protuli ; et plantulae adhuc parum cognitae lucem aliquam offundere magnoperè sum gavisus. *Mnium stellare*, H. (Sp. Musc. t. 45. f. 1—4) huc quoque citâssim, ni opereulum convexum vetaret.—*B. marginatum* inter *B. hornum* et *crudum* stat quasi medium : ab hoc, foliorum formâ, texturâ, situ, et colore, ab illo, saturâ ubique minore, foliisque non nisi obsoletè serratis, ab utroque, operculo rostrato differt. Foliorum margo incrassatus, unde nomen specificum duxit Dicksonus, est in plantâ siccâ maximè conspicuus.

24. *B. crudum*, caule simplice ; foliis lanceolatis subdistichis patulis, summis serrulatis ; capsula oblonga ; operculo convexo. St. cr. I. t. 37. DILL. t. 51. f. 70.

*Mnium crudum*. L. H.

— in rupibus.

Caules cæspitosi, unguiculares, erecti, simplices, infernè nudi, supernè foliosi ; folia approximata, imbricata, ferè disticha, dilutè viridia, nec rarò albescentia, pellucida, nitida, inferiora ovato, summa linear-lanceolata, margine minutissimè et abnormiter serrulata, omnia acuta, nervo ejusdem ferè coloris percursa, modicè concavo-carinata, siccitate æquè atque madore patula et stricta ; pedicelli terminales, pollicares, erecti, supernè leviter cur-

vati, rubri ; capsulae pallidæ, rubentes, oblongæ, læves, horizontales, vix pendulæ ; operculum convexus ; calyptra recurvata.—Foliorum color et nitor in hâc specie perquam notabiles.

25. *B. cuspidatum*, caule simplice ; foliis ovatis apiculatis serratis patulis ; capsula ovatâ ; operculo conico acuto. Sp. Musc. t. 45. f. 5—8. DILL. t. 53. f. 79.

*Mnium cuspidatum*. H.

*Mnium serpyllifolium*. B. L.

Planta polymorpha : caules capsuliferi erecti, simplices, sub-pollicares, infernè tomento fusco obsiti, supernè foliosi, foliis ovato-lanceolatis, apiculatis, margine serratis, decurrentibus, dilutè viridibus, pellucidis, sub lente reticulatis, nervo rubente percursis, infimis remotiusculis, summis rosæ in modum expansis, vestiti ; caules steriles plerumque decumbentes, bi-tri-pollicares, simplices, vel ad apices bifurci, rariùs erecti, proliferi, folia habent præcedentibus similia, sed late ovata, disticha, remota, alterna : folia omnia madore patula, siccitate undulata, et leniter crispata, nervusque ad apices extans, cuspidem brevissimum effingit ; pedicelli terminales, solitarii, sesquipollicares, dilutè crocei, erecti, apice aliquantillùm incurvati ; capsulae ovatæ, vel oblongo-ovatæ, pendulæ, luteæ, læves ; operculum cap-

sulis concolor, breve, conicum, acutum.—Folia cuspidata, serrata, hanc stirpem a congeneribus distinguunt.—*B. rostratum*, Schrad. (DILL. t. 53. f. 8o) foliis sub-integris, operculoque rostrato dignoscitur.

26. *B. punctatum*, caule simplice; foliis obovatis obtusis integerim patulis; capsulâ ovatâ; operculo cuspidato. DILL. t. 53. f. 81. E. B. XVII. t. 1183.

*Mnium serpyllifolium*.  $\alpha$ . L.

*Mnium punctatum*. H.

— in umbrosis.

Caules erecti, sub-pollicares, simplices, raro ad apices proliferati, inferne fusco-tomentosi; folia in surculis sterilibus alterna, disticha, remota, in fertilibus approximata, summa rosæ in formam expansa, omnia obovata, vel subrotunda, dilatè fuscescentia, obtusata, pellucida, mirè vasculosa, ut punctata videantur, nervo fusco valido percursa, plano-concava, margine undulata, incrassata, integerrima, siccitate sub-tortilia; pedicelli sub-solitarii, terminales, pollicares, crocei, nitidi, apices versus incurvi; capsulae obscurè fuscae, ovatae, pendulæ, læves; operculum conicum, rostro exiguo, subulato, incurvo.

27. *B. roseum*, caule simplice, prolifero; foliis spatulatis

apiculatis, apicem versus serratis; capsulâ oblongâ; operculo convexo. DILL. t. 52. f. 77.

*Mnium roseum*. H.

*Mnium serpyllifolium*.  $\gamma$ . L.

— in sylvis.

Caules simplices, erecti, bipollicares, in eâdem linea prope apices congesta, rosæ in formam expansa, latè viridia, longè spatulata, multo majora quam in speciebus duabus antecedentibus, sub lente reticulata, margine incrassato, integerrimo, nisi juxta apices, ubi minutissimè et argutè sunt serrata, nervo fusco, valido, paullum superante, brevitè cuspidata, madore patula, siccitate undulata; pedicelli visu rarissimi, unguiculares, punicei, terminales, sub-solitarii, erecti, supernè paullum incurvi; capsulae obscurè lutescentes, oblongæ, pendulæ, læves; operculum, teste Dillenio, obtusum, rubens.—Caules inferne nudi, foliis magnis latè viridibus ad apices coronati, hanc speciem satis a congeneribus distinguunt.

28. *B. undulatum*, caule prolifico ramoso; foliis oblongis undulatis serratis; capsulâ ovatâ; operculo convexo. DILL. t. 52. f. 76.

*Mnium serpyllifolium*.  $\delta$ . L.

*Mnium undulatum.* H.

*Bryum ligulatum.* Swartz.

— in sepibus.

Crescendi modo cum specie antepenultimâ convenit. Caules capsuliferi erecti, bipollicares, ad apices proliferi, steriles palmares, et ultra, decumbentes, sâpè ramosi; folia omnia longa, angusta, ligulata, dilatè viridia, nervo crasso fusco-viridi percursa, et modicè carinata, undulata, sub lente reticulata, margine evidentè argutè serrata, siccitate crispula, in surculis sterilibus alterna, remota, disticha, in fructiferis infima remotiuscula, summa rosæ in formam expansa; pedicelli terminales, aggregati, sub-pollicares, e croceo purpurei, nitidi, erecti, apice paullum arcuati; capsulae ovatae, vel-oblongo-ovatae, luteæ, pendulae, lœves; operculum breve, convexum, obsoletè et obtuse umbonatum.—Hanc speciem cum præcedentibus tribus, sub *Mnii serpyllifolii* nomine, conjunxit Linnæus, distinctissimas tamen semper et ubique reperi.

21. **HYPNUM.**\* SCHREB. Gen. Pl. n.

1656. HEDW. Fund. II. p. 94.—**LESKEA.** SCHREB. Gen. Pl. n. 1657. HEDW. Fund. II. p. 93. t. 10. f. 62—65.

*Caps. oblonga.* Perist. duplex: exterius dentibus sedecim, latiusculis; interius membrana laciniata. *Fl. fæminei* laterales.

§ Capsulis erectis.

a) Surculis teretibus.

1. *H. subtile*, caule repente ramosissimo; ramis filiformibus; foliis lanceolatis acuminatis enervibus remotiusculis; operculo conico. St. cr. IV. t. 9.

*Leskeia subtilis.* H.

— ad arborum radices.

\* LESKEAS, H, quibus peristomium internum in lacinias sedecim aquales partitum, cum HYPNIS, quibus peristomium internum in lacinias totidem, capillaribus interjectis, finditur, Schreberus licet Swartziusque abnuant, conjunxi; habitus enim crescendique modus omnibus idem, peristomique interni differentiae, nunquam nisi ægrè detegenda, nimis subtiles, ut ad genera stabilienda solæ sufficiant, mihi videntur.

Caules prostrati, repentes, cæspitosi, filiformes, densissimè implexi; rami erectiusculi, gracillimi, fili emporetici minoris crassitie, bi-tri-pollicares, sœpè divisi; folia laxè imbricata, lutescentia, angustissima, siccitate setacea, prorsus enervia, patula; pedicelli unguiculares, et ultra, erecti, rubri; capsulæ cylindraceæ, erectæ, maturæ levissimè inclinatae; operculum exactè conicum, breve.—Hæc species *H. serpenti* est ita similis, ut, nisi capsulifera et in loco natali observata, vel sagacissimos fallat; capsulæ erectæ, et folia nervo omnino destituta discriminem certissimum præbent.

2. *H. pulchellum*, caule erecto; ramis sub-fasciculatis simplicibus; foliis lanceolatis acuminatis enervibus sub-secundis; operculo conico. Dicks. t. 5. f. 6. Sp. Musc. t. 55. f. 7—12.

*Leskeia pulchella*. H.

— in umbrosis.

Caules unguiculares, furcati, vel in ramos aliquot simplices, teretes, fasciculatos, fastigiatos divisi; folia lutescentia, siccitate appressa, nitida, approximata, undique imbricata, erecta, vel paullum falcata, concava, acutissima, prorsus enervia; pedicelli, surculorum basin versus orti, sesquiunguiculares, flavi; capsulæ juniores oblongæ, erectæ; maturæ obovatae, sub-obliquæ; operculum breve, conicum.—Folia in Dicksoni iconæ nervo instruuntur, quod a vero abhorret.

3. *H. polyanthus*, caule repente ramosissimo; ramis sparsis; foliis lanceolatis acuminatis enervibus imbricatis; operculo rostrato. St. cr. IV. t. 2. DILL. t. 42. f. 62.

*Leskeia polyantha*. H.

*Hypnum filiforme*. Huds.

β. *gracile*; caule tenuissimo sub-simplice teretiusculo.

— in truncis arborum.

Caules implexi, decumbentes, repentes, bi-tri-pollicares; rami sub-pinnatim sparsi, filiformes, teretes, erecti, breves, simplices, apice aliquantulum curvi; folia lutescentia, erecto-patula, rarius sub-secunda, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, in apicem subulatum, ferè piliformem desinentia, concava, enervia, siccitate appressa, nitida; perichaetalia longa, lanceolata; pedicelli e caule repente orti, unguiculares, rubentes, erecti; capsulæ oblongæ, vel oblongo-cylindraceæ, erectæ, fuscae, laevæ; operculum in exemplaribus nostris Britannicis rostratum, acutum, in quibusdam e Germaniâ acceptis brevius, ferè conicum.—Var. β, caulis tenuissimis, filum crassitie vix superantibus, minus quam in α ramosis, teretiusculis, speciem distinctam mentitur, et *H. cylindricum*, Dicks. tantum refert, ut, nisi folia attentè observentur, eadem videatur.—Staturâ majore, cres-

cendi modo diversissimo, ramisque duplò crassi-  
oribus, hæc species statim a præcedente dignos-  
citetur.—Variat foliis lætè et intensè viridibus.

4. *H. sericeum*, caule repente; ramis sub-fasciculatis  
erectis; foliis lanceolato-subulatis striatis imbrica-  
tis erectis; operculo conico. St. cr. IV. t. 17.  
DILL. t. 42. f. 59.

*Leskea sericea*. H.

— in muris et arboribus.

Caulæ decumbentes, implexi, palmares, et ultra,  
repentes, ramosissimi; rami vagi, teretes, sæpius  
fasciculati, nunc simplices, nunc ramulis brevibus  
sparsim pinnati, erecti, siccitate incurvi; folia  
conferta, arctè imbricata, e basi lanceolatâ longè  
acuminata, luteola, serici instar splendentia, infima  
rubiginosa, striis tribus, media longissimâ, notata,  
siccitate æquè ac madore erecta; perichætialia an-  
gusta, linearì-lanceolata, apice piliformia, enervia;  
pedicelli sub-unguiculares, erecti, purpurascentes,  
tuberculis minutis scabri; capsulæ ex ovato cylindri-  
draceæ, ore coarctatae, dilutè fuscae, erectæ, læves;  
operculum longè conicum, acutum, apice sæpe  
aliquantulum curvum.—Ab *H. lutescente*, quocum,  
capsulis deficientibus, confundatur periculum est,  
ramis fasciculatis affatim dignoscitur.

5. *H. dendroides*; caule erecto nudo; ramis fasciculatis

terminalibus; foliis oblongis uninervibus erecti-  
usculis; operculo rostrato. DILL. t. 40. f. 48.

*Leskea dendroides*. H.

*Neckera dendroides*. Swartz. Brid.

— in pratis.

Caulæ sub-solitarii, erecti, fuscæ, rigidi, stricti,  
nudi, vel squamulis sparsis aridis instructi, bi-  
pollicares, infernè simplices, mox sæpe bifurci,  
apices versus ramis plurimis, sub-simplicibus, fas-  
ciculatis, teretibus, fastigiatis obsiti; folia lutes-  
centi-viridia, approximata, undique imbricata, con-  
cava, oblonga, obtusiuscula, apices versus sub lente  
argutè serrata, nervo tenui concolore percursa, ma-  
dere erecto-patula, siccitate appressa; perichætia-  
lia circa pedicellum convoluta, ovato-lanceolata,  
acuminata, enervia; pedicelli, visu rarissimi, ramo-  
rum ad basin orti, erecti, rubri, pollicares; capsu-  
lae ellipticæ, graciles, basi constrictæ, erectæ, dilu-  
tè fuscae; operculum amœnè rubrum, rostro brevi,  
acuto, plerumque leniter incurvo; peristomii in-  
terni dentes ad basin ferè divisi; hinc inter *Hypna*  
et *Neckeras* ambigua est hæc species.—Varietatem,  
caulibus ramisque repentibus, *H. ruscifolium* quo-  
dammodo referentem, ad fossarum margines in pa-  
ludibus vidi.

6. *H. curvatum*, caule repente; ramis sub-fasciculatis;  
foliis oblongo-ovatis integerrimis medioteñis uni-

nervibus concavis; operculo rostrato. St. cr. IV.  
t. 8. DILL. t. 41. f. 50.

*H. myosuroides*. H.

*H. myurum*. BRID.

*H. myosuroides*. β. Huds.

— ad arborum radices.

Caules repentes, implexi, bipollicares, et ultra, basin versus sæpè nudi; rami erecti, iterum atque iterum fasciculato-divisi, rariùs sparsi, teretes, utrinque attenuati, incurvi; folia undique laxè imbricata, dilutè viridia, oblongo-lanceolata, vel elliptica, acutiuscula, integerrima, nervo tenuissimo, concolore mediotenùs notata, madore erecta, coniventia, siccitate appressa, semper insignitè concava; perichaetalia erecta, lanceolata, acuminata, breviuscula, enervia; pedicelli copiosi, sesquipollicares, aurantiaci; capsulae ovatae, erectæ, fuscæ, læves; operculum conicum, rostro capsulae ferè longitudine, subulato, incurvo.—Hæc species inter *H. dendroides* et *alopecurum* est quasi media: ab hoc, capsulis semper erectis, ab illo, colore dilutè viridi, ab utroque, caule repente, ramisque incurvis, ut alia taceam, primo intuitu differt.—Folia obscurè serrulata dixit cl. Bridelius, integerrima tamen semper vidi.

7. *H. myosuroides*, caule repente; ramis sub-fasciculatis foliis lanceolatis acuminatis serrulatis medio-

tenus uninervibus; operculo rostrato. DILL. t.  
41. f. 51.

*H. myosurum*. Schrad.

— in saxis.

Præcedenti, quoad crescendi modum, caulem, ramosque, perquam simile, sed duplò minus: color saturatiùs viridis, interdum lutescens; folia angustiora, minus concava, lanceolata, nec elliptica, acuminata, sub lente manifestè serrata, nervo conspicuo fuscescente mediotenùs notata; perichaetalia reflexo-patula, lata, ovata, enervia, complicato-carinata, apice longo, piliformi; capsulae sub-cylindraceæ, juniores erectæ, maturæ inclinatae, sub-cernuæ, fuscæ, læves; operculi rostrum, ut in *H. curvato*, incurvum.—Dillenii iconem supra allatam fide sui herbarii citavi, sed mira inter autores de hâc stirpe et præcedente confusio, ut synonyma difficillimè extricentur: sunt tamen naturâ distinctissimæ, et vel primo intuitu longè dissimiles.—DILL. t. 41. f. 52. (*H. murale*, Dicks.) quam Hudsonus pro hujus speciei varietate in Florâ Anglicâ descriptis, toto cælo differt.

8. *H. nigro-viride*, caule procumbente sub-pinnato; foliis ovatis acuminatis concavis enervibus sub-secondis; operculo brevitè rostrato. DILL. t. 41. f. 53.

*H. myosuroides*. δ. Huds.

— humi in sylvis.

Caulis pollicares, et ultra, procumbentes, densè implexi, ramosissimi; rami conferti, vagè pinnati, erecti, breves, simplices; folia nigro-viridia, siccitate splendentia, densè imbricata, e basi ovatâ longè acuminata, ut pilifera ferè videantur, prorsus enervia, omnia sursùm spectantia, unde rami infernè compressi, madore erecto-patula, siccitate erecta; perichaetalia oblonga, acuminata, enervia; pedicelli sub-pollicares, rubentes; capsulæ oblongo-ovatæ, rufo-fuscæ, erectæ, maturitate levitè inclinatae; operculum, teste Dicksono, brevitè rostratum.—*H. mutabile*, Brid. (III. t. 6. f. 1.) cum hæc specie, sicut ipse suspicatur, conjungendum putarem, ni folia nervo valido percursa vetarent. Dillenium hunc muscum *H. myosuroidi* proximum collocasse, Hudsonumque pro varietate illius habuisse sane miror; mihi enim *H. cypressiformi* magis affinis videtur, et ne cum ejus stirpis varietibus commisceatur est cavendum.

9. *H. medium*, caule repente; ramis procumbentibus; foliis ovatis acutis concavis uninervibus erectis; operculo conico. DILL. t. 42. f. 65. E. B. XVIII. t. 1274. BRID. III. t. 1. f. 3. et t. 6. f. 3.

*Leskea polycarpa*. H.

— in arborum truncis.

Caulis unguiculares; variè implexi, decumbentes, repentes; rami abbreviati, graciles, filifor-

mes, conferti, procumbentes, vel erectiusculi, iterum atque iterum vagè divisi; folia densè imbricata, ovata, vel ovato-lanceolata, nervo nigricante sub apicem evanescente instructa, madore saturatè sed lätè viridia, erecta, concava, incurva, siccitate obscura, appressa; perichaetalia oblongo-lanceolata, albantia, enervia; capsulæ cylindraceæ, graciles, erectæ, luteolæ, maturitate oblīquæ; operculum, e speciminibus Smithianis, breve, conicum, obtusiusculum.—Habitu formâque hæc species cum sequente convenit, sed loco natali, ramis confertis, duplò tenuioribus, et foliorum figurâ, nervo que differt. Cum *H. serpente*, teste Dicksono, conjunxit Weherus, hujus autem folia sub-enervia, color dilutè viridis, capsulæ cernuæ.

10. *H. inundatum*, caule repente; ramis erectis; foliis ovatis concavis obsoletè uninervibus sub-secondis; operculo conico. ST. CR. IV. t. 1. DILL. t. 37. f. 27. B.

*Leskea paludosa*. H.

— in udis.

Caulis sub-pollicares, procumbentes, repentes, implexi, ramosissimi; rami graciles, abnormiter sparsi, erecti, teretes, sub-simplices; folia latè ovata, obtusiuscula, obscurè viridia, Iurida, undique imbricata, remotiuscula, erecto-patula, concava, in ramis junioribus sub-secunda, nervo te-

nuiissimo, concolore, vix conspiciendo percursa; perichaetalia linear-lanceolata, albicantia, striis plurimis profundè exarata; pedicelli e caule decumbente orti, sub-pollicares, erecti, flavescentes; capsulae cylindraceæ, graciles, erectæ, fuscæ, maturitate obliquæ; operculum breve, conicum, rubrum. Ab *H. palustri*, L, a quo primus disjunxit vi detur cl. Hedwigius, foliis dissitis, neutiquam falcatis, capsulâ erectâ, gracili, peristomii interni structurâ, operculique formâ differt.—Dillenii synony mon accuratissimi Smithii fide protuli.

*b) surculis planis; foliis bifariam positis.*

11. *H. complanatum*, caule repente pinnato; foliis ova-to-oblongis apiculatis complicatis enervibus; operculo rostrato obliquo. DILL. t. 34. f. 7. BRID. III. t. 1. f. 2.

*Leskea complanata*. H.

— in truncis arborum.

Caulis palmates, spilhamæi, et ultra, procumbentes, arborum cortici arctè adhærentes, plani, pinnatim ramosi; rami oppositi, alternique, plani, plerumque iterum pinnati, apice attenuati, et in fila, foliis minutis, capillaribus, vix, nisi lente, conspicendiis, obsita, abeuntis; folia disticha, patula, approximata, imbricata, pallidè sed latè viridia, tenuia, integrerrima, apice rotundato obtusa,

mucrone minutissimo, enervia, siccitate nitida; perichaetalia angusta, linearia, apice piliformi, erecta, appressa, nervo destituta; pedicelli vix trilineares, erecti, crocei; capsulae ellipticæ, fuscæ, laeves; operculum e basi conicâ, rostratum, incurvum, acutum.—Varietatem hujus musci terrestrem, apud Howth lectam, colore intensius viridi, caule erecto, vix sesquiuinculari, vagè diviso, ramisque omnibus apice obtusis, misit D. Scott.

12. *H. trichomanoides*, caule procumbente pinnataramoso; foliis acinaciformibus obtusis complicatis enervibus; operculo rostrato obliquo. DILL. t. 34. f. 8.

*Leskea trichomanoides*. H.

*H. complanatum*. f. Huds.

— in truncis arborum.

A præcedente, quocum plurimi auctores con junxerunt, et cui habitu, crescendi modo, et colore simillimum, plurimis notis differt; caules duplo breviores, rami minus regulariter pinnati, apice obtusi, nunquam fibrillosi; folia arctius imbricata, superne convexa, inferne concava, sub-recurva, et, ut Swartzii verbis utar, "oblongo-sub-lunulata," sub lente, quod nemo adhuc observasse videtur, tenerrimè serrulata; perichaetalia brevia, ovato-ob longa, basi lata, concavo-complicata, apice reflexa, enervia; capsulae tenuiores, sub-cylindraceæ; pe-

dicelli ferè unguiculares; operculum longius acuminatum.

§§ *Capsulis cernuis.*

a) *Surculis planis; foliis bifariam positis.*

13. *H. denticulatum*, caule sub-simplice; foliis ovatis apiculatis enervibus integerrimis approximatis; capsula oblonga; operculo conico. St. cr. IV. t. 31. DILL. t. 34. f. 5. E. B. XVIII. t. 1260.

— humi, in umbrosis.

*P. sylvaticum*; foliis ovato-lanceolatis remotiusculis; operculo rostrato. T. 12. f. 1. DILL. t. 34. f. 6. BRID. t. 1. f. 5.

*H. sylvaticum*. L.

— in sylvis.

*y. obtusifolium*, foliis arcte imbricatis obtusis, mediocrenatis obsoletè uninervibus. T. 12. f. 2.

— in rupibus.

Forma et magnitudine mirè ludit hic muscus: caules procumbentes, depresso, plerumque vix semi-unguiculares, simplices, interdum ferè pollicares, bis, ter divisi; folia concava, pallide viridia, siccitate nitida, ovata, aut ovato-lanceolata, obtusiuscula, brevitè apiculata, disticha, horizontaliter patula, densè, et dupli ferè ordine imbricata, enervia, sub lente reticulata; perichætalia ovato-

lanceolata, acuminata; pedicelli sesquipollicares, erecti, rubri, surculorum prope basin orti; capsulae erectiusculæ, vel cernuæ, nec raro falcato-incurvæ, oblongæ, graciles, fuscæ; operculum conicum, apice acuto, plerumque depresso, longitudine perquam vario.— $\beta$  caules habet erectos, vel prostratos, sæpius pollicares, simplices, sed non raro elongatos, sub-palmares, dichotomos; operculi apex plerumque in rostrum producitur, hoc autem incertum, in exemplaribus enim a Swartzio missis ad amissim conicus reperitur; foliorum color non minus e luteolo ad saturatè viridem variabilis; nec eorum dispositio simplex remotiuscula, aut forma ovato-lanceolata immutabilis; semper tamen, quantum adhuc vidi, multò luculentius quam in  $\alpha$  sub lente reticulata apparent.—Hisce omnibus perpensis, exemplaribusque, cum in Herbario Dilleniano, tum a Swartzio, Hedwigio, Dicksonoque missis, cautè observatis, *H. sylvaticum* pro varietate tantum in praesenti habere tutissimum judicavi, icone simul adjectâ, ut si Botanici sagaciores aliter putent, per me liceat.—Huc quoque, fide sui herbarii, DILL. t. 34. f. 9 (*H. ornithopodioides*, L.) certissimè referenda, exemplaria licet, capsulis omnino carentia, figuræ vix respondeant.— $\gamma$ , ob foliorum formam, nervumque sub lente ad basin conspiciendum, specie forsan revera discrepat; capsulae quoque magis quam in  $\alpha$  et  $\beta$  graciles, et incurvæ; operculum longum,

caules erectiusculi, sub-simplices, foliorum color lutescens. Hanc varietatem in summo montis Bullein jugo ab oculatissimo D. Brown lectam, benignè communicavit D. Templeton.

14. *H. serrulatum*, caule ramoso ; foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis mediotenuis uninervibus confertis patulis ; operculo rostrato. Sp. Musc. t. 60. E. B. XVIII. t. 1262. Dicks. t. 11. f. 14.

*H. confertum*. Dicks.

*H. clavellatum*. Huds.

— humi, in sylvis.

Præcedenti, primo visu, simillimum ; sed foliis minoribus, angustioribus, minus regulariter distichis, serratis, nervo crasso ad medium percurrente instructis, operculoque longo rostrato differt.— Caules ferè pollicares, ramis brevibus pinnati ; folia conferta, saturatè viridia, sub lente obsoletè reticulata, modicè concava ; perichaetalia ovata, apice longo piliformi, reflexo, enervia ; pedicelli plerumque radicales, unguiculares, maturitate rufescentes ; capsulae viridi fuscæ, cernuæ ; operculi rostrum longum, rectum, incurvumque.—Dicksoni synomon supra allatum fide exemplarium ab ipso nuperrimè missorum protuli.—Ab hâc specie *H. crenulatum* (E. B. XVIII. t. 1261.) nova species a D. Winch paullo ante detecta, saturâ duplò ma-

jore, foliorum nervo ad apices ferè percurrente, operculoque conico differt.

15. *H. latè-virens*, caule pinnato ; foliis oblongo-spatulatis acutis serratis uninervibus ; operculo planiusculo. T. 13. Fl. Carn. II. t. 62 ?

*H. rotundifolium*. Dicks.

— in arboribus.

Caules sub-palmates, simpliciusculi, foliis plurimque denudati ; rami distichi, sparsi, plani, simplices ; folia amœnè viridia, vix concava, disticha, laxè imbricata, oblongo-spatulata, acuta, margine serrata, nervo concolor ad apices evanescente instructa ; perichaetalia brevia, latè ovata, acuta, circa pedicellum convoluta ; pedicelli vix unguiculares, pallidè crocei, errecti ; capsulae oblongæ, graciles, incurvæ ; operculum brevissimum, minutè apiculatum.—Scopolii iconem supra laudatam, Dicksoni auctoritate fretus, citavi, sed cum operculum longè rostratum depinxerit, huc esse referendam persuadere mihi nequeo ; quâ de re, consentiente am. Smithio, novo nomine hæc planta insignitur.—Exemplaria Dicksoni, cuius descriptio nimis brevis dubitationum ansas dedit, cum nostris a cel. Scott ex Hiberniâ missis contuli. *H. fasciculatum*, Swartzii, *H. rotundifolium* nimis affine videretur, nisi folia decussata, ramique fasciculati distinguerent, *H. rotundifolium*, Fl. Bedf. specie ab

hoc longè discrepat, et est forsitan *H. ruscifolii* varietas.

16. *H. Teesdalii*, caule ramosissimo; foliis linear-lanceolatis remotiusculis integerrimis uninervibus horizontaliter patulis; operculo rostrato incurvo. E. B. III. t. 202.

*H. intricatum* E. B. (excl. syn. Schreberi.)

— in arboribus.

Caules decumbentes, repentes, densissimè implexi, filiformes, ramosissimi; rami erectiusculi, breves, sub-simplices; folia laxè imbricata, disticha, horizontaliter patula, plerumque alterna, saturatè viridia, lanceolata, vel linear-lanceolata, acuta, integerrima, nervo fusco percursa, concaviuscula; perichaetalia ovata, acuminata, perquam brevia, nervo omnino carentia; pedicelli unguiculares, rufescetes, erecti, tuberculis minutis scabri; capsulae cernuae, ex ovato urceolatae, fuscæ, læves; operculum luteum, e basi convexâ brevitè rostratum, rostro capsula duplò breviore, aliquantulum curvo, acuto.—Cùm hæc species ab *H. intricate*, Schreb. (quod *H. Teesdalii*, Dicks.) longè discrepet, et a nemine, quantum scio, adhuc sit descripta, amicissimi Smithii, a quo *H. Teesdalii* est nuncupata, nomen ascivi. *H. tenello*, Dicks. proximè accedit, sed foliis distichis, uninervibus, latioribus, siccitate nequaquam splendentibus, dignoscitur.

- + 17. *H. Swartzii*, caule ramosissimo; foliis remotis ovatis serrulatis uninervibus horizontaliter patulis; operculo rostrato incurvo. T. 14. f. 1.

*H. atro-virens*. Swartz.

- β. minus*; caule tenuissimo filiformi. T. 14. f. 2.

— in arboribus.

Caules palmates, et ultra, procumbentes, ramosissimi; rami pinnatim sparsi, erectiusculi, breves, sub-simplices; folia ovata, acuta, atro-virentia, rarius lutescentia, sub lente minutissimè serrulata, nervo crassiusculo, concolore, apices versus evanescente instructa, planiuscula, bifariam imbricata, remota, semper, vel sicca, horizontaliter patentia; perichaetalia e basi ovata, complicato-carinata, longè acuminata, reflexa, albiantia, enervia; pedicelli e caulinibus decumbentibus orti, vix unguiculares, tuberculis exiguis scabri, erecti, rufo-fusci, nitidi; capsulae ovatae, cernuæ, fuscantes, læves; operculum luteum, e basi convexâ rostratum, rostro incurvo, subulato; nec calyptram nec peristomium vidi.—Hanc speciem pulcherrimam Holmiæ in horto suo primus detexisse videtur cl. Swartzius, qui pro *H. atro-virente*, Dicks. in *Muscis Sueciæ* descriptis, et cuius nomine, ob plurima de re herbariæ optimè merita, plurimaque in me benevolentiae pignora, insignivit. In Hiberniæ prope Eblanam legit D. Stokes. Differt ab *H. atro-virente*, foliis bifariam distribu-

tis, remotis, serrulatis, horizontalibus, nervo instructis, et a specie præcedente, foliis ovatis, serratis.—Var  $\beta$ , quam in Hiberniâ septentrionali legit D. Scott, caulis duplò gracilioribus, ferè capillaribus, foliisque sub lente evidentiū reticulatis dignoscitur.

18. *H. riparium*, caule ramoso ; foliis ovatis acuminatis integerrimis uninervibus remotiusculis ; operculo convexo-conico. St. cr. IV. t. 3.

— in fluviorum ripis.

Caules decumbentes, repentes, interdum fluitantes, palmares, et ultra, irregulariter pinnatim ramosi ; rami quoque decumbentes, plerumque simplices ; folia laxè imbricata, disticha, patula, saturatè viridia, e basi latè ovatâ acuminata, nervo crassiusculo, prope apices evanescente instructa, concava ; perichaetalia brevia, lanceolata, enervia, erectiuscula, apicibus modo reflexo-patulis ; pedicelli e caulis orti, erecti, rubentes, vix pollicares ; capsulae cernuæ, oblongæ, mature atro-rufæ ; operculum, ex Hedwigii icone, convexo-conicum, acutum.—Iconas in DILL. t. 40. f. 44. B. C. D. notatas, ad hanc stirpem esse referendas censet cl. Smithius ; mihi tamen exemplaria Dilleniana perlustranti omnes ad *H. ruscifolium* pertinere sunt visæ, quare sub illâ specie citantur ; verosimillimum autem est me in errore versari.

19. *H. ruscifolium*, caule ramoso ; foliis ovatis acutis uninervibus sub-distichis serrulatis ; operculo rostrato recurvo. St. cr. IV. t. 4. DILL. t. 38. f. 41. t. 40. f. 44.

*H. riparioides*. H.

— *rusciforme*. BRID.

— *ruthabulum*. &. HUDES.

$\beta$ . *prolixum* ; caule elongato teretiusculo ; pedicellis abbreviatis. DILL. t. 38. f. 32. t. 85. f. 20.

*H. prolixum*. DICKS.

— in saxis in fluviis.

Ab *H. ripario*, cui perquam affine, foliis sub lente tenerrimè serrulatis, et operculi rostro elongato, lenitè recurvo differt. Color, habitusque idem, sed species hæc summoperè polymorpha, et surculis, nunc fasciculatis, ferè spithamæis, sub-simplicibus, teretiusculis, nunc abbreviatis, vagè ramosis, nunc sparsim pinnatis, pro loco natali, variat.—Caules basin versus plerumque denudati ; folia laxiusculè imbricata, vix disticha, concava, latè ovata, acuta, nervo obscurō, juxta apices evanescente instructa, siccitate nitida ; perichaetalia oblongo-lanceolata, longè acuminata, enervia, apice reflexa ; pedicelli surculorum prope basin orti, breves, erecti, apice interdum arcuati, rubescentes ; capsulae cernuæ, vel pendulæ, oblongo-ovatae, fuscae ; operculum pallidum, rostro capsu-

lā duplō breviore.—Var β, quæ in aquā fluitat, ramis sub-spithamæis, ferè teretibus, simpliciusculis, foliisque undique imbricatis differt.—Exemplar, quod ad hanc, ut videtur, speciem referri debet, cui folia luteo-viridia, integerrima, a D. Scott accepi. Capsulæ nullæ aderant, unde nihil de illo certi proferre ausim.—Mira inter auctores de *H. ripario* et *ruscifolio* confusio, ut synonyma difficilimè extracentur. Omnes ferè tres ex his species construxerunt, et Bridelius quatuor, sed, annon hæ duæ in se invicem transeant, potius suspicandum mihi videtur. Operculi longitudo certè non semper eadem, et folia, quibus incisuræ tam obsoletæ fuerunt, ut vix vel lente acerrimâ discerni possent, vidi.—Utinam sanè rei botanicæ peritiores hæc dubia solverent.

20. *H. undulatum*, caule procumbente ramoso; foliis lanceolatis undulatis enervibus; capsulâ cylindracâ sulcatâ; operculo rostrato. DILL. t. 36. f. 11. E. B. XVII. t. 1181.

— in umbrosis.

Species pulcherrima, *Hypnum* reliquorum valdè dissimilis, et in muscorum dispositione naturali *Neckeræ crispa* potius associanda.—Caules procumbentes, repentes, palmares, et ultra, lati, plani, ramis vagis, elongatis, planis, remotis sub-pinnati; folia albescens, nitida, densè imbricata, disticha,

compressa, concava, rugis plurimis transversè, præsertim siccitate, undulata, prorsùs enervia; perichaetalia ovato-lanceolata, acuminata, albida, patula, basi complicato-carinata; pedicelli bipollicares, dilutè purpurascentes, supernè aliquantum curvatae; capsulæ cylindraceæ, vel oblongo-cylindraceæ, sæpe leniter arcuatæ, nutantes, fuscæ, siccitate sulcatæ; operculum capsulâ plus duplo brevius, e basi conicâ in rostrum gracile, acutum, rectiusculum producitur.—Capsulâ sulcatâ hæc species a reliquis *Hypnis* Britannicis, secundum cl. Smithii observationes, differt: statuâ magnâ, foliisque albidis semper dignoscitur.

21. *H. lucens*, caule erectiusculo sub-ramoso; foliis obovatis reticulatis enervibus horizontalibus; capsulâ ovatâ; operculo rostrato. DILL. t. 34. f. 10.

— in umbrosis udis.

Caules nunc sesquipollicares, nunc ferè palmares, plerumque errecti, plani, tres lineas lati, perquam fragiles, simplices, vel ramo uno alteroque brevi simplice vagè pinnati; folia laxè imbricata, dilutè viridia, nitentia, plana, disticha, horizontaliter patula, obovata, vel oblongo-ovata, obtusiuscula, nervo destituta, diaphana, sub lente pulcherrimè reticulata; perichaetalia valdè exigua, albicantia, ovata, et, sicut caulina, reticulata; pedicelli polli-

cares, atro-rufi, supernè arcuati; capsulæ ovatae, abbreviatæ, pendulae, laeves, atro-purpureæ; operculi rostrum rectiusculum, acuminatum.—Cavendum est ne steriles hujus plantæ surculi, ob folia mirè vasculosa, *Jungermanniis* annumerentur.

b) *surculis planis; foliis undique imbricatis.*

22. *H. splendens*, caule bipinnato; foliis ovatis concavis apiculatis enervibus appressis; capsula ovata; operculo curvirostro. Sp. Musc. t. 67. f. 6—9. DILL. t. 35. f. 13.

*H. parietinum*. Huds.

*H. proliferum*. BRID.

— in sylvis et ericetis.

Caules decumbentes, palmates, et ultra, incrementis annuis proliferi, rigiduli, basin versus nudi, simplices, superne ramis plurimis arcuatissimis pinnati; rami plani, graciles, saepe filiformes, iterum pinnati, foliis arctè imbricatis, appressis, ovatis, vel ovato-lanceolatis, apiculatis, et quasi brevissimè piliferis, concavis, nervo striisque omnino carentibus, lutescentibus, siccitate splendentibus obscuris; folia caulinæ apice piliformi longiore quam ramea gaudent, et striis duabus brevissimis obscuris ad basin notantur; perichaetalia erecta, angusta, linear-lanceolata, apice longè subulata, enervia, albicantia, basi modò amoenè crocea; pedicelli, visu rari, e surculis junioribus orti, plerumque solitarii, sesquipollicares,

purpurei, nitidi; capsulæ ovatae, sub-arcuatæ, cernuæ, fuscæ; operculum capsulæ concolor e basi conicâ in rostrum acutum recurvum producitur. Ab *H. proliferum*, quod unum specierum Britannicarum refert, foliorum colore et nitore statim distinguuntur.

23. *H. proliferum*, caule tripinnato; foliis cordato-ovatis acutis uninervibus appressis; capsula oblonga; operculo curvirostro. Sp. Musc. t. 67. f. 1—5. DILL. t. 35. f. 14. Fl. Lond. fasc. I.

*H. tamariscinum*. H.

*H. parietinum*. BRID.

— in sylvis umbrosis.

Caules decumbentes, rigiduli, sub-spithamæi, infernæ, et maximâ ex parte, nudi, proliferi, ramis planis, horizontalibus, inferioribus approximatis, longioribus, summis remotiusculis, abbreviatis, omnibus iterum atque iterum divisis pinnati; folia intensè viridia, opaca, rariùs lutescentia, in ramis laxè imbricata, planiuscula, appressa, basi lata, e cordato triquetra, acuta, integerrima, nervo ferè concolore percursa; caulinæ his similia, sed majora, apice acuminata, et basi striis duabus brevissimis notata; perichaetalia e basi lanceolatâ longè piliformia, albicantia, nervo lato, paullum obscuriore percursa; pedicelli aggregati, sesquipollicares, purpurei, nitidi; capsulæ oblongæ, arcuatæ, fuscæ,

læves, cernuæ; operculum ut in *H. splendente*.—*Fucum cartilagineum* ramorum situ formâque valdè refert hæc species.—Staturâ minore, operculoque conico, differre videtur \**H. recognitum*, Hedw. muscis Britannicis a cel. Smithio nuper ascriptum, sed, pace Hedwigii, dubitare licet ut specie verè discrepet.

- \*24. *H. umbratum*, caule bipinnatim-ramoso; foliis cordato-ovatis acutis serrulatis enervibus patulis; operculo conico apiculato. Sp. Musc. t. 67. f. 10—13.

— in sylvis.

Caules procumbentes, palmares, et ultra, sub-dichotomi, apice attenuati, ramis simpliciusculis, nunc confertis, nunc remotis, iterum pinnatis, in compotè pinnati; folia approximata, luteola, vel dilutè viridia, nitida, enervia, sed sèpe plicata ut striae simulent, concava, horizontaliter patula, margine crebrè et tenuissimè serrulata, e cordato ovata, acuta, interdum sub-acuminata, tortilia; perichaetalia erecta, oblongo-lanceolata, apice brevitè acuminato, denticulato, extante, albicanti-viridia, enervia, complicato-concava; pedicelli pollicares, et

\* Folia in hac stirpe perichaetalia enervia depixit Hedwigius, nervo tamen lato, ut in *H. PROLIFERO*, certe percurruntur.

ultra, purpurascentes, plerumque solitarii, læves; capsulæ ovatæ, breves, incurvæ, sub-nutantes; operculum rufo-fuscum, breve, conicum, et in exemplaribus nostris semper minutè apiculatum.— Ramis minus ordinatim dispositis, foliis serratis, perichaetialium formâ, et operculo conico hæc species a duabus præcedentibus differt: surculis plus duplo crassioribus ab *H. prælongo* affatim dignoscitur.—Ex Hiberniâ misit D. Scott.

- \*25. *H. Stokesii*, caule bipinnatim-ramoso; foliis cordatis acuminatis serrulatis uninervibus erecto-patulis; pedicellis tuberculosis; capsulâ ovatâ. T. 15. f. 2.

— in rupibus.

Amicissimi Smithii auctoritate nisus hanc stirpem ab *H. umbrato* et *prælongo*, inter quæ ferè media mihi videtur, distinctam sisto: rectè necne dijudicent alii.—Caules procumbentes, repentes, absque ordine divisi, sub-palmares, ramis sub-simplicibus, planiusculis vagè pinnati; folia amœnè, sed dilutè viridia, nitida, remotiuscula, cordata, brevitè acuminata, nervo concolorè percursa, margine crebrè et tenuissimè serrulata, madore patula, siccitate erectiuscula; perichaetalia albicantia, enervia, basi oblongo-lanceolata, complicato-concava, erecta, appressa, apice subulata, reflexa; pedicelli solitarii, purpurascentes, tuberculis exiguis scabri; capsulæ

ovatæ, pendulæ, luteo-fusca, læves: doleo quod operculum videre nondum mihi contigerit.—Hunc muscum *H. umbrati* formâ et foliis, sed *H. praelongi* perichaetio pedicellisque gaudere e descriptione liquebit: illius esse varietatem fateor me suspicari. In rupibus prope lacum, *Lough-Bray* dictum, de-  
texit D. Stokes, cuius nomine insignitur.

26. *H. praelongum*, caule pinnato; foliis ovato-lanceolatis acuminatis serratis uninervibus horizontalibus; capsulâ ovatâ; operculo rostrato. St. cr. IV. t. 29. DILL. t. 35. f. 15. A, C.

— humi, et in arborum truncis.

- B. abbreviatum*; caule erecto vix pollicari, vagè ramoso; foliis confertis. DILL. t. 35. f. 15. B.

— humi, in palustribus.

Caules graciles, procumbentes, repentes, a palmaria ad dodrantalem longitudinem variant, compressi, simplices, vel vagè divisi, ramis planiusculis, brevibus, remotis, plerumque simplicibus pinnati; folia lutescentia, seu amœnè dilutè viridia, ovato-lanceolata, acuta, semper, vel sicca, horizontaliter patula, margine, sub lente mediocri, pulcherrimè et luculentè serrata, incisuris remotis, nervo concolore percursa, planiuscula; perichaetalia albicantia, enervia, e basi lata, oblongo-ovatâ, complicato-concavâ, appressâ, in apicem longum,

piliformem, sparsim denticulatum producta; pedicelli solitarii, pollicares, purpurei; capsulæ arcuatæ, juniores oblongæ, mox ovatæ, fusca, læves, cernuæ; operculi rostrum capsulæ ferè longitudine, incurvum, subulatum, lutescens.—*B.*, in pa-  
lustribus humi nascens, caule abbreviato, erecto,  
multum et vagè ramoso, et colore saturatè viridi,  
faciem valde diversam præbet.—Pedicellum huic  
stirpi scabrum tribuerunt Hedwigius et Swartzius;  
sed hoc quodammodo incertum, scabrum enim  
lævemque in eâdem plantâ vidi.—Nulla ferè spe-  
cies colore, formâ, et habitu variata magis.—*H. fal-  
lax*, BRID. *H. praelongo* est ita simile ut vix nisi  
lentis ope dignoscatur; foliis caulinis integerimis,  
siccitate erectis, sub-tortilibus, perichaetialibus lan-  
ceolatis, uninervibus differt.

- \* 27. *H. protensum*, caule pinnato; foliis lanceolato-  
subulatis enervibus, apice reflexo-patulis; capsulâ  
sub-cylindraceâ; operculo acutè conico. BRID.  
III. t. 2. f. 3.

— in rupibus madidis.

Caules procumbentes, spithamei, et ultra, debiles,  
simplices, vel semel atque iterum bifurci, basin  
versus ferrugineo-tomentosi, supernè ramis brevi-  
bus, simplicibus, planiusculis, horizontalibus pinnati;  
folia arctè imbricata, luteola, carinata, basi  
lanceolata, appressa, apice piliformia, reflexo-patu-

la, margine integerrima, nervo\* striisque prorsus carentia; perichaetalia parva, erecta, concava, lanceolata, brevitè acuminata, enervia; pedicelli sesquipollicares, erecti, laeves, purpurascentes, solitarii; capsulae elongatae, inclinatae, basi angustatae, oblongo-cylindraceae; operculum, quod ipse non vidi, est, teste Bridelio, purpureum, conicum, acutum.—Unum modò hujus stirpis pulcherrimæ exemplar ex Hiberniâ nuperrimè misit D. Scott, quod ad *H. protensi* descriptionem iconemque supra citatam tam ad amussim quadrabat, ut fieri nequuit quin, licet plantam Bridelianam nunquam viderim, idem esse censerem.—Capsulae longitudo in hac specie notabilis.—Habitu crescendique modo *H. prælongum* refert; sed foliis caulinis et perichaetialibus, vel fructu deficiente, statim dignoscitur.

28. *H. abietinum*, caule pinnato compresso; foliis cordatis acuminatis tri-striatis appressis; operculo conico. St. cr. IV. t. 32. DILL. t. 35. f. 17.

— in siccis.

Caules bipollicares, decumbentes, repentes, plerumque indivisi, ramis brevibus, simplicibus, ut

\* In quibusdam foliis lente acerrima observatis nervum perquam obsoletum detegere credidi.

plurimum remotiusculis, fragilibus, lineari-subulatis, compressis pinnati; folia fulvo-viridia, absque nitore, e basi latâ, cordatâ brevitè acuminata, densè imbricata, appressa, margine integerrima, striis tribus, mediâ apicem versus evanescente, exterioribus brevioribus, exarata, concava; perichaetalia erecta, stricta, alblicantia, oblongo-lanceolata, obsoletè uninervia; pedicelli pollicares, purpurei, laeves; capsulae oblongæ, incurvæ, cernuæ, fusæ; operculum, teste Hedwigio, exactè conicum, rubellum.—Exemplaria fructifera, nondum extra Sueciam reperta, optimi Swartzii benevolentiae deboeo.

c) *surculis teretibus; foliis undique imbricatis.*

29. *H. alepecurum*, caule erecto, infernè nudo; ramis sub-fasciculatis; foliis ovatis serratis uninervibus; operculo rostrato. DILL. t. 41. f. 49. E. B. XVII. t. 1182.

*H. arbuscula*. BRID.

— in sylvis.

*H. protensum*; ramis gracilibus nudiusculis filiformibus sub-fibrosis.

— in saxis in rivulis.

Radix repens; caules palmares, vel spithamei, erecti, infernè spadicei, nudi, simplices, supernè fasciculato-ramosi; rami teretes, simpliciusculi, vel vagè pinnati, erecti, paullum incurvi; folia ob-

scurè viridia, rariùs pallida, nitoris expertia, ovata, vel oblongo-ovata, acuta, concava, erecto-patula, margine, præsertim apices versus, argutè serrata, nervo crasso, concolore, prope extremitates evanescente instructa; perichaetalia albicantia, nervo tenui obsoletissimo percursa, complicato-concava, basi latè ovata, erecta, appressa, apice acuminata, reflexa; pedicelli in ramis summis orti, unguiculare, atro-rufi, læves; capsulae oblongo-ovatae, rufo-fuscæ, sub-pendulae; operculum capsulae concolor, e basi conicâ longè rostratum, rostro rectiusculo acuminato.—Var  $\beta$ , supra lapides in torrentibus prope *Lough-Bray* reperta, surculis ferè bipedalibus, in ramos plures, ferè denudatos, sæpius fibrosos, a basi usque divisis, habituque gracili, specie primo visu diversissima videtur.—Ab *H. dendroide* et *curvato*, quibus maximè affinis hæc planta, staturâ majore, foliis serratis, colore in siccâ, neutiquam splendente, capsulisq; cernuis differt.

30. *H. stramineum*, caule simpliciusculo filiformi erecto; foliis oblongo-lanceolatis concavis enervibus appressis; operculo convexo umbonato. Dicks. t. 1. f. 9.

— in aquosis gramineis.

Caules palmares, et ultra, erecti, teretes, lineares, graciles, siccitate fragiles, simplices, vel ramo uno altero brevi instructi; folia coloris straminei,

laxe imbricata, erecta, concava, conniventia, appressa, enervia, sed sæpè plicata ut nervos simulent, oblongo-lanceolata, obtusiuscula, tenera, siccitate nitida; perichaetalia caulinis similia, sed longiora, pedicellis arctè appressa, erecta, stricta, albicantia, tenerrima; pedicelli caulem prope medium orti, pollicares, et ultra, erecti, rubri; capsulae ovatae, incurvæ, cernuæ, fusco-rufæ; operculum convexum, brevitè umbonatum.—Caule erecto, sub-simplice, a reliquis *Hypnis Britannicis* satis recedit.

- \* 31. *H. adnatum*, caule repente; ramis sub-simplicibus; foliis ovatis acuminatis concavis enervibus imbricatis; operculo conico. Sp. Musc. t. 64. f. 5—10.

— humi, in argillaceis.

Caules procumbentes, repentes, vix unguiculares; rami breves, teretes, sub-simplices, erecti-succiuli; folia latè viridia, ovata, brevitè acuminata, integrerima, nervo prorsùs parentia, laxè imbricata, concava, madore erecta, siccitate appressa; perichaetalia erecta, stricta, appressa, linear-lanceolata, obsoletè striata, albicantia; pedicelli unguiculares, et ultra, rubentes, læves; capsulae oblongo-ovatae, rufo-fuscæ, cernuæ; operculum conicum, capsula plus duplo brevius, nec raro aliquantulum incurvum.—Ab *H. abbreviato*, cui proxima hæc spe-

cies, foliis acuminatis, operculoque brevi differt.—Muscum hunc in pago, Rathmines dicto, primus in Europâ detexit D. Stokes. Exemplaria Hibernica nostra Americanis, a cl. R. A. Hedwigio missis, paullò majora.

32. *H. murale*, caule repente; foliis ovatis integerrimis apiculatis mediotenùs uninervibus concavis conniventibus; operculo curvirostro. St. cr. IV. t. 30. DILL. t. 41. f. 52. E. B. XV. t. 1038.

*H. myosuroides*. γ. Huds.

*H. confertum*. E. B.

— in muris.

Caules procumbentes, repentes, densè implexi, sub-pollicares, ramosi; rami frequentes, breviusculi, erecti, simplices, raro bifurci, eximiè teretes; folia saturatè viridia, opaca, approximata, erecta, concava, conniventia, ovata, brevitè apiculata, integerrima, nervo tenui fusco mediotenùs percursa; perichaetalia dilutè viridia, exigua, erecta, appressa, stricta, lanceolata, acuminata, enervia; pedicelli sub-unguiculares, purpurascentes, erecti, lœves; capsulæ ovatae, abbreviatæ, spadiceæ, lœves, nunc inclinatae, nunc cernuæ; operculum capsulæ concolor, e basi convexâ in rostrum longum, subulatum, incurvum productum.—Rami insigniter teretes, folia concava, et capsularum frequentium opercula longè rostrata hanc speciem satis a congeneribus Hibernicis distinguunt: ab

*H. clavellato*, L. (DILL. t. 85. f. 17.) cui maximè affinis videtur, ramis longioribus, et foliorum formâ satis differre censerem; sed de plantâ, quam nondum vidi, non est quod pro certo dicam.—*H. clavellatum*, Huds. (*H. confertum*, Dicks.) ad *H. serrulatum* pertinet; et foliis serrulatis, distichis, patulis, statim potest dignosci.

33. *H. velutinum*, caule repente; foliis ovatis acuminatis mediotenùs uninervibus erectis; capsulâ ovatâ abbreviatâ; operculo conico. St. cr. IV. t. 27. DILL. t. 42. f. 61.

— in sepibus.

Caules pollicares, et ultra, densissimè implexi, pulvinati, decumbentes, repentes; rami conferti, erecti, teretusculi, breves, sub-simplices; folia confertiuscula, erecto-patula, luteola, vel lœtè viridia, ovato-lanceolata, longè acuminata, margine, sub lente, serrulata, siccitate splendentia, nervo fusco prope apices evanescente instructa, modicè concava; perichaetalia parva, erecta, stricta, albicanitia, enervia, e basi latâ, ovatâ, in apicem piliformem desinentia; pedicelli tuberculis exiguis sparsis scabriusculi, erecti, unguiculares, atrofusci; capsulæ ovatae, spadiceæ, cernuæ; operculum exactè conicum, rufo-fuscum.

34. *H. intricatum*, caule repente; foliis lanciolato-

subulatis mediotenuis uninervibus erectis; capsula ovata; operculo conico. St. cr. IV. t. 28.  
DICKS. t. 11. f. 13.

*H. Teesdalii.* DICKS.

— in sylvis.

Folia laxius quam in praecedente disposita, angustiora, longius acuminata, coloris saturatè viridis, siccitate vix splendentia; habitus tenerior; annulus, sive Hedwigii, fimbriâ compositâ, nec simplici; folia perichaetalia angusta, oblongo-lanceolata, erecta, albicanitia. In cæteris inter se convenient, et accuratissimâ, ne commisceantur, observatione est opus.

35. *H. serpens*, caule repente; foliis ovatis acuminatis, basi uninervibus; capsula cylindracea; operculo convexo-conico umbonato. St. cr. IV. t. 18.  
DILL. t. 42. f. 64, E. B. XV. t. 1037.

\* *B. spinulosum*; statura minore; pedicellis abbreviatis. Sp. Musc. t. 69. f. 5—10.

*H. spinulosum.* H.

— humi, et in arboribus.

Caules prostrati, repentes, densissimè implexi, ramosi; rami perquām breves, vix trilineares, erecti, tenuissimi, siccitate sub-capillares; folia laxiusculè imbricata, lastè viridia, minutissima, ut oculum inermem ferè fugiant, ovata, longè acuminata, erec-

to-patula, modicè concava, nervo tenui concolore, a Bridelio primū observato, instructa; perichaetalia exigua, albicanitia, concava, conniventia, oblonga, apice piliformia, enervia; pedicelli pollicares, et ultra, dilutè rubentes, frequentes, erecti, lèves; capsulae incurvæ, cernuæ, sub-cylindracea, virentes, graciles, effætæ ferè pyriformes; operculum convexo-conicum, luteolum, umbone exiguo; calyptra junior alba, conica, capsulam obtegens, valde conspicua, hujusque musci notam satis obviā præbens.— $\beta$ , ob staturam ubique minorem, pedicellos vix quadrilineares, foliorumque nervum magis quam in  $\alpha$  conspicuum, specie differre Hedwigius credidit, collatis autem exemplaribus a D. R. A. Hedwigio missis cum iis quæ prope Eblanam legit D. Stokes, varietates tantum mihi videntur; folia perichaetalia in utroque obsoletè uninervia.—Planta maximè polymorpha; sed an omnes, quas Bridelius sub hâc specie varietates enumeravit, hûc verè pertineant, dubitat cl. Schraderus.

36. *H. atro-virens*, caule procumbente ramosissimo; foliis ovatis concavis uninervibus erectis; capsula obovatâ; operculo rostrato. DILL. t. 43. f. 67.

— in arboribus.

Caules cæspitosi, pollicares, et ultra, densissimè implexi; rami sparsi, teretes, filiformes, rigi-

diusculi, fragiles, vix filii minoris crassitie; folia laxè imbricata, atro-virentia, lurida, ovata, acuta, nervo ferè concolore percursa, integerrima, concava, madore erecta, conniventia, siccitate appressa; perichaetalia magna, lutescentia, oblongo-lanceolata, acuta, erecta, stricta, nervo nigricante ad basin instructa; pedicelli unguiculares, purpurascentes, laves; capsulae obovatæ, cernuæ; operculum, teste Dillenio, breve, cuspidatum.—Species a cæteris habitu distinctissima, foliorum colore, ramisque gracilibus rigidiusculis semper dignoscenda.—Exemplaria nostra Hibernica, a D. Scott missa, fructu parent, foliorumque nervo magis quam in Dillenianis obsoleto percurrentur.

37. *H. tenellum*, caule repente ramosissimo; foliis subulatis uninervibus hic illuc fasciculatis erectis; operculo rostrato. Dicks. t. 11. f. 12.

— in saxis et arboribus.

Caules procumbentes, repentes, densissimè implexi; rami breves, erecti, sparsi, plerumque simplices; folia latè viridia, splendentia, e basi aliquantillùm dilatata concaviusculâ, longè subulata, integerrima, laxè imbricata, hic illuc fasciculata, erecta, nervo crasso obscurò percursa, operculo inermi setacea; perichaetalia exigua, erec-

ta, stricta, lanceolata, acuminata, enervia; pedicelli trilineares, et ultra, ramos superantes, atropurpurei, laves; capsulae abbreviatæ, juniores oblongæ, inclinatæ, maturæ ovatæ, sub-pendulæ, spadiceæ; operculum fuscum, capsulae ferè longitudine, e basi convexâ rostratum, aliquantulùm incurvum.—Hæc species ab *H. serpente*, cui primo intuitu similis, foliis duplò longioribus, et operculo differt.—Folia enervia dixit Dicksonus, sed in exemplaribus, cum ab ipso missis, tūm a Dillwinio et Templetono communicatis, nervo valido omnia percurrentur.

38. *H. albicans*, caule ascendentे; foliis ovatis acuminatis tri-striatis appressis; capsula ovatæ; operculo conico apiculato. St. cr. IV. t. 5. DILL. t. 42. f. 63.

— in arenosis,

Caules ascendentes, sub-bipollicares, plerumque simpliciusculi, et modo ramo uno alteroque brevi erectiusculo instructi, interdum vagè divisi, insigniter teretes; folia albescenti-viridia, nitida, densè imbricata, erecta, appressa, ovata, longè acuminata, apicem versus sæpius contorta, striis tribus obscuris medioteanus notata, concavo-carinata; perichaetalia angusta, erecta, enervia, oblonga, apice longo, piliformi, extante; pedicelli surculorum prope basin orti, unguiculares, atro-

rufi, lèves; capsulæ breves, ovatæ, vix incurvæ, spadiceæ, cernuæ; operculum rubens, conicum, mucrone brevi nigricante.

39. *H. plumosum*, caule repente vagè ramoso; foliis ovato-lanceolatis acuminatis mediotoenus uninervibus erectis; operculo conico. T. 15. f. 1. DILL. t. 35. f. 16.

*H. pseudo-plumosum*. BRID.

*H. sericeum*. β. Huds.

*Leskeia plumosa*. SWARTZ?

— in saxis.

Caules palmares, prostrati, repentes, implexi, tomento denso ferrugineo infernè obsiti; rami breves, vagi, conferti, erectiusculi, sub-simplices, acuti; folia arctè imbricata, inferiora e nigro ferruginea, summa rufescenti-lutea, ut planta bicolor evadat, siccitate splendidia, omnia ovato-lanceolata, acuminata, integerrima, nervo concolore, infra medium evanescente instructa, concava, erecta; perichætialia alblicantia, enervia, e basi latiuscula, elliptica, appressa, subulata, reflexa; pedicelli ramis breviores, vix quadrilineares, rubentes, lèves; capsulæ ovatæ, erectiusculæ, vel cernuæ, atro-rubentes; operculum conicum, acutum.—Exemplaribus nostris cum Dillenianis, et

cum *H. pseudo-plumoso*,<sup>†</sup> e Silesiâ, a Schradero, misso, collatis, synonyma hæc fidenter protuli. Ab *H. sericeo*, quod maximè refert hæc species, capsulâ cernuâ, foliisque neutiquam striatis differt. *H. plumosum*, Hedw. longè ab hac nostrâ recedit, et *H. lutescenti* est magis affine.

- \* 40. *H. implexum*, caule repente vagè ramoso; foliis lanceolatis acuminatis serrulatis uninervibus erectis; operculo conico. T. 16.

— in saxis.

Caules palmares, et ultra, prostrati, repentes, diffusi, implexi; rami vagi, conferti, erecti, breviusculi, sub-simplices, rariùs elongati, vagè divisi; folia lutescenti-viridia, lætè tamen, serici instar splendidia, arctè imbricata, lanceolata, concava, acuminata, nervo crasso, ad apicem percurrente instructa, margine, præsertim apice versus, sub acri lente tenerrimè serrulata; perichætialia alblicantia, enervia, e basi latâ, in apicem longum, piliformem, reflexum desinentia; pedicelli ramos superantes, sèpè sesquiunguiculares, fusco-rufi, lèves; capsu-

† Aliam sub *H. PSEUDO-PLUMOSI* nomine stirpem, quæ *H. MURALE* habitu refert, et foliis latè ovatis, sub-secundiis, paulum arcuatis, lætè viridibus, siccitate vix nitidis, perichætialibus caulinis sub-similibus, ab *H. PLUMOSO* recedit, nuper misit D. Mohr. Utramque e descriptione præ se habuisse videtur Bridelius.

læ pedicellis concolores, oblongæ, breves, erectiusculæ, vel inclinatæ, interdum tantillam arcuatæ; operculum capsulâ pallidius, conicum.—Species præcedente plus duplo gracilior; color ruboris expers; folia formâ nervoque absimilia.—Exemplaria a Swartzio missa cum nostris, prope Eblanam a D. Scott et Stokes lectis, omnino conveniunt.—Nomen huic stirpi a Swartzio in Act. Holm. impositum, Bridelius licet speciei dissimili mihique adhuc ignotæ idem indiderit, servavi.

41. *H. lutescens*, caule procumbente ramosissimo; foliis ovato-lanceolatis acuminatis tri-striatis erectis; operculo conico acuminato. St. cr. IV. t. 16. DILL. t. 42. f. 60.

*H. sericeum*. y. Huds.

— humi, in siccis.

Caules palmares, spithamæi, et ultra, prostrati, diffusi, laxè implexi; rami vagi, elongati, teretes, apice obtusiusculi, ascendentæ, sæpius divisi; folia lutescentia, nitida, conferta, arctè imbricata, lanceolata, vel ovato-lanceolata, longè acuminata, integerrima, concava, striis tribus obscuris, mediâ ad apicem ferè pertingente, exterioribus brevioribus, exarata, madore erecto-patula, siccitate appressa; perichaetalia oblonga, acuminata, enervia, erecta, stricta; pedicelli e ramis junioribus copiosè orti, pollicares, rubri, tuberculis minutis scabrius-

culi; capsulæ viridi-fuscæ, graciles, oblongæ, sub-incurvatæ, cernuæ; operculum croceum, basi rutilans, conicum, brevissimè rostratum.—Planta auctoribus parùm nota; cum *H. polyantha* a Neckero, cum *curvata* a Weisio, cum *sericea* ab Hudsono conjuncta; ab his omnibus capsulæ cernuæ, et ab *H. nitente*, cui magis affinis,\* rami neutiquam cuspidati, pedicelli scabri, color pallidè luteus, nec fulvus, et quasi auratus, distinguunt.—Bridelius, herbarii Vaillantiani fide, iconem in Bot. Par. t. 27. f. 1. (quæ *H. cassubicum*, Scop. et Dicks.) huc refert.

42. *H. purum*, caule pinnato; foliis ovato-ellipticis concavis apiculatis, mediotenus uninervibus; operculo conico apiculato. Fl. Lond. fasc. III. Sp. Musc. t. 66. f. 3—6. DILL. t. 40. f. 45.

— in nemorosis.

Caules ascendentes, vel erecti, palmares, sub-divisi, ramis horizontalibus, brevibus, simplicibus, remotiusculis, eximiè teretibus, apice obtusis, sub-

\* Species, quam *H. LUTESCENS* omnium maxime refert, est *H. PLUMOSUM*, Hedw. (*H. SALEBROSUM*, Hoffm.) et ab hoc, vix nisi foliis caulinis laxius dispositis, perichaetialibus brevioribus, pedicellis levibus, ramisque abbreviatis, differre videtur; unde si posthac conjungantur non is sum qui stupeam.

recurvis pinnati; folia coloris straminei, siccitate perquam nitida, dense imbricata, et squamatim appressa, insigniter concava, pellucida, ex elliptico ovata, obtusiuscula, mucrone brevissimo, acuto, obliquo terminata, nervo fuscescente, tenerrimo, interdum ferè obsoleto, mediotenus notata; perichaetalia albanticia, angusta, linear-lanceolata, acuta, erecta, stricta, enervia; pedicelli bipollares, rubri, laves; capsulae oblongo-ovatae, spadiceæ, cernuae, vix incurvæ; operculum breve, conicum, rufescens, mucrone exiguo, saepe incurvo.—*H. illecebrum*, (DILL. t. 40. f. 46.) planta, quâ nulla magis dubiis vexata, vix nisi ramis brevioribus, crassioribus, apice rotundatis, foliisque latioribus ab *H. puro* differre videtur: stirpes autem inter se perquam absimiles in herbariis illustrissimis hoc nomine insignitæ occurunt.

43. *H. Schreberi*, caule pinnato sub-compresso; foliis oblongo-ovatis muticis concavis enervibus remotiusculis; operculo conico. DILL. t. 40. f. 47.

*H. compressum*. SCHREB.

*H. muticum*. SWARTZ.

*H. purum*. β. Huds.

— in umbrosis.

Colore, habitu, formâ, crescendi modo, et fructu cum præcedente convenit; sed ramis compres-

sis, apice acutiusculis, foliis laxè imbricatis, oblongo-ovatis, neutiquam apiculatis, prorsùs enervibus, staturâque multò graciliore, differt. Folia perichaetalia angusta, albanticia, enervia, erecta, appressa, lanceolata, acuminata; capsulae visu rassisimæ.—Pro specie sequentis varietate habuerunt Weissius et alii; ab hâc autem, colore stramineo, siccitate magis splendente, foliis obtusiusculis appressis, extremis nunquam convolutis, dignoscitur.

44. *H. cuspidatum*, caule pinnato cuspidato; foliis oblongo-lanceolatis enervibus patulis, summis convolutis; operculo conico acuto. DILL. t. 39. f. 34.

— in pascuis uidis.

β. *bicolor*; ramis confertis sub-fasciculatis.

— in aquis stagnantibus.

Caules erecti, pro loci natalis humore, nunc spithamei, nunc vix sesquipollicares, divisi, ramis brevibus, simplicibus, sub-compressis, horizontalibus, acutis, approximatis pinnati; folia dilutè viridia, vel lutescentia, siccitate splendentia, laxè imbricata, modicè concava, semper patentiuscula, oblongo-lanceolata, acuta, nervi prorsùs expertia, extrema convoluta, ut ramorum apices teretes sint et subulati; perichaetalia longissima, ejusdem ferè cum caulinis formæ, sed longius acuminata, erecta,

-do stricta, albicantia, striata; pedicelli bi-tri-pollicares, rubentes, lèves; capsulæ oblongæ, aut ovalæ, incurvæ, cernuæ, fulvæ; operculum longè conicum, apice non raro curvulum.—Crescendi modus in β tam dissimilis ut facilè pro diversâ specie haberi possit; in densis cæspitibus nascitur; folia inferiora nigricantia, summa lutescunt.

\*45. *H. piliferum*, caule ramosissimo; foliis ovatis concavis obtusiusculis, apice piliformi, mediotenus uninervibus; operculo rostrato. St. cr. IV. t. 14.  
— in nemorosis.

Caules procumbentes, spithamæi, et ultra, ramosissimi; rami erectiusculi, teretes, vagi, interdum absque ordine pinnatim dispositi, et sèpiùs iterum divisi; folia dilutè lutescentia, nitida, laxè imbricata, ovata, integerrima, in cuspidem piliformem apice producta, nervo obscuro mediotenus notata, insigniter concava, madore erecto-patula, siccitate cauli appressa; perichaetalia enervia, angusta, linearilanceolata, erecta, apice longo piliformi, aliquantulum extante; pedicelli pollicares, fusco-rufi, tuberculis minutis scabriuscui; capsulæ spadiceæ, abbreviatæ, ovatæ, arcuatæ, annulatæ; operculum capsulâ pallidius, e basi conicâ in rostrum longum, acutum, rectiusculum producitur.—Hanc speciem revera distinctissimam, et foliis piliferis, siccitate

appressis, operculoque rostrato dignoscendam, primus ab *H. rutabulo* disjunxit illust. de Schreber.

46. *H. rutabulum*, caule ramosissimo; foliis ovato-deltoideis acuminatis medioteus uninervibus serrulatis patulis; operculo conico acuto. St. cr. IV. t. 12. DILL. t. 28. f. 29.

β. *distichum*; caule planiusculo; foliis distichis; pedicellis lèvibus.

γ. *virens*; foliis infimis nigricantibus, summis latè luteo-viridibus; pedicellis lèvibus.

— humi, et in arboribus.

Caules procumbentes, interdum repentes, palmates, et ultra; rami nunc vagi, nunc sub-pinnatim dispositi, ascendentes, acuti, plerumque teretiusculi, atque iterum divisi; folia albescenti-viridia, interdum dilutè viridia, vel luteola, latè ovata, vel deltoidea, margine sub lente acerrimâ minutissimè serrulata, apice acuminata, nervo infra medium evanescente instructa, modicè concava, laxè imbricata, patula, interdum sub-horizontalia, raro siccitate appressa; perichaetalia enervia, linearilanceolata, apice longo, piliformi, reflexo; pedicelli frequentes, vix pollicares, rubentes, tuberculis minutis scabri; capsulæ dilutè fuscæ, ovatæ, cernuæ, omnes plerumque eodem spectantes; operculum capsulâ pallidius, breve, conicum, apice acutum et nigrum.—Var. β, caule compresso, ferè

plano, foliis bifariam dispositis, longius quam in  $\alpha$  acuminatis, integerrimis, pedicellisque lœvibus, specie distincta videtur; facies tamen in var.  $\gamma$ , quam sub *H. virentis* nomine a Swartzio olim accepi, magis primo visu diversa; color huic infernè nigricans, supernè lætè virens, nitens, folia laxè et sub-bifariam disponuntur, angustiora quam in  $\alpha$  et  $\beta$ , integerrima, pedicelli læves, capsulae graciles: media ferè inter *H. rutabulum* et *riparium* videtur. Has varietates ex Hiberniâ misit D. Scott.—Hypnorum omnium ferè frequentissimum est *H. rutabulum*, et maximè variabile;\* ubique occurrit, capsulas ubique profert, formâ, colore, et magnitudine tam mirè ludit, ut sæpe sagacissimos, quotidie tyrones vexet.

*d) foliis squarrosis.*

47. *H. striatum*, caule ramosissimo; foliis ovato-deltoideis acutis mediotenus striatis sub-integris; operculo rostrato. St. cr. IV. t. 13. DILL. t. 38. f. 30.

*H. longirostrum*. BRID.

*H. rutabulum*.  $\gamma$ . HUDS.

$\beta$ . *serratum*; ramis elongatis gracilibus; foliis serratis.

— in arboribus:

\* Folia siccitate sæpe striata videntur, et margine sunt interdum integerrima.

Ramî caulesque ut in præcedente; folia albescenti-viridia, bi-tri-striata, ovato-cordata, acuta, margine, sub lente acerrimâ, vix, aut ne vix, serrulata, remotiuscula, horizontaliter patentia, planiuscula, siccitate paullum nitida; perichaetalia e-nervia, ovato-lanceolata, carinato-concava, reflexa, apice acuta, vel acuminata, at neutiquam piliformia; pedicelli sesquipollicares, et ultra, rubri, læves; capsulae oblongo-ovatae, rufo-fuscæ, arcuatae, annulatae; operculum e basi conicâ in rostrum longum, subulatum, recurvum producitur.— $\beta$ , per pulchram varietatem, *H. praelongo* immixtam *Killesandriæ* legit D. Stokes; ob ramos graciles, in longum protenos, foliaque, vel lente mediocri, evidentè serrata, qui vegetabilia hybridè generari credunt, hybridam dicerent.—*H. striatum* ab *H. rutabulo*, operculo rostrato, pedicello lævi, capsulaque annulatâ, a pilifero, foliis vel siccitate squarrosis, nequaquam piliferis, ab utroque, colore semper albicante foliisque striatis, dignoscitur.

- \*48. *H. Thuringicum*, ramis sub-fasciculatis; foliis ovato-lanceolatis acuminatis serrulatis, mediotenus uninervibus; capsula oblongo-ovata; operculo rostrato. BRID. III. t. 3. f. 2.

— in nemorosis.

Caules repentes, ascendentes, sesquiunguiculares, in ramos plurimos, breves, sub-fasciculatos,

erectos, plerumque simplices divisi; folia approximata, horizontaliter patula, obscurè viridia, nitida, ex ovato lanceolata, concava, brevitèr acuminata, juxta apices sub lente minutè serrata, nervo fusco, circa medium evanescere instructa; perichaetalia albicantia, enervia, oblongo-ovata, complicato-carinata, appressa, apice piliformi, reflexo-patulo; pedicelli vix unguiculares, frequentes, rubri, laeves; capsulae luteo-fuscæ, tantillùm arcuatæ, angustè ovatae, nutantes; operculum capsulae concolor, ejusdemque ferè longitudinis, e basi conicâ subulatum, rubens.—Exemplaria nostra, a D. Scott ex Hiberniâ nuperrimè missa, ad ea quæ sub *H. Thuringici* nomine D. Mohr olim communicavit ad amissim quadrant: descriptioni quoque Bridelianæ, staturâ minore dempta, satis aptè respondent, vix tamen iconi, quæ plantam duplò majorē, et habitu alieno gaudentem designare videatur.—*H. præcoci* et *abbreviato*, Hedw. proxima est hæc species; ab hoc, foliis acuminatis, nervo instructis, ab illo, foliis neutiquam cordatis, ab utroque, ramis nequaquam teretibus, differt.

49. *H. fluitans*, caule vagè pinnato; folijs oblongo-lanceolatis acuminatis remotiusculis, medioteius unnnervibus; operculo convexo umbonato. St. cr. IV. t. 36. DILL. t. 38. f. 33.

— in aquis stagnantibus.

Caulis dodrantales, interdum vel pedales, fluentes, graciles, indivisi, ramis sparsis, horizontalibus, apice deflexis, abbreviatis, simplicibus, plerumque remotis pinnati; folia pallidè viridia, subtrifariam posita, dissita, lanceolata, vel oblongo-lanceolata, apice longo, subulato, flexuoso, horizontaliter patula, interdum reflexiuscula, vel subsecunda, summa erecta, omnia nervo tenui, fusco, ultra medium evanescere instructa, concava; perichaetalia circa pedicelli basin convoluta, et arctè appressa, latè ovata, enervia, apice brevi, piliformi; pedicelli visu rarissimi, palmares, et ultra, tenues, crocei, nitidi, laeves; capsulae oblongæ, cernuæ, fusco-virides; operculum convexo-conicum, brevitèr umbonatum, rufescens.—*H. cordifolium*, Hedw. quod Floræ Britannicæ nuper ascivit D. Winch, species huic perquam affinis, foliis cordatis, obtusis, basi albescientibus, differt.

50. *H. stellatum*, caule erecto sub-simplice; foliis deltoideo-lanceolatis acuminatis enervibus, summis erectis; operculo conico. DILL. t. 39. f. 35. BRID. III. t. 6. f. 2. DICKS. t. 1. f. 7.

— in palustribus turfosis.

Caulis erecti, sub-biplicares, nunc simplices, nunc divisi, plerumque ramo uno alteroque brevi, simplice, horizontali prope apicem vagè pinnati; folia inferiora ferruginea, superiora aureo-lutes-

centia, siccitate nitida, omnia, e basi latâ, triquetrâ, vaginante, lanceolata, longè acuminata, integrerrima, enervia,\* planiuscula, semper horizontaliter patula, summa tamen erecta et appressa, ut ramorum apices acutiusculi videantur; perichætialia albicantia, oblongo-subulata, erecta, stricta, tenuiter striata; pedicelli sesquipollicares, purpurei, erecti, lœves; capsulæ pedicellis concolores, oblongæ, arcuatæ, erecto-cernuæ; operculum rubens, conicum, acutum, breve, apice interdum tantillum curvo.—*H. cuspidato* habitu aliquantum simile, sed crescendi modo, foliis, et colore, primâ facie dignoscendum.

51. *H. squarrosum*, caule vagè pinnato; foliis cordato-ovatis acuminatis enervibus carinatis recurvis; operculo conico. DILL. t. 39. f. 38.  
*β. minus*; caule gracili; operculo sub-cuspidato. DILL. t. 39. f. 39.

— in sylvis.

Caules ascendentes, sub-palmares, sæpius divisi, ramis simplicibus sparsis, brevibus, recurvis, apice attenuatis, vagè pinnati; folia lutescentia, subquinquefariam densè imbricata, e basi latâ vagi-

\* Folia uninervia dicit Bridelius, in exemplaribus autem nostris nervo omnino carent.

nante cordato-ovata, longè acuminata, integrerrima, reflexa, complicato-carinata, prorsùs enervia; perichætialia albicantia, enervia, caulinis formâ similia, sed aliquantum angustiora, erecta, circa pedicellorum basin convoluta, apice modò extante; pedicelli pollicares, et ultra, purpurei, lœves; capsulæ pedicellis concolores, breves, ovatae, turgidæ, sub-nutantes; operculum conicum, plus minus acutum.—*β* formâ tantummodò minore, operculoque paullum producto differt.

52. *H. loereum*, caule vagè pinnato; foliis ovato-subulatis striatis reflexis sub-secundis; operculo convexo umbonato. DILL. t. 39. f. 40.

— in montosis.

Caules procumbentes, dodrantales, et ultra, plerumque divisi, ramis erectiusculis, simplicibus, apice attenuatis et recurvis, vix pollicaribus, sparsis, vagè pinnati; folia pallidè viridia, seu lutescentia, laxè imbricata, sub-secunda, aliquantum falcata, reflexa, ovata, integrerrima,\* in apicem longum, subulatum, carinato-concavum, acutissimum,

\* Foliorum apices sub lente bona serrulatos dixit Bridelius, sed in exemplaribus nostris integrermi videntur. Idem auctor optimè observavit, "foliorum, si caute avellanar, basis semicircularis croceo colore tincta appetet, quod omnibus muscis purpureo truncò præditum commune est."

curvulum desinentia, striis tribus quatuorve brevibus, obscuris basi notata; perichaetalia albantia, basi amoenè crocea, enervia, ovata, erecta, apice longo piliformi extante; pedicelli sesquipollicares, purpurei, laeves; capsulae ovato-globosæ, breves, turgidae, spadiceæ; operculum capsulae concolor, convexum, umbone minutissimo, acuto.—Inter *H. triquetrum* et *squarrosum* species ferè media; ab hoc, statuā duplo majore, foliis striatis, ab illo, caule graciliore, procumbente, ramis acutis, ab utroque, operculo convexo umbonato, foliisque leniter falcatis sub-secundis, differt.

53. *H. triquetrum*, caule vagè pinnato; foliis triquetris acuminatis serrulatis striatis recurvis; operculo conico obtusiusculo. DILL. t. 38. f. 28.

— in sylvis.

Caules erecti, pennæ anserinæ ferè crassitie, subdivisi, ramis simplicibus, raro bifurcatis, sparsis, reflexis, apice plerumque incrassatis, sed interdum attenuatis, ut cuspidati et ferè filiformes evadant, pinnati; folia triquetra, brevitè acuminata, plana, læte, seu albescenti-viridia, margine, sub lente, argutè serrulata, striis plurimis rufo-fuscis per totam longitudinem absque ordine notata, laxè imbricata, semper horizontalia, vel recurva; perichaetalia albantia, enervia, oblonga, erectiuscula, apice subulato extante, concavo-carinata; pedicelli sesqui-

pollicares, rubri, laeves; capsulae oblongo-ovatæ, arcuatæ, rufo-fuscæ, cernuæ; operculum spadicum, breve, convexo-conicum.—Varietatem hujus musci caule plus duplo breviore et graciliore, ramisque confertis insignem in arenosis olim legi.

*e) foliis secundis, falcatis.*

54. *H. scorpioides*, caule procumbente sub-pinnato; foliis ovatis acutis ventricosis appressis enervibus; operculo conico apiculato. DILL. t. 37. f. 25. E. B. XV. t. 1039. (mala.)

— in aquosis.

Caules procumbentes, dodrantales, vel pedales, divisi, ramis abbreviatis, incurvis, sparsis, erectiusculis, apice incrassatis, supernè planis vagè pinnati; folia caulina saturatè fusco-purpurea, ovata, acuta, falcata, concavo-carinata, ramea flavo-virentia, ex ovato sub-rotunda, acuta, minus falcata, insigniter ventricosa, omnia arctè imbricata, enervia, siccitate nitida et rugosa; perichaetalia longa, angusta, lanceolata, acuminata, erecta, appressa, striis tribus obscuris, parallelis a basi ad apicem exarata; pedicelli bipollicares, purpurei, laeves; capsulae oblongæ, arcuatæ, cernuæ, fulvæ; operculum breve, convexo-conicum, mucrone exiguo acuto.—Species, saltè in Britanniâ, neutiquam infrequens, sed errorum nebulâ, ut videtur, obduc-

ta; stirpem certè valdè dissimilem hoc nomine insignivit Bridelius; et, ni summa Smithii auctoritas abnueret, *H. purum* pro *scorpioide* Sowerbeium designâsse suspicarer; nec brevis Hedwigii in Sp. Musc. descriptio ad amussim quadrat.—*H. rugosum*, L. (DILL. t. 37. f. 24) ab *H. rugoso*, Hedw. prorsùs alienum, et huic proximum, neutiquam tamén, ut Neckerus Weberusque autumârunt, idem, foliis longioribus, apice subulatis, differt.—A reliquis hujus ordinis omnibus staturâ longè majore *H. scorpioides* dignoscitur.

\* 55. *H. revolvens*, caule erectiusculo sub-pinnato; foliis lanceolato-subulatis tortilibus, mediotenus uninervibus; operculo convexo apiculato, Swartz, Musc. Succ. t. 7. f. 14.

— in udis montosis.

Cl. Swartzio, qui hanc plantam in loco natali legit, primusque descripsit, auctore fretus, *H. revolvens* ab *adunco* disjungo. Crescendi modo, habitu, staturâ, fructuque omnino conveniunt; folia autem in illo plerumque nigricantia, rariùs lutescentia, basi angustiora, apice longiora, magis tortilia; perichaetalia angusta, lanceolata, acuminata, erecta, stricta, striis plurimis nigricantibus percursa; rami quoque minus ex ordine pinnati.—An hæc ad species semper et ubique dignoscendas sufficient, ni viri tanti pondere commoverer, certè dubitarem;

at, præsertim cum *H. revolvens* nunquam, nisi dessicatum, viderim, discere, et audire, et meliori credere tutius esse duxi.—In Hiberniâ, prope Swanlinbar, sed absque fructu, legit D. Scott.

56. *H. aduncum*, caule erecto pinnato; foliis ovatis acuminatis mediotenus uninervibus carinatis; operculo convexo apiculato. DILL. t. 37. f. 26.

— in uliginosis,

*β. tenue*; caule elongato gracili; foliis remotiusculis. St. cr. IV. t. 24.

— in aquosis.

Caules erecti, pro loci natalis humore, nunc vix sesquipollicares, nunc palmares, sub-divisi, inferne saepius nudi, supernè ramis sparsis, brevibus, simpliciusculis, apice aduncis pinnati; folia approximata, fulva, ovata, longè acuminata, concavo-carinata, secunda, insigniter falcata, vix tortilia, nervo obscuro, ad medium percurrente instructa; perichaetalia erectiuscula, albanticia, perquam angusta, linearia, sub-striata, apice longo, piliformi, extante; pedicelli sesquipollicares, rubri, laeves; capsulae oblongæ, seu oblongo-ovatae, arcuatæ, cernuae, fulvæ, siccitate rugosæ; operculum breve, convexum, rubrum, umbone exiguo, acuto.—A penultimâ specie, staturâ plus duplo tenuiore, foliisque uninervibus, fulvis, statim dignoscitur, sed

ne var.  $\beta$ , quæ in aquâ profundiore nascitur, obcaules multò graciliores, elongatos, et folia dissita, minus falcata, cum *H. fluitante*, cujus folia summa erecta, rami apice acuti, confundatur, est cavidum.—Folia perichaetalia in  $\beta$  lata, circa pedicellorum basin convoluta, oblonga, mucrone brevi, piliformi.

57. *H. uncinatum*, caule procumbente sub-pinnato; foliis lanceolato-setaceis remotiusculis uninervibus striatis; operculo conico acuminato. St. cr. IV. t. 25.

— in udis montosis.

Caules procumbentes, graciles, palmates, et ultra, sub-simplices, ramis simplicibus, abbreviatis, apice incurvatis vagè pinnati; folia remotiuscula, dilutissimè viridia, splendentia, e basi lanceolatâ, concavâ, longissimè subulata, insigniter falcata, apice crispa et circinalia, concavo-carinata, nervo pallidè fulvo ad apicem ferè pertingente percursa, et striis plurimis obscuris longiusculis notata; perichaetalia perquam longa, lanceolata, apice subulata, uninervia,\* striata, erecta, stricta; pedicelli pollicares, frequentes, dilutè rubri, lèves; capsulae

\* Perichaetalia externa uninervia, interna servo destituta dixerunt Hedwigius Brideliusque: in exemplaribus autem nostris servo crasso, dilute fusco omnia percurruntur.

læ oblongæ, incurvæ, cernuæ, fuscantes, ore patulo; operculum capsulæ concolor, e basi conicâ in rostrum breve, sub-incurvum, arcuatum producitur.—Foliorum colore, operculique formâ, hæc species certissimè a præcedentibus duabus dignoscitur.

58. *H. palustre*, caule repente vagè ramoso; foliis lanceolatis enervibus secundis patulisque; operculo convexo-conico apiculato. St. cr. IV. t. 38. DILL. t. 37. f. 27. A.

*H. luridum*. H.

— in saxis udis.

Caules procumbentes, repentes, cæspitosi, variè implexi, vix unguiculares; rami conferti, vagi, breves, erecti, sub-simplices, apice plerumque leniter incurvi; folia laxè imbricata, in his ramis undique imbricata, erecto-patula, in illis secunda, falcata, omnia lanceolata, acuta, concava, enervia, lurida; perichaetalia albicantia, erecta, stricta, angusta, linearia, acuta, striis\* (in exemplaribus nostris) duabus, fuscis, parallelis, ad apicem pertingentibus, profundè exarata; pedicelli sesquiunguiculares, e luteo rubentes, lèves; capsulae coloris ejusdem, breves, juniores oblongæ, maturæ

\* Folia tenerè uninervia dicit Hedwigius.

ovatae, cernuae; operculum convexo-conicum, breve, mucrone minimo, acutiusculo.—*H. murale* habitu, primo aspectu, aliquantum refert.

- \* 59. *H. fluvatile*, caule repente vagè ramoso; foliis ovatis concavis uninervibus; operculo convexo apiculato. Sp. Musc. t. 71. f. 4.

— in saxis fluviorum.

Caules prostrati, repentes, densè implexi, palmates, et ultra, saepe nudi et filamentosi; rami conferti, elongati, erectiusculi, sub-simplices; folia approximata, infima nigricantia, superiora dilutè viridia, non absque nitore, omnia secunda, falcata, ovata, acuta, carinato-concava, nervo nigricante satis valido percursa; perichaetalia linearilanceolata, acuminata, obsoletè striata, erecta, stricta; pedicelli sub-pollicares, rubentes, læves; capsulae sub-cylindraceæ, graciles, rufo-fuscae, arcuatae, cernuae; operculum luteolum, convexum, umbo ex quo, acuto.—A præcedente, quod multum refert, surculis elongatis, bicoloribus, foliorumque nervo affatim dignoscitur. Capsularum forma plus minus oblonga in utroque variabilis. Varietatem ramis solito duplo crassioribus misit D. Templeton.

- \* 60 *H. alpinum*, caule repente ramosissimo; foliis ovatis acuminatis sub-secundis, medioteius uniner-

vibus; operculo conico acuminato. Sp. Musc.

t. 73. f. 1.—3.

*H. flagellare*. H. (excl. syn.)

— in saxis irriguis alpinis.

Caules prostrati, repentes, implexi, basi non raro nudi et filamentosi; rami conferti, vagi, erectiusculi, nunc simplices, nunc bis ter divisi, apice plerumque leniter falcati; folia approximata, infima ferrugineo-fusca, summa lutescentia, siccitate nitida, omnia ovata, vel ovato-lanceolata, apice acuminata, et ferè piliformia, concava, margine integrerrima, nervo crassiusculo, ferè concolore, prope medium evanescente instructa, modicè falcata, et sub-secunda; perichaetalia parva, albicantia, enervia, e basi latè ovata, acuminata, reflexa, complicato-carinata; pedicelli e ramis orti, sesquiunguiculares, purpurei, tuberculis minutis, sparsis, sub lente, obsiti; capsulae ovatae, spadiceæ, breves, cernuae; operculum longè conicum, acutum, rubens.—*H. flagellare*, Dicks. secundum exemplaria ab ipso accepta, foliis latioribus, neutiquam secundis, enervibus, serrulatis, ab *H. alpino* differt.—Hanc speciem ex Hiberniâ miserunt D. Scott et Templeton.

61. *H. cupressiforme*, caule prostrato pinnato; foliis ovato-subulatis concavis arctè imbricatis enervi-

bus; operculo rostrato. St. cr. IV. t. 23. DILL.  
t. 37. f. 23:

— humi, et in arboribus.

*P. compressum*; ramis tenuioribus; capsula ovata  
erectifuscula.

DILL. t. 37. f. 22.

*H. compressum*. Huds.

— humi, in siccis.

Caules palmares, et ultra, prostrati, repentes,  
sub-divisi, ramis brevibus, approximatis, plerumque  
simplicibus, apice uncinatis, superne insig-  
nitè planis pinnati; folia conferta, sub-disticha,  
coloris nunc straminei, nunc dilatè vel saturatè  
viridis, interdum ex aureo fulvi, concava, ova-  
ta, apice subulata, sub-tortilia, nervo omnino ca-  
rentia, siccitate rugosa; perichaetalia albicantia,  
brevia, angusta, lanceolata, apice piliformi, erec-  
ta, nervo quoque destituta; pedicelli sub-polli-  
cares, rubri, laeves; capsulae cylindraceae, ar-  
cuatae, cernuae, nec raro erectifusculae, rufo-fuscae;

operculum rubrum, e basi convexa cuspidatum,  
rectum.—Speciem hanc summoperè polymorpham  
folia enervia, sub-bifariam disposita, operculumque  
rostratum optimè a congenibus distinguunt. Sur-  
culorum crassitie, ramorum numero et situ, folio-  
rumque colore Hypnum ferè nullum magis ludit.

— Var.  $\beta$ , quam, nisi pro specie distincta ab  
auctoribus censeretur, et ut Dillenii iconem, ab

Hedwigio perpetam ad *H. molluscum* relatam, suo  
in loco citarem, vix enumerasse, non, nisi colore  
pallidissimo, caule gracili, magis compositè pinna-  
to, capsulaque ovata, differre videtur.—Singularem  
hujus speciei varietatem, cuius operculum con-  
vexo-mammillare, censem Bridelius.

62. *H. dubium*, caule prostrato vagè pinnato; foliis o-  
vatis acuminatis uninervibus sub-striatis; opercu-  
lo conico. DILL. t. 36. f. 21. Sp. Musc. t. 53. f.  
8—14.

*Leskeia incurvata*. H.

— in udis montosis,

Caules filiformes, procumbentes, sesquipollicares,  
sub-divisi, ramis vagis, brevibus, simpliciusculis,  
apice sub-falcatis, sparsim pinnati; folia conferta,  
inferiora nigricantia, summa luteola, omnia ovata,  
acuminata, nervo crasso, concolore, usque ad api-  
ces percurrente brevitè mucronata, striis quoque  
prope margines duabus plerumque, nec tamen sem-  
per, notata, concava, caulina erecto-patula, ramea  
falcata, secunda, siccitate neutiquam tortilia; peri-  
chaetalia albicantia, linear-lanceolata, acuminata,  
nervo tenui fusco percursa, erecta, stricta, inter-  
dum sub lente denticulata; pedicelli pollicares,  
atro-purpurei, laeves; capsulae pedicellis conco-  
lores, oblongae, cernuae, maturæ incurvæ; opercu-  
lum, teste Hedwigio, breve, conicum, acutiusculum.

Exemplaria nostra Hibernica, ab am. D. Scott, in pago *Luttrell's Town* dieto, lecta, *Leskeæ incurvatae*, *H.* omnino convenient, nec nisi ramis minus ordinatim pinnatis foliisque perichaetialibus non striatis, ab *H. dubio*, Dicks. differre videntur, unde, consentiente am. Smithio, has stirpes conjunxi. *H. dubium*, Swartz, ut monuit vir ille, si quis alias, ingenuas, ad *H. flicinum* est referendum.

63. *H. commutatum*, caule procumbente pinnato; foliis ovato-subulatis tortilibus, mediotenus uninervibus; capsula oblonga; operculo conico. St. cr. IV. t. 26. DILL. t. 36. f. 19. B—D.\*

— in udis.

Caules procumbentes, palmates, spithamei, et ultra, simplices, vel semel atque iterum vagè divisi, ramis approximatis, brevibus, horizontalibus, apice incurvis, pinnati; folia fulvo-viridia, densè imbricata, latè ovata, longè subulata, carinato-concava, madore, æque ut siccitate, incurva, et circinalia, nervo crasso, ferè concolore mediotenus-notata, sèpiùs brevissimè basi striata; perichaetalia magna, albantia, oblongo-lanceolata, acuminata, striata,

\* Dillenii figuræ, E, F, quas hue olim adducendas censueram, ad sequentem potius pertinere speciem amicissimi Smithii observationibus magis accuratis edoceor.

erecta, stricta; pedicelli e ramis summis orti, sèpe gregarii, bipollicares, et ultra, atro-rubentes, laves; capsulae pedicellis concolores, sesquilineares, oblongæ, graciles, arcuatæ, cernuæ; operculum fuscescens, conicum, acutum, apice interdum leniter incurvum.—Vallantii, in Bot. Par. t. 29. f. 9, sub hâc specie ab Hedwigio citatam, Bridelius fide ejus herbarii ad *H. flicinum* retulit.

64. *H. flicinum*, caule procumbente pinnato; foliis ovato-subulatis uninervibus; capsula oblonga; operculo convexo apiculato. Sp. Musc. t. 76. f. 5.—10. DILL. t. 36. f. 19. A, E, F.

*H. dubium*. Swartz.

*H. diastrophylum*. Swartz.

*H. compressum*. BRID.

— in palustribus.

Formâ, habitu, colore, perichaetio, et capsula, cum precedente convenit, sed differt staturâ aliquantum minore, caule minus ordinatè pinnato, pedicellis e caule prostrato semper ortis, nervo folia percurrente, et in mucronem brevem exente, foliis brevioribus, falcatis, neutiquam tortilibus, operculoque convexo, breviter apiculato.—*H. compressum*, Brid. fide accuratissimi Schraderi, et *H. dubium* et *diastrophylum*, Swartzii, monente ipso Swartzio, sub hâc specie citavi.

65. *H. molluscum*, caule procumbente pinnato; foliis ovato-subulatis arctè imbricatis enervibus; capsula sub-globosâ; operculo conico. St. cr. IV. t. 22. (excl. Syn. Dill.) DILL. t. 36. f. 20.

*H. crista-eastrensis*. Huds.

— in ericetis.

Caules, pennæ instar, pulchrè plumosi, plerumque vix pollicares, interdum plus duplo longiores, simpliciusculi, prostrati, implexi, ramis brevibus, simplicibus, approximatis, uncinatis pinnati; folia lœtè flavo-viridia, nitida, conferta, caulinâ lata, cordato-triquetra, ramea ovata, omnia falcata, in apicem longum, subulatum, circinalem desinentia, concava, nervo omnino carentia; perichaetalia perquam brevia, e luteo albantia, oblongo-ovata, enervia, apice brevi piliformi, erecta; pedicelli sub-pollicares, atro-purpurei, læves; capsulæ pedicellis aliquantûm pallidiores, ovato-globosaæ, abbreviatæ, cernuæ; operculum ferrugineum, conicum, obtusiusculum.—Plantam hanc, cum *H. crista-castrensi*, L. a Dillenio, Bridelio, plurimisque auctoribus commixtam, unde in synonymis inextricabilis error, primus extricavit Hedwigius: est autem *H. crista-castrensis* palmaris, et ultra, foliaque habet linearia, acuminata, striata, lutescentia, siccitate splendida, et capsulam oblongam, vel cylindraceam, gracilem, arcuatam.

22. **FONTINALIS. SCHREB. Gen. Pl.**

n. 1655. **HEDW. Fund. II. p. 96. t. 9.**

f. 53—55.

*Caps.* oblonga, perichaetio imbricato obvoluta. *Perist.* duplex: *exterius* dentibus sedecim, latiusculis; *interius* membrana conica, reticulata.

1. *F. antipyretica*, caule triquetro ramosissimo; foliis ovatis acutis complicato-carinatis enervibus; capsula sessili; operculo acuminato. DILL. t. 33. f. 1. E. B. V. t. 359.

— in fluviis.

Caules fluitantes, dodrantales, interdum pedales, vel sesquipedales, e foliorum dispositione triquetri, ramosissimi; rami patentes, sub-divaricati; folia laxiusculè imbricata, nunc saturatè, nunc dilutè viridia, ovata, vel oblongo-ovata, acuta, integerrima, prorsùs enervia, complicato-carinata; perichaetalia pallidiora, ex oblongo sub-rotunda, brevia, imbricata, concava, appressa, nervi quoque expertia; capsulæ laterales, ellipticæ, fuscescentes, brevissimè pedicellatae, perichaetio obtectæ; operculum conicum, acuminatum, rufescens, rectum.

2. *F. squamosa*, caule triquetro ramosissimo; foliis lan-

œcolatis acuminatis planis enervibus ; capsula sub-sessili ; operculo conico. St. cr. III. t. 12.  
DILL. t. 33. f. 3.

— in flaviis alpinis.

Ejusdem ferè cum præcedente longitudinis, sed plus triplò tenuior ; caules, ut in illâ, fluitantes, triquetri, ramosissimi ; rami filiformes, sub-dichotomi ; folia laxè imbricata, plerumque omnia obscurè fusco-viridia, interdum summa lutescentia, lanceolata, acuminata, integerrima, enervia, plana, vel levitè concava, sed neutiquam complicato-carinata ; perichaetalia nigro-fusca, enervia, lata, oblonga, obtusa, apice, in exemplaribus nostris, scariosa, incisa ; capsulae laterales, elliptico-cylindraceæ, ore in effectis patulo, fuscescentes, brevissimè pedicellatæ, perichaetio obtectæ ; operculum, quod ipse non vidi, teste Smithio, conicum, breve, obtusum.—Staturâ gracili, colore obscuro, foliis planis, operculoque obtuso, primo aspectu a *F. antipyretica* dognoscitur.

FINIS.

## INDEX.

(Literæ obliquæ synonyma indicant.)

<i>ANDREA</i> <i>alpina</i> . . . . .	13	{	<i>pomi-</i>
<i>rupestris</i> . . . . .	14		<i>formis</i> . . . . . 108
<i>rupestris</i> . . . . .	13	{	<i>BRYUM</i> <i>aciculare</i> . . . . . 67
<i>ANICTANGIUM</i> <i>cilia-</i>			<i>acutum</i> . . . . . 29
<i>tum</i> . . . . .	11	{	<i>alpinum</i> . . . . . 125
<i>BARBULA</i> <i>apiculata</i> .	46		<i>androgynum</i> 112
<i>convoluta</i> . . . . .	49	{	<i>annotinum</i> . . . . . 123
<i>fallax</i> . . . . .	48		<i>apocarpum</i> . . . . . 20
<i>humilis</i> . . . . .	45	{	<i>apocarpum</i> . <i>β.</i> . . . . . 11
<i>rigida</i> . . . . .	43		<i>argenteum</i> . . . . . 122
<i>ruralis</i> . . . . .	50	{	<i>aureum</i> . . . . . 118
<i>unguiculata</i> . . . . .	47		<i>bicolor</i> . . . . . 121
<i>BARTRAMIA</i> <i>arcuata</i> .	109	{	<i>bimum</i> . . . . . 127
<i>fontana</i> . . . . .	107		<i>bipartitum</i> . . . . . 72
<i>Halleriana</i> . . . . .	109	{	<i>cæspiticium</i> . . . . . 120

## INDEX.

- BRYUM calcareum* . . . . . 25  
*callistomum* . . . . . 63  
*canescens* . . . . . 40  
*capillaceum* . . . . . 35  
*capillare* . . . . . 120  
*carneum* . . . . . 119  
*Celsii* . . . . . 71  
*cerviculatum* . . . . . 64  
*ciliatum* . . . . . 11  
*cirratum*.  $\beta$  . . . . . 36  
*compactum* . . . . . 124  
*conoides* . . . . . 112  
*crudum* . . . . . 130  
*cuneifolium* . . . . . 51  
*curvirostrum* . . . . . 29  
*cuspidatum* . . . . . 131  
*Daviesii* . . . . . 24  
*dealbatum* . . . . . 115  
*delicatulum* . . . . . 119  
*Dicksoni* . . . . . 27  
*elongatum* . . . . . 114  
*ericoides* . . . . . 38  
*extinctorium* . . . . . 18  
*fallax* . . . . . 48  
*fasciculare* . . . . . 10  
*flagellarè* . . . . . 61  
*flavescens* . . . . . 70  
*flexuosum* . . . . . 74  
*fontanum* . . . . . 107
- BRYUM fragile* . . . . . 74  
*glaucum* . . . . . 73  
*Heimii* . . . . . 10  
*heteromallum* . . . . . 62  
*heterostichum* . . . . . 37  
*hornum* . . . . . 128  
*hypnoides.  $\alpha$*  . . . . . 38  
*hypnoides.  $\beta$*  . . . . . 39  
*hypnoides.  $\gamma$*  . . . . . 38  
*hypnoides.  $\delta$*  . . . . . 40  
*imberbe* . . . . . 48  
*lanceolatum* . . . . . 19  
*laterale* . . . . . 109  
*ligulatum* . . . . . 184  
*lutescens* . . . . . 39  
*macrocarpon* . . . . . 40  
*marginatum* . . . . . 129  
*minutum* . . . . . 26  
*mucronulatum* . . . . . 47  
*murale* . . . . . 51  
*nudum* . . . . . 25  
*nutans* . . . . . 117  
*obtusifolium* . . . . . 116  
*obtusum* . . . . . 9  
*ovale* . . . . . 77  
*ovatum* . . . . . 9  
*palustre* . . . . . 113  
*palustre* . . . . . 69  
*paucifolium* . . . . . 54

## INDEX.

- BRYUM pellucidum* . . . . . 69  
*pellucidum.  $\beta$*  . . . . . 68  
*piliferum* . . . . . 79  
*polyphyllum* . . . . . 36  
*pomiforme* . . . . . 108  
*pulchellum* . . . . . 119  
*pulvinatum* . . . . . 78  
*punctatum* . . . . . 132  
*pyriforme* . . . . . 11  
*pyriforme* . . . . . 118  
*recurvatum* . . . . . 24  
*rigidulum* . . . . . 34  
*rigidum* . . . . . 43  
*roseum* . . . . . 132  
*rufescens* . . . . . 66  
*rurale* . . . . . 50  
*scoparium* . . . . . 58  
*sericeum* . . . . . 117  
*serratum* . . . . . 129  
*setaceum* . . . . . 49  
*setaceum.  $\beta$*  . . . . . 29  
*simplex* . . . . . 65  
*splachnoides* . . . . . 29  
*striatum* . . . . . 95  
*striatum.  $\beta$*  . . . . . 94  
*striatum.  $\delta$*  . . . . . 93  
*subulatum* . . . . . 44  
*tectorum* . . . . . 94  
*tenue* . . . . . 72
- BRYUM tortuosum* . . . . . 52  
*triquetrum* . . . . . 115  
*truncatulum* . . . . . 7  
*turbanatum* . . . . . 126  
*undulatum* . . . . . 133  
*undulatum* . . . . . 91  
*vaginale* . . . . . 65  
*ventricosum* . . . . . 126  
*verticillatum* . . . . . 31  
*virens* . . . . . 27  
*viridissimum* . . . . . 71  
*viridulum* . . . . . 27  
*viridulum* . . . . . 54  
*Weissia* . . . . . 30  
*Zierii* . . . . . 123
- BUXBAUMIA aphylla* 104  
*foliosa* . . . . . 104
- CYNONTODIUM capil-*  
*laceum* . . . . . 35
- DICRANUM aciculare* 67  
*adiantoides* . . . . . 57  
*aquaticum* . . . . . 68  
*bryoides* . . . . . 53  
*bryoides* . . . . . 55  
*callistomum* . . . . . 63  
*Celsii* . . . . . 71  
*cerviculatum* . . . . . 64  
*crispum* . . . . . 65  
*ellipticum* . . . . . 76

## INDEX.

**DICRANUM** flagellare 61  
 flavescens . . . . . 70  
 flexuosum . . . . . 74  
 fuscescens . . . . . 60  
 glaucum . . . . . 73  
 heteromallum . . . . . 61  
 latifolium . . . . . 79  
 majus . . . . . 58  
 osmundiooides . . . . . 55  
 ovale . . . . . 77  
 ovatum . . . . . 77  
 pellucidum . . . . . 68  
*polyphyllum* . . . . . 35  
*polysetum* . . . . . 60  
 pulvinatum . . . . . 78  
 purpureum . . . . . 72  
 rigidulum . . . . . 62  
 rufescens . . . . . 66  
 sciurooides . . . . . 32  
 scoparium . . . . . 58  
 Scottianum . . . . . 75  
 squarrosum . . . . . 69  
 subulatum . . . . . 63  
*tamarindifolium* 55  
*taxifolium* . . . . . 56  
 undulatum . . . . . 59  
 varium . . . . . 65  
 virens . . . . . 69  
 viridissimum . . . . . 71

**DICRANUM** *viridulum* 53  
**DIDYMODON** *capilla-*  
*ceum* . . . . . 35  
*rigidulum* . . . . . 34  
**ENCALYPTA** ciliata . . 18  
*cirrata* . . . . . 27  
*extinctoria* . . . . . 18  
*lanceolata* . . . . . 19  
*vulgaris* . . . . . 17  
**FISSIDENS** *adiantoi-*  
*des* . . . . . 57  
*bryoides* . . . . . 53  
*exilis* . . . . . 54  
*osmundiooides* . . . . . 55  
*pulvinatus* . . . . . 78  
*sciurooides* . . . . . 32  
*taxifolius* . . . . . 56  
**FONTINALIS** *alpina* . . 41  
*antipyretica* . . . . . 199  
*minor* . . . . . 41  
*secunda* . . . . . 102  
*squamosa* . . . . . 199  
**FUNARIA** hygrometri-  
*ca* . . . . . 105  
**GRIMMIA** acuta . . . . . 29  
*alpicola* . . . . . 22  
*apocarpa* . . . . . 20  
*calcarea* . . . . . 25  
*controversa* . . . . . 27

**GRIMMIA** crispula . . . 28  
*Daviesii* . . . . . 24  
*Dicksoni* . . . . . 27  
*heteromalla* . . . . . 30  
*maritima* . . . . . 23  
*nuda* . . . . . 25  
*recurvata* . . . . . 24  
*recurvirostra* . . . . . 29  
*rivularis* . . . . . 21  
*Starkeana* . . . . . 26  
*stricta* . . . . . 20  
*verticillata* . . . . . 31  
**GYMNOSTOMUM** *cilia-*  
*tum* . . . . . 11  
*dubium* . . . . . 9  
*fasciculare* . . . . . 10  
*Heimii* . . . . . 9  
*intermedium* . . . . . 7  
*obtusum* . . . . . 9  
*ovatum* . . . . . 9  
*pyriforme* . . . . . 11  
*recurvirostrum* . . . . . 31  
*truncatulum* . . . . . 7  
*truncatum* . . . . . 7  
**HEDWIGIA** *ciliata* . . 11  
**HYPNUM** *abietinum* 162  
*acacioides* . . . . . 56  
*adiantoides* . . . . . 57  
*adnatum* . . . . . 165  
**HYPNUM** *aduncum* . . 189  
*albicans* . . . . . 171  
*alopecurum* . . . . . 163  
*alpinum* . . . . . 192  
*arbuscula* . . . . . 163  
*aspleniooides* . . . . . 56  
*atro-virens* . . . . . 169  
*atro-virens* . . . . . 151  
*bryoides* . . . . . 53  
*chrysocomum* . . . . . 110  
*clavellatum* . . . . . 148  
*commutatum* . . . . . 196  
*complanatum* . . . . . 144  
*complanatum*.  $\beta$  . . 145  
*compressum* . . . . . 194  
*compressum* . . . . . 197  
*compressum* . . . . . 176  
*confertum* . . . . . 148  
*confertum* . . . . . 166  
*crispum* . . . . . 101  
*crista-castreensis* 198  
*cupressiforme* . . . . . 193  
*curtipendulum* . . . . . 102  
*curvatum* . . . . . 139  
*cuspidatum* . . . . . 177  
*dendroides* . . . . . 138  
*denticulatum* . . . . . 146  
*diastrophylum* . . . . . 197  
*dubium* . . . . . 195

## INDEX.

*HYPNUM dubium* . 197  
*filicinum* . . . . 197  
*filiforme* . . . . 137  
*flagellare* . . . . 193  
*fluitans* . . . . 182  
*fluviatile* . . . . 192  
*implexum* . . . . 173  
*intricatum* . . . . 167  
*intricatum* . . . . 150  
*inundatum* . . . . 143  
*laetè-virens* . . . . 149  
*longirostrum* . . . . 180  
*loreum* . . . . 185  
*lucens* . . . . 155  
*luridum* . . . . 191  
*lutescens* . . . . 174  
*medium* . . . . 142  
*molluscum* . . . . 198  
*murale* . . . . 166  
*muticum* . . . . 176  
*myosuroides* . . . . 140  
*myosuroides* . . . . 166  
*myosuroides* . . . . 141  
*myosurum* . . . . 141  
*myurum* . . . . 140  
*nigro-viride* . . . . 141  
*palustre* . . . . 191

*HYPNUM parietinum* 157  
*parietinum* . . . . 156  
*piliferum* . . . . 178  
*plumosum* . . . . 172  
*polyanthos* . . . . 187  
*prælongum* . . . . 160  
*proliferum* . . . . 157  
*proliferum* . . . . 156  
*prolixum* . . . . 153  
*protensum* . . . . 161  
*pseudo-plumosum* 172  
*pulchellum* . . . . 136  
*purum* . . . . 175  
*purum. β.* . . . . 176  
*revolvens* . . . . 188  
*riparioides* . . . . 153  
*riparium* . . . . 152  
*rotundifolium* . . . . 149  
*ruscifolium* . . . . 153  
*rusciforme* . . . . 153  
*rutabulum* . . . . 179  
*rutabulum. γ.* . . . . 180  
*rutabulum. δ.* . . . . 153  
*Schreberi* . . . . 176  
*sciuroides* . . . . 32  
*scorpioides* . . . . 187  
*sericeum* . . . . 138  
*sericeum. β.* . . . . 172  
*sericeum. γ.* . . . . 147

## INDEX.

*HYPNUM serpens* . 168  
*serrulatum* . . . . 148  
*spinulosum* . . . . 168  
*splendens* . . . . 156  
*squarrosum* . . . . 184  
*stellatum* . . . . 183  
*Stokesii* . . . . 159  
*stramineum* . . . . 164  
*striatum* . . . . 180  
*subtile* . . . . 135  
*sylvaticum* . . . . 146  
*Swartzii* . . . . 151  
*tamariscinum* . . . . 157  
*taxifolium* . . . . 56  
*Teesdalii* . . . . 150  
*Teesdalii* . . . . 168  
*tenellum* . . . . 170  
*Thuringicum* . . . . 181  
*trichomanoides* 145  
*triquetrum* . . . . 186  
*umbratum* . . . . 158  
*uncinatum* . . . . 190  
*undulatum* . . . . 154  
*velutinum* . . . . 167  
*viticulosum* . . . . 103  
*JUNGERMANNIA alpi-*  
*na* . . . . . 13  
*rupestris* . . . . 14  
*LEERSIA ciliata* . . . . 18  
*fimbriata* . . . . 18  
*LEERSIA lanceolata* . 19  
*vulgaris* . . . . 18  
*LESKEA complanata* 144  
*dendroides* . . . . 139  
*incurpata* . . . . 195  
*paludosa* . . . . 148  
*plumosa?* . . . . 172  
*polyantha* . . . . 137  
*polycarpa* . . . . 142  
*pubella* . . . . 136  
*sericea* . . . . 138  
*subtilis* . . . . 135  
*trichomanoides* 145  
*MEESIA dealbata* . 115  
*longisteta* . . . . 116  
*MNIUM androgynum* 113  
*annotinum* . . . . 123  
*arcuatum* . . . . 110  
*crudum* . . . . 130  
*cuspidatum* . . . . 131  
*fontanum* . . . . 107  
*hornum* . . . . 128  
*hygrometricum* 105  
*palustre* . . . . 113  
*pellucidum* . . . . 13  
*polytrichoides* . . . . 89  
*polytrichoides. β.* . . . . 88  
*pseudo - trique-*  
*trum* . . . . . 127  
*punctatum* . . . . 132

- MNIUM purpureum* . 72  
*pyriforme* . . . . . 118  
*ramosum* . . . . . 113  
*roseum* . . . . . 133  
*serpyllifolium.α.* 132  
*serpyllifolium.β.* 131  
*serpyllifolium.γ.* 133  
*serpyllifolium.δ.* 133  
*turbinatum* . . . 126  
*undulatum* . . . 134  
*NECKERA crispa* . . 101  
*curtipendula* . . 102  
*dendroides* . . . 139  
*heteromalla* . . 102  
*viticulosa* . . . 103  
*ORTHOTRICHUM af-*  
*fine* . . . . . 96  
*anomalum* . . . 94  
*aristatum* . . . 100  
*crispum* . . . . 93  
*diaphanum* . . . 99  
*diaphanum* . . . 100  
*nudum* . . . . 97  
*pumilum* . . . . 98  
*rivulare* . . . . 96  
*saxatile* . . . . 94  
*striatum* . . . . 95  
*PHASCUM acaulon* . . 3  
*acaulon.β.* . . . . 3

- { *PHASCUM axillare* . . . 1  
*confervoides* . . . 4  
*crispum* . . . . 2  
*curvicolle* . . . . 4  
*curvisetum* . . . . 3  
*cuspidatum* . . . . 3  
*montanum* . . . . 104  
*muticum* . . . . . 3  
*nitidum* . . . . . 1  
*patens* . . . . . 2  
*rectum* . . . . . 4  
*serratum* . . . . . 4  
*stoloniferum* . . . . 4  
*subulatum* . . . . . 1  
*POMELIA elongata* . . 114  
*POLYTRICHUM aloi-*  
*des* . . . . . 88  
*alpinum* . . . . . 85  
*attenuatum* . . . . 83  
*aurantiacum* . . . . 84  
*commune* . . . . . 80  
*commune.β.* . . . . 82  
*commune.γ.* . . . . 82  
*Dicksoni* . . . . . 90  
*formosum* . . . . . 84  
*gracile* . . . . . 85  
*juniperinum* . . . . 82  
*longisetum* . . . . 85  
*nanum* . . . . . 89

- POLYTRICHUM piliferum* . . . . . 82  
*pulverulentum* . . . . . 87  
*pumilum* . . . . . 90  
*rubellum* . . . . . 87  
*striatum* . . . . . 95  
*striatum.β.* . . . . . 94  
*striatum.δ.* . . . . . 93  
*strictum* . . . . . 83  
*subrotundum* . . . . . 89  
*undulatum* . . . . . 91  
*urnigerum* . . . . . 86  
*PTEROGONIUM sciuroides* . . . . . 32  
*SPHAGNUM alpinum* . . 74  
*arboreum* . . . . . 102  
*capillaceum* . . . . . 6  
*capillifolium* . . . . . 6  
*cuspidatum* . . . . . 6  
*cymbifolium* . . . . . 5  
*latifolium* . . . . . 5  
*palustre* . . . . . 5  
*palustre.β.* . . . . . 6  
*SPLACHNUM ampullaceum* . . . . . 16  
*gracile* . . . . . 16  
*ovatum* . . . . . 15  
*sphaericum* . . . . . 16
- { *SPLACHNUM sphéri-*  
*cum.β.* . . . . . 15  
*Turnerianum* . . . . . 16  
*SWARTZIA capillacea* . . 35  
*pilifera* . . . . . 79  
*TETRAPHIS pellucida* . . 13  
*TORTULA acuminata* . . 51  
*apiculata* . . . . . 46  
*convoluta* . . . . . 49  
*cuneifolia* . . . . . 51  
*fallax* . . . . . 48  
*humilis* . . . . . 45  
*mucronulata* . . . . . 47  
*muralis* . . . . . 50  
*rigida* . . . . . 43  
*ruralis* . . . . . 50  
*subulata* . . . . . 44  
*tortuosa* . . . . . 52  
*unguiculata* . . . . . 47  
*TRICHOSTOMUM ca-*  
*-nescens* . . . . . 39  
*capillaceum* . . . . . 35  
*ericoides* . . . . . 38  
*fasciculare* . . . . . 39  
*fontinalioides* . . . . 41  
*heterostichum* . . . . 37  
*lanuginosum* . . . . 38  
*microcarpum* . . . . 40

<b>TRICHOSTOMUM</b>	<b>po-</b>	<b>WEISSIA</b>	<i>heteromalla</i>	30
<i>lyphyllum</i>	35		<i>recurvirostra</i>	29
<i>rigidulum</i>	34		<i>rupestris</i>	29
<b>WEISSIA</b>	<i>acuta</i>	29	<i>Starkeana</i>	26
	<i>cirrata</i>	27	<i>virens</i>	27
	<i>controversa</i>	27		
	<i>crispula</i>	28	<b>WEBERA</b>	<i>nutans</i>
				117
				<i>pyriformis</i>
				118

## EXPLICATIO ICONUM.

- TAB. I...., fig. a—c. *Gymnostomum intermedium*. p. 7.  
 a. Plantulæ, magn. nat. b. Plantula, magn. auct.  
 c. Folium, magn. auct.
- TAB. I...., fig. d—f. *Gymnostomum truncatulum*. p. 7.  
 d. Plantula, magn. nat. e. Eadem, magn. auct.  
 f. Folium, m. auct.
- TAB. I...., fig. g—i. *Gymnostomum obtusum*. p. 9.  
 g. Plantula, magn. nat. h. Eadem, m. auct.  
 i. Folium, m. auct.
- TAB. II...., fig. 1. *Grimmia stricta*. p. 20.  
 a. Plantulæ duæ, magn. nat. b. Capsula cum pedicello et operculo, m. auct. c. Folium, m. auct.
- TAB. II...., fig. 2. *Grimmia rivularis*. p. 21.  
 a. Plantula, magn. nat. b. Caps. cum pedicello, m. auct. c. Operculum cum columellâ, m. auct. d. Peristomii dens. e. Folium.
- TAB. III...., fig. 1. *Dicranum pulvinatum*. 3. p. 78.  
 a. Plantulæ, magn. nat. b. Folium, magn. auct.  
 c. Capsula cum pedicello, m. auct. d. Operculum, m. auct.



TAB. III.... fig. 2. *Grimmia maritima*. p. 23.

- a, b. Plantulæ, m. nat. c. Folium e superioribus,  
m. auct. d. Folium ex inferioribus, m. auct.
- e. Capsula cum pedicello, m. auct. f. Opercu-  
lum cum columellâ, m. auct.

TAB. IV.... *Dicranum majus*. p. 58.

- a. Plantulæ duæ, m. nat. b. Folium, m. auct.
- c. Capsula, m. auct. d. Operculum. e. Calyp-  
tra. f. Peristomii dens.

TAB. V.... fig. 1. *Dicranum fuscescens*. p. 60.

- a. Plantulæ, magn. nat. b. folium, magn. auct.
- c. Capsula. d. Capsula cum operculo. (Ex exem-  
plare e Germaniâ.) e. Peristomii dens.

TAB. V.... fig. 2. *Dicranum flexuosum*. γ. p. 74.

- a. Plantulæ ex Hiberniâ. b. Plantulæ e Cam-  
briâ, magn. nat. c. Folium, m. auct. d. Capsula.
- e. Operculum. f. Calyptre. g. Peristomii dens.

TAB. VI.... fig. 1. *Dicranum Scottianum*. p. 75.

- a, b. Plantulæ, magn. nat. c. Folium, m. auct.
- d. Capsula. e. Operculum. f. Peristomii dens.

TAB. VI.... fig. 2. *Dicranum ellipticum*. p. 76.

- a, b. Plantulæ, magn. nat. c. Folium, m. auct.
- d. Capsula. e. Operculum. f. Peristomii dens.

TAB. VII.... *Trichostomum polyphyllum*. p. 35.

- a. Plantula madida, magn. nat. b. Pars plantulæ  
siccescentis. c. Folium, m. auct. d. Capsula.
- e. Operculum. f. Calyptre. g. Peristomii  
dens integra. h. Peristomium, ut sæpius occur-  
rit, diffractum.

TAB. VIII.... *Orthotrichum rivulare*. p. 96.

- a. Plantula, magn. nat. b. Folium, m. auct.
- c. Capsula. d. Operculum. e. Calyptre. f. Pe-  
ristomii pars.

TAB. IX.... fig. 1. *Orthotrichum diaphanum*. p. 99.

- a. Plantulæ, magn. nat. b. Plantula, m. auct.
- c. Folium. d. Capsula. e. Operculum. f. Ca-  
lyptre. g. Folii pars, a tergo visa.

TAB. IX.... fig. 2. *Orthotrichum aristatum*. p. 100.

- a. Plantula, magn. auct. b. Folium. c. Folii  
pars, a tergo visa.

TAB. X.... fig. 1. *Bartramia fontana*. β. p. 107.

- a. Plantulæ, magn. nat. b. Folium, m. auct.
- c. Capsula a latere. d. Eadem a fronte visa.
- e. Eadem discessa. f. Peristomii externi dens.
- g. Operculum.

TAB. X.... fig. 2. *Polytrichum Dicksoni*. p. 90.

- a. Plantula, magn. nat. b. Folium, m. auct.
- c. Capsula. d. Operculum. e. Calyptre.
- f. Peristomii dens.

TAB. XI.... fig. 1. *Bryum obtusifolium*. p. 116.

- a. Plantulæ, magn. nat. b. Folium, m. auct.
- c. Capsula. d. Operculum. e. Peristomii pars.

TAB. XI.... fig. 2. *Bryum bicolor*. p. 121.

- a, b. Plantulæ, magn. nat. c. Folium, m. auct.
- d. Capsula. e. Operculum. f. Peristomii pars.

TAB. XII.... fig. 1. *Hypnum denticulatum*. β. p. 146.

- a, b. Plantæ, magn. nat. c. Rami pars, magn. auct.

## EXPLICATIO

*d. Folium. e. Capsula. f. Capsula cum operculo. g. Peristomii pars.*

TAB. XII.....fig. 2. *Hypnum denticulatum*. γ. p. 146.  
*a, b. Planta, magn. nat. c. Rami pars, m. auct.  
d. Folium. e. Capsula cum operculo.*

TAB. XIII.....*Hypnum latè-virens*. p. 149.  
*a. Planta sterilis, ex Hiberniâ missa, magn. nat.  
b. Planta cum fructu, a Dicksono communicata.  
c. Rami pars, magn. auct. d. Folium. e. Capsula cum operculo.*


TAB. XIV.....fig. 1. *Hypnum Swartzii*. p. 151.  
*a. Planta, magn. nat. b. Rami pars, magn. auct.  
c. Folium. d. Capsula cum operculo.*

TAB. XIV.....fig. 2. *Hypnum Swartzii*. β. p. 151.  
*e. Plantæ, magn. nat. f. Rami pars, magn. auct.  
g. Folium.*

TAB. XV.....fig. 1. *Hypnum plumosum*. p 172.  
*a. Planta, magn. nat. b. Folium, magn. auct.  
c. Folium perichaetiale. d. Capsula. e. Peristomii pars.*

TAB. XV.....fig. 2. *Hypnum Stokesii*. p. 159.  
*a. Planta, magn. nat. b. Rami pars, magn. auct.  
c. Folium perichaetiale. d. Capsula.*

TAB. XVI.....*Hypnum implexum*. p. 173.  
*a. Planta, magn. nat. b. Ejusdem pars. c. Folium, magn. auct. d. Folium perichaetiale.  
e. Capsula cum operculo. f. Calyptre.*




*a b. Gymnophyton intermedium p. 7.  
c d. f. —— tenuistylum p. 7.  
g h. —— obtusum p. 7.*



1. *grimmia stricta* p. 20  
2. — *rivularis* p. 22





1 Dicranum pulvinatum B. p. 78  
2 Grimmia maritima p. 23.



*Dicranum majus*. p58





1 *Dicranum junceum* p. 60

2 —— *flexuosum* V. p. 74





1. *Dichanthium scoticum* p. 75.  
2. — *ellipticum* p. 76





*Trichostomum polyphyllum* p. 35.








1. *orthotrichum diaphanum* p. 99.  
2. — *arietinum* p. 100.




1. *Bartramia fontana* f. p. 107  
2. *Polytrichum Dicksonii* p. 90.






1 *Bryum obtusifolium* p. 116.  
2 — *bicolor*. p. 121.







1. *Hypnum denticulatum* B. p. 146.  
2. — — — 2.





J. Lister-virens p. 149



1. f. *s. Warlei*: p. 151.  
2. f. — B.



1



2



*1. g. plumosum* p. 172  
*2. g. stokoei.* p. 151

