

Resp Pp PL 206-4

CATALOGUE
DES ARBRES FRUITIERS,
ARBRES D'ALIGNEMENT,
ARBRISSEAUX ET ARBUSTES
DE PLEINE TERRE,
GRAINES, BULBES ET PLANTS,


Qu'on trouve chez le ^{Pin} ~~seur~~ A. FERRIERE,
Jardinier-Botaniste ~~de l'Académie des Sciences~~ ^{de Jardin des Plantes}
de Toulouse, rue des Fleurs. *Carmes des Moines*

PRIX 12 sous, broché.



A TOULOUSE,

Chez D. DESCLASSAN, Maître-ès-Arts, Imprimeur de
l'Académie Royale des Sciences, près la Place-Royale.



1791.



CATALOGUE
OF THE
MUSEUM OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
OF HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS

On page 100 is a list of
the names of the
collections of the
Museum of Comparative Zoology
and Anatomy of Harvard University
at Cambridge, Massachusetts.

1900

Order of the Board of Trustees, Harvard University,
Cambridge, Massachusetts, 1900.



A V I S.

VOICI le premier Catalogue de ce genre qui ait encore paru dans les Provinces méridionales. Feu PANSERON, habile Pépiniériste, ayant quitté Paris en 1764 pour venir établir des pépinières à Toulouse, y porta le premier quelques belles especes d'arbres étrangers, que ses successeurs ont depuis multipliées, & qu'ils annoncent encore aujourd'hui sur leurs Catalogues.

Le goût de la culture des arbres s'étant singulièrement répandu depuis cette époque, je reçois journellement des demandes de ce genre, qu'il m'étoit impossible de satisfaire, parce que la plupart des especes demandées étoient à peine connues dans le pays par quelque habile Amateur. Je conçus alors l'idée de former des pépinières, & d'élever, outre les arbres fruitiers, le plus d'especes possibles, d'arbres & d'arbrisseaux étrangers que l'expérience m'a appris pouvoir supporter en pleine terre les hivers de nos Provinces.

J'ai retiré un grand profit des leçons des Maîtres habiles & des Savans sous lesquels ma place de Jardinier-Botaniste de l'Académie m'a mis dans le cas de travailler assidûment, ainsi que des correspondances qu'elle m'a procuré. Ce dont je me pique le plus, c'est de la sincérité dans le choix des especes à laquelle j'ai apporté des soins presque scrupuleux.

On trouvera sous chaque genre quelle est l'exposition & le sol qui lui convient. Les bornes d'un Catalogue ne m'ont pas permis de donner de plus grands détails sur la culture. Elle seule exigeroit un ouvrage exprès, si on vouloit recueillir tout ce qui a été écrit à ce sujet. Je n'ai eu d'autre intention que d'indiquer aux Amateurs tous les arbres & arbrisseaux qui peuvent entrer dans les jardins fruitiers,

dans ceux de curiosité ou de décoration, & leur donner en même-temps les moyens de se les procurer, de les placer avec succès, & d'éviter les méprises dans les demandes.

Les personnes qui voudront bien m'adresser des lettres ou des demandes, sont priées de les affranchir, de donner leur adresse d'une manière non équivoque, & d'indiquer, lorsqu'elles demanderont des arbres ou arbrisseaux étrangers, quelle est la taille à peu-près qu'elles exigeront pour chaque sujet. En général, les arbres verts, & d'autres especes délicates, veulent être élevées en pot, & ensuite on les place, quand on veut, à demeure, & toujours en motte; ce qui est un grand avantage, & ne laisse aucune crainte sur la reprise, pour peu qu'on en ait soin dans les fortes chaleurs.

Outre un assortiment honnête des especes indiquées dans ce Catalogue, je puis fournir, en telle quantité qu'on le désirera, des Ormes de toute qualité & de toute grosseur venus de graine, ainsi que des Frênes, des Sorbiers des oiseaux, de Laponie, & autres qu'on plante plus communément dans les grandes plantations, & dont on élève pour cette raison un plus grand nombre.



ARBRES ET ARBRISSEAUX.

ACER.

ACER Campestre.
 — Variegatum.
 Canadense.
 Creticum.
 Monspeffulanum.
 Negundo.
 — Masc.
 — Fœmina.
 Opalus.
 Pensylvanicum.
 Platanoides.
 — Laciniostum.
 Pseudo platanus.
 — Variegatum.
 Rubrum.
 — Masc.
 — Fœmina.
 Saccharinum.
 Tataricum.
 Tomentosum.

ERABLE.

ERABLE des bois.
 — Panaché.
 A bois jaspé de Canada.
 De Crete, ou toujours vert.
 De Montpellier.
 A feuille de frêne.
 — Le mâle.
 — La femelle.
 Opale.
 De Pensylvanie.
 Faux Plane.
 { — à feuilles découpées, la
 } patte d'oie.
 Le Sycomore.
 — A feuilles panachées.
 Erable rouge de Virginie.
 — Le mâle.
 — La femelle.
 Erable à sucre.
 De Tartarie.
 De Sir Wager.

Les Erables servent à la décoration des jardins, & leur bois est utilement employé à différens usages. Ils s'accoutument assez bien de toute sorte de terrain.

ÆSCULUS.

MARRONIER D'INDE.

ÆSCULUS Hippo Castanum. Le Marronnier d'Inde.
 — Variegatum. — Panaché.
 Pavia. Le Pavia rouge.
 Flava. Le Pavia jaune.

Tout le monde connoît la beauté du Marronnier d'Inde; les Pavia viennent bien dans un terrain même médiocre;

ils réussissent mieux dans des lieux bas , & le long des eaux.

AMORPHA Fruticosa.

Indigo bâtard.

AMYGDALUS.

AMANDIER. PÊCHER.

AMYGDALUS Communis variegatus. Amendier panaché.

— Flore pleno. — A fleurs doubles.

Orientalis. A feuilles satinées du levant.

Perfica flore pleno Pêcher à fleur double.

Ces arbrisseaux, si agréables par la beauté de leurs fleurs, viennent bien par-tout ; ils craignent l'exposition du nord & l'humidité.

ANAGYRIS Foetida.

Bois puant.

Arbrisseau qui craint les fortes gelées ; est naturel en Roussillon.

ANNOA.

ASSIMINIER.

ANNOA Triloba.

Affiminier à trois lobes.

Glabra.

Affiminier glabre.

Les arbres originaires de l'Amérique septentrionale, lorsqu'ils sont plantés un peu forts, veulent une terre substantielle.

ARALIA Spinosa.

Angélique en arbre.

Cet arbrisseau d'un port élégant vient très-bien chez nous dans un terrain chaud & sec, & il y mûrit ses semences.

ARBUTUS.

ARBOUSIER.

ARBUTUS Unedo.

Arbousier commun.

— Flore rubro. — A fleur rouge.

— Flore pleno. — A fleur double.

Andrachne. Du levant.

Uva urfi. La Boufférole.

L'Arbousier est remarquable par son feuillage toujours vert, & par le bel effet de son fruit. Il vient par tout. La Boufférole craint le chaud, & veut une terre de bruyère.

RISTOLOCHIA Frutescens ou sypho. Aristoloche en arbre.

C'est une belle plante grimpante qui s'éleve à trente pieds de haut, qui garnit au mieux les berceaux & les tonnelles. Elle vient de l'Amérique septentrionale, & croît dans toute sorte de terrains, mais elle préfère l'ombre & le frais.

ATRIPLEX Halimus.

Pourprier de mer.

Les feuilles argentées de cet arbrisseau qui *masse bien*, font un bel effet dans les plantations; veut un terrain chaud & sec.

AZALEA Viscosa.

L'azalée.

Nudiflora.

Nudiflore.

Ces arbrustes, recherchés par la beauté & la suavité de leurs fleurs, exigent une culture soignée, du frais & de la terre de bruyere.

BACCHARIS Halimifolia.

⎵ Bacchante de Virginie seneçon
en arbre.

Arbuste qui forme de jolis buissons; vient par-tout, mieux à une exposition chaude: fleurit en automne.

BETULA.

LE BOULEAU.

BETULA Alba.

Bouleau commun.

Alnus.

L'aune.

— Glutinosa.

— Glutineux.

— Incana.

— A feuilles blanches en-dessous

— Laciniata.

— A feuilles découpées.

— Hybrida.

— De Suede.

— Angulata.

— A feuilles anguleuses.

— Florida.

— A fleur.

Palustis.

De marais.

Lenta.

Bouleau mérisier.

Nana.

Bouleau des Alpes.

Nigra.

Bouleau à canot.

Canadensis.

De Canada.

Le Bouleau commun vient dans le sol le plus ingrat; ceux d'Amérique & les autres ne se plaisent que dans les lieux humides & marécageux, ou le long des eaux.

BIGNONIA Catalpa.

Radicans.

— Minor.

Sempervitens.

Le Catalpa.

Jasmin de Virginie.

— Plus petite.

Bignone toujours verte.

Le Catalpa est un très bel arbre, soit par son feuillage, soit par ses fleurs, soit par son port; il vient bien partout: les autres espèces sont grimpantes, ornent singulièrement les berceaux, & s'accoutument de toute terre; l'espèce toujours verte, est sensible aux grands froids.

BUPLEURUM Fruticosum.

L'Oreille de lievre.

Arbrisseau toujours vert; vient bien partout.

BUXUS Balearica.

Buis de Mahon.

Sempervitens.

Buis en arbre.

— Aurea.

— Panaché de jaune.

— Argentea.

— Panaché de blanc.

Suffruticosa.

Buis nain d'Artois.

CALYCANTHUS Floridus.

Pompadoure de Caroline.

Terrain frais & léger.

CARPINUS.*CHARME*.*CARPINUS* Betulus.

Le Charme.

— Quercifolius.

— A feuille de chêne.

Orientalis.

Du levant.

Ostrya.

Charme-houblon.

Virginiana.

De Virginie.

CASSINE Peragua.

L'Apalachine.

Cet arbrisseau vient de la Caroline; il exige une bonne exposition, parce qu'il craint les grands hivers.

CEANOTHUS Americanus.

Thé de New-Jersey.

CELASTRUS Scandens.

Bourreau des arbres.

Bullatus.

Le Bourreau des arbres aime une terre forte & humide; planté parmi les arbres, il s'y accroche, & y fait un bel effet.

C E L T I S . M I C O C O U L I E R .

C E L T I S Australis.	Micocoulier commun.
Orientalis.	Du levant.
Occidentalis.	D'Amérique septentrionale.
Cordata.	A feuilles en cœur.

Les especes américaines aiment un sol humide & fertile ; les autres viennent bien dans un terrain sec ; ce sont de beaux arbres, dont le bois dur & flexible est très-utile pour le charronage.

C E P H E L A N T H U S Occidentalis. Bois-bouton.

Aime l'ombre & la terre légère.

C E R A T O N I A Siliqua. Le Caroubier.

Arbre toujours vert , naturel au Rouffillon ; craint les fortes gelées.

C E R C I S . G A I N I E R . Arbre de Judée.

C E R C I S Siliquastrum.	Arbre de Judée.
— Flore albo.	— A fleur blanche.
Canadensis.	De Canada.

Celui de Canada est beaucoup plus petit que l'autre ; vient par-tout.

C H I O N A N T H U S Virginicus. Arbre de neige. Snow-drap.

Sol humide & ombragé ; terre de bruyere.

C I S T U S . C I S T E .

C I S T U S Populifolius.	Ciste à feuilles de peuplier.
Laurifolius.	A feuilles de laurier.
Ladaniferus.	Ladanifere.
Monspelienfis.	De Montpellier.
Albidus.	A feuilles drapées.
Incanus.	A feuilles blanches.
Crispus.	A feuilles crepues.
Salvifolius.	A feuilles de fange.

Les Cistes étant originaires des pays chauds , doivent être placés à une bonne exposition.

CLEMATIS. CLEMATITE.

<u>CLEMATIS</u> Viticella.	Clematite à fleur bleue.
— Flore pleno.	— A fleur double.
Viorna.	De la Caroline.
Crispa.	Frisée.
Orientalis.	Du levant.
Integrifolia.	De Hongrie.
Balearica.	De Mahon.
Virginiana.	De Virginie.
Vitalba.	Des bois.

Les Clematites sont des plantes farmenteuses qui contribuent à la décoration des berceaux.

<u>CLETHRA</u> Alnifolia.	Clethra à feuilles d'aune.
Sol frais, terre de bruyere.	

<u>CNEORUM</u> Tricocon.	Le Cameline.
Arbuste toujours vert ; s'accommode de toute terre.	

COLUTEA. BAGUENAUDIER.

<u>COLUTEA</u> Arborefcens.	Baguenaudier commun.
Istria.	D'Alep.
Orientalis.	Du levant.
<u>CORIARIA</u> Myrtifolia.	Le Roudou.

Arbrisseau toujours vert. C'est un poison pour les bêtes à laine.

CORNUS. CORNOUILLER.

<u>CORNUS</u> Florida.	Cornouiller de la Floride.
Mascula.	Des bois.
— Fructus rubro.	— A fruit rouge.
— Fructus flavo.	— A fruit jaune.
Sanguinea.	Sanguin.
— Variegata.	— Panaché.
Alternifolia.	A feuilles alternes.
Citrifolia.	A feuilles de citronier.
Novi Belgii.	De la nouvelle Hollande.
Alba.	Blanc.
Canadensis.	De Canada.
Ferruginea.	Ferrugineux.
Virginiana.	De Virginie.

Les Cornouillers font de grands arbuftes indifférens fur la qualité du terrain & fur l'exposition. Celui de la Floride & de l'Amérique feptentrionale veulent un fol frais & une terre légère.

CORONILLA. CORONILLE.

CORONILLA Emerus.	L'Emerus.
Glauca.	Coronille glauque.
Valentina.	D'Espagne.
Coronata.	Couronnée.

Ces arbufteaux qui parent fi bien un jardin par la quantité & la bonne odeur de leurs fleurs, font naturels à nos Provinces méridionales, & veulent une bonne exposition.

CORYLUS. NOISETIER.

CORYLUS Sylveftris.	Le Coudrier.
Sativa.	Le Noisetier.
— Fructu rubro.	— A fruit rouge.
— Avellana.	— A gros fruit.
Columna.	De Conftantinople.
Americana.	D'Amérique.
Cornuta.	A fruit cornu d'Amérique.

Les efpeces américaines fe plaifent dans une terre forte & humide ; mais elles ne laiffent pas, ainfi que celles d'Europe, de s'accommoder de toute forte de terrain.

CRATÆGUS. ALIZIER.

CRATÆGUS Tormalis.	Alizier. Alouchier.
Dentata.	De Fontainebleau.
Aria.	De Montagne.
— Foliis rotundis.	— A feuilles rondes.

Ces arbres font remarquables par l'élégance de leur port, la beauté de leurs fleurs & la bonté de leur bois, qui eft fur-tout très-recherché des Tourneurs ; tout terrain leur convient.

CUPRESSUS.CYPRÈS.

CUPRESSUS Sempervirens.

Cyprés toujours vert.

— Fastigiata.

— Femelle.

— Expanfa.

— Mâle.

Dyfticha.

Cyprés chative à feuille d'Acacia.

Thuyodes.

Cedre blanc du Maryland.

Lufitanica.

Cedre de Goa.

Les arbres de ce genre font toujours verts & remarquables par leur port, & l'excellente qualité de leur bois. Le Cyprés à feuilles d'Acacia a cela de particulier qu'il vient très-bien dans l'eau ; le Cedre blanc ne réuffit que dans un fol léger & humide. Celui de Goa craint le froid.

CYDONIA.COIGNASSIER.

CYDONIA Vulgaris.

Le Coignassier.

Lufitanica.

De Portugal.

CYTISUS.CYTISE.

CYTISUS Laburnum.

Cytife des Alpes, faux Ebenier.

— Latifolium.

{ — A larges feuilles, fleurs
odorantes.

— Serotinum.

— Tardif.

Hirsutus.

Velu.

Sessilibolus.

Trifolium des Jardiniers.

DAPHNE.THYMÉLÉE.

DAPHNE Mezereum.

Bois gentil.

— Flore albo.

— A fleur blanche.

Laureola.

Lauréole.

Cneorum.

Thymélée des Alpes.

Gnidium.

Garou.

Thymelœa.

Thymélée

Calycina.

A calice.

Angustifolia.

A petites feuilles.

Ces arbuttes font presque tous agréables. La plupart ne quittent point leurs feuilles. Le Thymélée des Alpes a de jolies fleurs purpurines qui répandent une odeur agréable. Ils veulent presque tous une exposition fraîche & la terre de bruyere.

DIOSPYROS. PLAQUEMINIER.

DIOSPYROS Lotus.	D'Italie.
Virginiana.	De Virginie.
Sinenfis.	Kaki, figue caqué.

Les Plaqueminiers sont des arbres recommandables par leur port, & leur bois dur & compacte ; il paroît qu'on peut utiliser leurs fruits ; ils croissent dans des terrains forts & humides.

DIRCA Palustris.	Bois de cuir.
------------------	---------------

Arbrisseau de Virginie, dont l'écorce sert à faire des cordes de puits ; il lui faut des lieux ombragés & humides.

ELEAGNUS Angustifolius.	Olivier de Bohême.
-------------------------	--------------------

Arbre à feuilles argentées dont les fleurs répandent au loin une odeur très-forte.

EPHEDRA Distachya.	Raisins de mer.
Monostachya.	

EUONYMUS.	FUSAIN. Bonnet de Prêtre.
-----------	---------------------------

EUONYMUS Europæus.	Fusain commun.
— Fructu albo.	— A fruit blanc.
— Variiegatus.	— Panaché.
Atropurpureus.	A fleurs noires de la Caroline.
Latifolius.	A larges feuilles.
Verucosus.	Galeux.
Americanus.	Toujours vert d'Amérique.

Arbrisseaux agréables, aiment l'ombre & l'humidité.

FAGUS.	HÊTRE. Châtaignier.
--------	---------------------

FAGUS Castanea.	Châtaignier.
— Fructus majori.	— Le Marronnier.
Dentata.	Châtaignier d'Amérique.
Pumila.	{ Châtaignier nain ou Chinqua-
Sylvatica.	pin d'Amérique.
Purpurea.	Le Hêtre.
	A feuilles pourpres d'Amérique.

Les terrains sablonneux & profonds conviennent en

général aux Châtaigniers ; le Chinquapin vient dans les marécages. Le Hêtre est naturel aux montagnes.

FOTHERGILLA Gardeni. Fothergille de la Caroline.

Joli petit arbrisseau ; humidité & terre de bruyere.

FRANKLINIA Alatomaha. Le Franklin.

Grand arbrisseau à belles fleurs odorantes , très-rare encore ; croît au bord des rivieres , à l'ombre & dans un sol léger.

FRAXINUS. FRÊNE.

FRAXINUS Americana.	D'Amérique.
Calabrienfis.	De Calabre.
Caroliniana.	De la Caroline.
Excelsior.	Frêne commun.
— Jaspidea.	— A bois panaché.
— Argentea.	— A feuilles panachées.
— Verucosa.	— A écorce caleuse.
— Horizontalis.	— A branches étalées.
— Monophylla.	— A une feuille.
Juglandifolia.	A feuille de Noyer.
Florifera.	A fleur d'Amérique.
Novæ Angliæ.	De la nouvelle Angleterre.
Alba.	Blanc d'Amérique.
Nigra.	Noir d'Amérique.
Pensylvanica.	De Pensylvanie.
Ornus.	A la manne d'Italie.
Sambucifolia.	A feuilles de Sureau.
Tamariscifolia.	A feuilles de Tamarix.

L'utilité des Frênes est généralement connue ; ils croissent même dans les endroits élevés , mais ils préfèrent un sol humide & les terrains aquatiques.

GENISTA. GENÊT.

GENISTA Candicans.	Cytise de Montpellier.
Tinctoria.	Des Teinturiers.
Sibirica.	De Sibérie.
Hispanica.	D'Espagne.
Pilosa.	Velue.

GENISTA Scoparia.	A balai.
Juncea.	Junciforme d'Espagne.
— Flore pleno.	— A fleur double.
Lusitanica.	A fleur blanche.
Spinosa.	A longs dards.
Halleri.	D'Haller.

GINGHO Biloba. Gingho de la Chine.

Arbre singulier par la forme de ses feuilles : nous ne connoissons pas encore ses fleurs ; il réussit ici dans les terres compactes argilleuses.

GLEDITSCHIA. FÉVIER.

GLEDITSCHIA Triacanthos.	A trois pointes.
Monosperma.	A une seule semence.
Inermis.	Sans épines.
Sinensis.	De la Chine.

Les Féviers se plaisent dans un terrain léger & profond ; leurs branches souples & leurs épines terribles font désirer qu'on en puisse faire des haies.

GUILANDINA Dioïca.	Chicot. Bonduc.
— Masc.	— Le mâle.
— Fœmina.	— La femelle.

Cet arbre n'est pas difficile sur la qualité des terrains.

HALESIA Tetraptera.	Halésie à quatre ailes.
Diptera.	A deux ailes.

Ces arbres demandent de l'ombre , du frais & une terre légère.

HAMAMELIS Virginiana.	Hamamelis de Virginie.
-----------------------	------------------------

Arbrisseau qui fleurit très-tard ; terre légère.

HIBISCUS Syriacus.	Althéa.
— Flore purpureo.	— A fleur violette.
— Flore albo.	— A fleur blanche.
— Flore pleno.	— A fleur double.
— Variegatus.	— A feuilles panachées.

HIPPOPHAE Rhamnoides.	L'Argouffe.
— Masc.	— Le mâle.
— Fœmina.	— La femelle.
Canadensis.	De Canada.

L'Argouffe croît dans nos montagnes le long des torrens & des rivières.

HOPPEA Tinctoria.

Hoppéa des Tinturiers.

Bel arbre de la Caroline ; il vient dans des marais ; il est rare.

HYDRANGEA Arborefcens.

Hydrangéa de Virginie.

Glauc.

Glaucue.

Arbriffeau dont les tiges périciffent quelquefois par les fortes gelées , mais il en repouffe de nouvelles au printemps ; terre forte & humide.

I L E X.

H O U X.

I L E X Aquifolium.

Houx commun.

— Inerme.

— Sans épines.

— Aureum.

— Doré.

— Argenteum.

— Argenté.

— Maculatum au-
teum.

} — Panaché de jaune.

— Maculatum ar-
genteum.

} — Panaché de blanc.

— Echinatum.

— Hériffonné.

Americanum.

— D'Amérique.

Canadense.

De Canada.

Balearicum.

De Mahon.

Caffine.

De Mylord d'Ahon.

Tous les Houx aiment l'ombre & le terrain fubftantiel & frais ; la dernière efpèce exige de plus un abri contre les froids exceffifs.

I T E A Virginica.

Itéa de Virginie.

Cet arbriffeau , agréable par fes fleurs , ne réuffit que dans les lieux humides.

J U G L A N S.

N O Y E R.

J U G L A N S Nigra.

A fruit noir d'Amérique

— Oblonga.

— Oblong.

Cinerea.

Blanc à fruit oblong d'Amérique.

Alba.

Blanc.

— Acuminata.

— A fruit aigu.

— Odorata.	— A fruit odorant.
— Ovata.	— A fruit ovale.
— Minima.	— A fruit très-petit.
Compressâ.	Noyer Ickeri.
Olivæ formis.	Pacancier de la Louisiane.
Fraxinifolia.	A feuille de frêne, d'Amérique.
Regia.	Noyer commun.
— Racemosa.	— A bouquets.
— Tenera.	— A coque tendre.
— Serotina.	— Tardif.

Les Noyers d'Amérique ne nous sont pas encore bien connus. Le bois de toutes les especes de ce genre mérite d'être recherché. Les fruits de plusieurs sont d'une grande utilité ; ils se plaisent dans un sol profond & léger.

JUNIPERUS

GENEVRIER.

JUNIPERUS Communis.	Le Genevrier des bois.
Oxycedrus.	Oxycedre.
Lycia.	Genevrier-Cedre.
Phænicea.	Grand Genevrier.
Virginiana.	Cedre rouge de Virginie.
Suecica.	De Suede.
Bermudiana.	Cedre des Bermudes.
Thurifera.	Arbré à Pencens.
Sabina.	La Sabine.
— Fol. variegatis.	— Panachée.

Le plus intéressant de tous les Genevriers, est le Cedre rouge qui s'est parfaitement acclimaté en France, & dont le bois incorruptible sert à une infinité d'usages ; il s'accommode de toute espèce de terrain. Le Cedre des Bermudes craint, dit-on, la gelée. Nous en avons un dans nos environs, à Bruguierès, chez M. Cucfac. Il y a dix-huit ans qu'il est planté dans une terre compacte ; il végete au mieux, & n'a reçu aucune atteinte de la rigueur des hivers : il a aujourd'hui vingt-un pieds de hauteur & seize pouces de tour.

KALMIA Latifolia.	Kalmia à larges feuilles.
Angustifolia.	A feuilles étroites.
Glauc.	À feuilles glauques.

Les Kalmia veulent de l'ombre, & un terrain léger & humide ; peu d'arbrisseaux peuvent leur être comparés pour la beauté de leurs fleurs.

LARIX Europæa.	Le Meleze.
Canadensis.	De Canada.
— Nigra.	— Noir.
— Rubra.	— Rouge.
Sibirica.	De Sibérie.

L A U R U S .**L A U R I E R .**

L A U R U S Nobilis.	Laurier franc.
— Latifolia.	— A larges feuilles.
— Undata.	— A feuilles ondulées.
— Variegata.	— Panaché.
Benzoin.	Benjoin.
Æstivalis.	Laurier d'été.
Sassafras.	Le Sassafras.
Borbonia.	Laurier rouge de Bourbon.

Les Lauriers n'exigent pas tous le même sol ni la même culture ; le Laurier commun vient par-tout ; mais il périt dans les hivers rudes. Le Benjoin ne craint point le froid ; le Laurier de Bourbon veut un abri pendant l'hiver, & une terre humide & substantielle ; celui d'été perd ses feuilles en hiver, & vient le long des eaux. Enfin le Sassafras ne craint point nos hivers, mais il s'accommode mal de notre sol. Elevé dans la terre de bruyere, il périt au bout de quelques années ; une terre seche, légère & stérile lui conviendrait peut-être mieux.

LEDUM Palustre.	Thé de Labrador.
Latifolium.	A larges feuilles.

Jolis arbrisseaux ; veulent l'ombre & une terre légère & humide.

LIGUSTRUM Vulgare.	Le Troëne.
— Variegatum.	— A feuilles panachés.

On fait de jolies palissades avec cet arbrisseau.

LIQUIDAMBAR Styracifluum.	Liquidambar à feuilles d'Erable.
Asplenifolium.	A feuilles de Ceterach.
Orientele.	Du levant.

Ces arbres réussissent bien dans la terre noire & humide ; leur bois est très-estimé.

LIRIODENDRON Tulipifera.	Le Tulipier.
--------------------------	--------------

C'est un des plus beaux arbres que l'Amérique nous ait donné. Il s'est très-bien naturalisé chez nous ; il faut le planter dans une terre substantielle & fraîche.

LONICERA. CHEVREFEUILLE.

LONICERA Caprifolium.	Chevrefeuille commun.
— Italica.	— D'Italie.
Virginiana.	Rouge de Virginie.
Sempervirens.	Toujours vert.
Peryclimenum.	Des bois.
— Germanicum.	— D'Allemagne.
— Quercifolium.	— A feuilles de Chêne.
Canadensis.	De Canada.
Nigra.	Noir.
Tartarica.	De Tartarie.
Xylosteum.	Des Haies.
Alpigena.	Des Alpes.
Pyrenaica.	Des Pyrénées.
Cærulea.	A fruit bleu.
Symphoricarpos.	Symphoricarpos.
Glauca.	A feuilles glauques.

Les Chevrefeuilles entre les mains d'un Jardinier intelligent, rehaussent la parure des berceaux, des tonnelles & des plantations, d'autant qu'ils ne sont pas difficiles sur la qualité du sol.

LYCIUM. JASMINOÏDE.

LYCIUM Europæum.	D'Europe.
Barbarum.	De Barbarie.
Sinense.	De la Chine.
Peruvianum.	Du Perou, odorant.

Ce dernier craint les fortes gelées ; on les emploie en palissade, pour garnir les berceaux.

MAGNOLIA. LAURIER-TULIPIER.

MAGNOLIA Grandiflora.	Grand Magnolia.
Glauc.	Bleu.
Acuminata.	Rustique.
Tripetala.	Ombrelle.

Le grand Magnolia est un des plus beaux arbres qui soit sorti des mains de la nature ; mais il s'en faut bien qu'il atteigne chez nous ce degré de beauté qu'il a communément dans les forêts de la Caroline. Plus on apportera de soins & d'intelligence à sa culture , mieux il réussira.

MEDICAGO Arborea.	Luzerne en arbre.
-------------------	-------------------

Joli arbrisseau qui ne craint que les hivers extraordinaires.

MELIA Azedarach.	Grand Azedarach.
MENISPERMUM Canadense.	Menisperme de Canada.
Carolinianum.	De la Caroline.
Virginicum.	De Virginie.

Plantes ligneuses & grimpantes qui s'entrelacent autour des arbres voisins ; tous les terrains leur conviennent.

MESPILUS. ÉPINE.

MESPILUS Aronia.	Grand Azerolier d'Italie.
Azarolus.	Azerolier.
Carolina.	De la Caroline , à bouquets.
Coccinea.	Azerolier de Canada.
Crus galli.	A feuilles luisantes d'Amérique.
Germanica.	Le Neflier.
— Latifolia.	— A larges feuilles.
— Abortiva.	— Sans pepin.
Maxima.	Épine en arbre.
Marrocana.	De Maroc.
Oxyacantha.	Aubepine.
— Flore pleno.	— A fleur double.
— Rosea.	— A fleur rouge de Mahon.
— Aurca.	— A fruits jaune d'Amérique.

— Variegata.	— A feuilles panachées.
— Biflora.	— De deux fois l'an.
Latifolia.	A larges feuilles.
Prunifolia.	A feuilles de Prunier, d'Amérique.
Pyrifolia.	Grand Azerolier d'Amérique.
Salicifolia.	A feuilles de Saule.
Arbutifolia.	A feuilles d'Arbousier.
Tanacetifolia.	A feuilles de Tanaisie.
Apiifolia.	A feuilles de Persil.
Tomentosa.	Epine Pinchaw.
Glanftomburiensis.	De Glanftombury.
Aculeata.	A longs dards.
Chamæ Mespilus.	Neflier des Alpes.
Amelanchier.	Amelanchier.
— Canadensis.	— De Canada.
Cotoneaster.	Cotoneastre.
Pyracantha.	Buiffon ardent.

Toutes les Epines font l'ornement des jardins par l'abondance de leurs fleurs, l'agrément de leurs fruits & la diversité de leurs feuilles. On doit distinguer l'Epine à fleur double & à fleur rouge. Peu d'arbres sont aussi beaux que ces deux, & font un aussi bel effet.

MIMOSA Lilibrinzim. Bois de soie de Constantinople.

C'est un arbre charmant qui vient bien par-tout, mais mieux à une bonne exposition.

M O R U S.

M U R I E R.

M O R U S Alba.	Mûrier blanc.
Constantinopolitana.	De Constantinople.
Italica.	Rose d'Italie.
Nigra.	Noir.
— Laciniata.	— A feuilles découpées.
Papyrifera.	A papier de la Chine.
— Masc.	— Le mâle.
— Fœmina.	— La femelle.
Rubra.	Rouge de Canada.
— Masc.	— Le mâle.
— Fœmina.	— La femelle.

Tout le monde connoît l'usage & l'utilité des Mûriers ; celui de Canada mérite une place dans les jardins à cause de la bonté de son bois & de la beauté de son feuillage.

MYRICA.

CIRIER.

MYRICA Gale.

Piment royal.

Cevifera.

Arbre de cire, d'Amérique.

Caroliniana.

De la Caroline.

Ces arbres aiment l'ombre & les terres marécageuses.

NERIUM Oleander.

Laurier-rose.

— Flore albo.

— A fleur blanche.

Arbrisseau charmant qui ne craint que les hivers excessifs lorsqu'il n'est pas abrité.

NYSSA.

TUPELO.

NYSSA Aquatica.

Aquatique.

Sylvatica.

De montagne.

Ogeche.

Ogeche.

Le bois de ces arbres est très-dur ; les deux premiers demandent un sol aquatique ; un terrain frais, léger & profond convient au troisième.

OLEA.

OLIVIER.

OLEA Europæa.

D'Europe franc.

Americana.

D'Amérique.

PASSISSORA Cerulea.

Grenadille, fleur de la Passion.

Il faut la placer à une bonne exposition au pied d'un mur, ou sur un berceau.

PERIPLOCA Græca.

PHILADELPHUS.

SYRINGA.

PHILADELPHUS Coronarius.

Syringa commun.

Nanus.

Nain.

Inodorus.

Sans odeur, de la Caroline.

PHYLLYREA.

FILARIA.

PHYLLYREA Media.

— Aurea.

— Argentea.

Latifolia.

Angustifolia.

Arbustes toujours verts ; craignent le soleil.

P I N U S.

P I N U S Cedrus.

Laritzio.

Strobus.

Rubra.

Picea.

Taxifolia.

Maritima.

Virginiana.

Sylvestris.

— Genevensis.

— Rubra.

Mugho.

Halepensis.

Echinata.

Abies Americana.

Quadrifolia.

Pinea.

Abies balsamea.

Abies Canadensis.

— Nigricans.

— Rubescens.

Tæda.

Palustris.

Cembra.

Filaria commun.

— Panaché de jaune.

— Panaché de blanc.

Dentelé.

▲ feuilles étroites.

P I N.

Cedre du Liban.

Pin de Corse.

Pin du Lord Weitmouth.

Pin d'Ecosse , des Pyrénées.

Epicea , sapin du nord.

{ Sapin des Pyrénées , à feuilles
argentées.

Pin de Bordeaux.

Pin de Jersey.

Pin de Syvestre.

— De Geneve.

— Rouge.

Torchepin.

Pin d'Alep , de Jérusalem.

▲ fruit épineux d'Amérique.

{ Sapinette à feuilles d'If d'Amé-
rique.

Pin à 4 feuilles d'Amérique.

Pin-Pignon.

Beaumier de Giléad.

Epinette blanche

Epinette noire

Epinette rouge

Pin à l'encens d'Amérique.

Pin de marais d'Amérique.

Alvies.

Les Pins , si recommandables par l'excellente qualité de leur bois , & le grand usage qu'on en fait dans les Arts , ne le sont pas moins par la beauté de leur port ,

& la verdure éternelle de leur feuillage ; une exposition froide leur est nécessaire , ainsi qu'une terre meuble & légère. Nous les avons rangés ici par ordre de grandeur , pour faciliter aux personnes qui voudroient faire des plantations d'arbres verts , la disposition & le choix des especes ; pour assurer leur reprise , nous les élevons en vase , & nous les envoyons en motte. Des Cedres du Liban plantés en 1773 chez M. Cucfac , dans une terre argilleuse , ont aujourd'hui trente pieds de hauteur & huit pouces de diametre.

P I S T A C I A .

P I S T A C H I E R .

P I S T A C I A Trifolia.

A trois feuilles.

— Masc.

— Le mâle.

— Fœmina.

— La femelle.

Minor.

Petit Pistachier.

Narbonensis.

De Narbonne.

Lentiscus.

Le Lentisque.

Terebinthus.

Le Terebinthe.

Vera.

Vrai Pistachier.

Les Pistachiers , originaires des climats chauds , exigent presque tous une bonne exposition.

P L A T A N U S .

P , A T A N E .

P L A T A N U S Orientalis.

De Judée , à grande feuille.

Occidentalis.

D'Amérique.

Acerifolius.

A feuille d'Erable.

Le Platane d'Amérique demande un terrain frais , tandis que celui de Judée prospere dans un sol sec & chaud.

P O P U L U S .

P E U P L I E R .

P O P U L U S Alba major.

Ypréau , franc Picard , blanc
d'Hollande.

Alba minor.

Blanc à petites feuilles.

— Variegata.

— Panaché.

Tremula.

Le Tremble.

— Latifolia.

— A grandes feuilles.

Atheniensis.

D'Athènes.

POPULUS Cordifolia.

Nigra.

Italica.

Vinealis.

— Variegata.

Canadensis.

Caroliniana.

Virginiana.

Balsamifera.

Viminea.

— Variegata.

Longifolia.

Argentea.

Heterophylla.

Argenté.

Du pays.

D'Italie.

Ozier blanc.

— Panaché très-rare.

{ De Canada, Peuplier Suisse
des Marchands.

De la Caroline.

De Virginie.

Tacamahaca d'Amérique.

Peuplier-liard.

— Panaché.

A longues feuilles, d'Amérique.

A feuilles argentées.

A rameaux quadrangulaires.

Tous les Peupliers aiment un terrain frais ; le seul peuplier d'Italie végète assez bien dans un sol sec. Leur multiplication par bouture, en perpétuant les individus du même sexe, nous prive de la comparaison des mâles avec les femelles, qui nous seroit nécessaire pour bien connoître les espèces.

PRINOS Glaber.

Verticillatus.

Apalanche.

Apalanche verticillée.

Ces arbrisseaux utiles en Médecine, veulent une terre légère, du frais & de l'ombre.

POTENTILLA Fruticosa.

{ Quinte - feuille en arbre ;
d'Amérique.

P R U N U S,

PRUNIER. Cerisier, Merisier.

P R U N U S Virginiana.

Canadensis.

Lusitanica.

Lauro-Cerasus.

— Variegatus.

Mahaleb.

Cerasus.

— Flore pleno.

Marasquino.

Mérisier à grappes de Virginie.

Ragouminier.

Azarero, Laurier de Portugal.

Laurier-Cerise.

— Panaché.

Bois de Sainte-Lucie.

Le Cerisier.

— A fleur double.

Cerise marasquine.

PRUNUS Padus.	Cerisier à grappes.
— Fructu rubro.	— A fruit rouge.
— Fructu nigro.	— A fruit noir.
Sylvestris.	Le Merisier.
— Fructu nigro.	— A fruit noir.
— flore pleno.	— A fleur double.
Perficifolia.	A feuille de Pêcher.
Institia.	Prunier sauvage.
— Multiplex.	— A fleur double.
Avium.	Le Prunelier.
Cerasiformis.	A fruit de Cerise.

Outre l'agrément que procurent plusieurs especes de Cerisiers , soit par leurs fleurs , soit par leurs fruits , on ne sauroit trop multiplier des arbres dont le bois est si utile , & dont le feuillage sert avantageusement à la nourriture des troupeaux.

PTELEA Trifoliata.	Orme à trois feuilles , Américain.
PUNICA Granatum.	Le Grenadier.
— Flore pleno.	— A fleur double.

PYRUS.

POIRIER. Pommier.

PYRUS Coronaria.	Pommier odorant , Américain.
Sempervirens.	D'Astracan toujours vert.
Hybrida.	Odorant de Sibérie.
Sylvestris.	Pommier sauvage.
Pyrafter.	Poirier sauvage.
— Multiplex.	— A fleur double.

QUERCUS.

CHÊNE.

QUERCUS Alba.	Blanc.
Cerris.	Cerrus.
Haliphaeos.	De Bourgogne.
Gramuntia.	
Ilex dentata.	Chêne vert.
— Integrifolia.	— A feuilles entieres.
Virens.	Chêne de vie ; Caroline.
Prinos.	{ A feuilles de Châtaignier
	{ Américain.
Phellos latifolia.	Chêne-Saule d'Amérique.

— Longifolia.	— A longues feuilles.
— Dentata.	— A feuilles finneuses.
Robur.	Roure, Chêne commun.
— Pedunculata.	A longs peduncules.
— Racemosa.	— A grappes
Fastigiata.	Pyramidal, Chêne-Cyprès.
Reptans.	Traçant, des Pyrénées.
Rubra.	Rouge de Canada.
— Latifolia.	— A larges feuilles.
Suber.	Liege.
— Latifolia.	— A larges feuilles.
Capfularis.	Du levant, à capsules.
Coccifera.	Chêne-Kermés.
Æsculus.	A glands doux.
Ægilops.	

Nous ne connoissons pas encore assez bien toutes les especes de *Chêne* dont les catalogues font mention, pour en parler ici. On ne sauroit trop cultiver un arbre aussi utile que le *Chêne*, mais sur-tout le *Chêne* rampant des Pyrénées, qui a la précieuse faculté de se multiplier prodigieusement par les racines qui tracent. Un de nos Observateurs qui connoît le mieux les Pyrénées, a vu une forêt de *Hêtres*, ruinée par le service d'une fonderie, repeulée, sans travail, en moins de dix ans, par les *Chênes* qui étoient plantés sur une lisiere.

RHAMNUS.

NERPRUM.

RHAMNUS Catharticus.	Nerprum.
Alpinus.	Des Alpes.
Frangula.	La Bourgene.
— Sempervirens.	— Toujours verte.
Saxatilis.	De Montagne.
Paliurus.	Porte-chapeau.
Zyzyphus.	Jujubier.
Alaternus.	Alaterne d'Espagne.
Montpeliacus.	De Montpellier.
— Fol. aureis.	— Panaché de jaune.
— Fol. argenteis.	— Panaché de blanc.
Lineatus.	Rayé.
Alnifolius.	A feuilles d'Aune.

RHODODENDRON.

RHODODENDRON Ferruginum.	Laurier-rose des Alpes.
Maximum.	D'Amérique.
Ponticum.	D'Asie.

Arbrisseaux remarquables par l'élégance de leurs fleurs ; ils sont toujours verts , & ne se plaisent que dans les terrains légers & humides.

RHUS.

SUMAC.

RHUS Typhinum.	Amaranthe de Virginie.
Glabrum.	A bois liège d'Amérique.
Vernix.	Arbre au vernis d'Amérique.
Copallinum.	Copalme d'Amérique.
Radicans.	§ Arbre à la puce , grim pant , Σ Américain.
Toxicodendron.	Arbre à la puce d'Amérique.
Cotinus.	Le Fustet.
Sinense.	De la Chine.
Coriaria.	Rouvre des Corroyeurs.
Succedaneum.	Vernis du Japon.
Viridiflorum.	A fleurs vertes.
Canadense.	De Canada.

Les Sumacs ne sont point délicats ; ils s'accoutument de tout terrain & de toute exposition : ils se multiplient d'ailleurs avec tant de facilité par leurs racines, qu'on ne doit pas beaucoup s'occuper de leur culture.

RIBES.

GROSEILLER.

RIBES Rubrum.	Groseiller à grappes.
Alpinum.	Des Alpes.
Nigrum.	Groseiller noir , cassis.
Uva Crispa.	Groseiller épineux.
Grossularia.	Groseiller commun.
— Fructu albo.	— A fruit perlé.
Oxyacanthoides.	A feuille d'Aubepine.
Cynosbati.	A fruit hérissé.

ROBINIA. FAUX ACACIA.

ROBINIA Pseudo Acacia.

— Inermis.

Caragana.

Frutescens.

Rosea.

Ferox.

Halodendrum.

Mongolica.

Chanlagu.

Faux Acacia.

— Sans épines.

A fleur rose.

Très-épineux.

L'Acacia à fleur rose est un des plus charmans arbrisseaux dont on puisse décorer un jardin. L'Acacia commun est trop négligé, eu égard à l'utilité qu'on pourroit en retirer.

ROSA.

ROSIER.

ROSA Alpina.

— Multiplex.

Pyrenaica.

Pimpinellifolia.

Eglantheria.

Cinnamonea.

Carolinensis.

Villosa.

Centifolia.

— Minor.

Gallica.

— Multiplex.

— Multiflora.

— Versicolor.

Sempervirens.

Moschata.

— Multiplex.

Canina.

Francofurtensis.

Alba.

Des Alpes, sans épines.

— A fleurs doubles.

Des Pyrénées.

{ Eglantier à feuilles de Pim-
 { prenelle.

L'Eglantier odorant.

Rosier-Cannelle.

De la Caroline.

Velue.

A cent feuilles.

— De Bordeaux.

De Provins.

— Grosse Rose.

— Petite double.

— A fleur panachée.

Toujours vert.

Muscat d'Alexandrie.

— Double.

A gros cul.

Blanc.

- Multiplex. — A fleur double.
- Spinosissima. Très-épineux, de Provence.
- Muscosa. Mouffeux.
- Burgundiaca. De Bourgogne.
- Bicolor. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Bicolore, jaune en-dedans,} \\ \text{ponceau en-dehors.} \end{array} \right.$
- Austriaca. D'Autriche.
- Lutea. Jaune.
- Multiplex. — A fleur double.
- Semperflorens. Des quatre saisons. $\left\{ \right.$
- Flore albo. — A fleur blanche.
- Pensylvanica. De Pensylvanie.
- Flore pleno. — A fleurs doubles.

ROSMARINUS *Officinalis.*

Romarin.

- *Foliis variegatis.*

— Panaché.

RUBUS.

RONCE.

RUBUS *Idæus.*

Framboisier.

- *Fructu albo.*

— A fruit blanc.

Hispidus.

Ronce velue. Canada.

Fruticosus.

Ronce commune.

- *Flore pleno.*

— A fleurs doubles.

Inermis.

A fleur double de Saint-François.

Canadensis.

Ronce de Canada.

Odoratus.

Framboisier odorant. Canada.

RUSCUS *Acculeatus.*

Houx frelon.

Racemosus.

Laurier Alexandrin.

Arbrisseaux toujours verts.

SALIX.

SAULE.

SALIX *Hermaphroditica.*

Odorant, à feuilles de Laurier.

Pentandra.

Triandra.

Vitellina.

Osier jaune.

Amygdalina.

A feuille d'Amandier.

Fragilis.

Saule rouge.

Purpurea.

Pourpre.

Rubens.

Osier rouge.

SALIX Arenaria.	De Saint-Léger.
Rosmarinifolia.	A feuilles de Romarin.
Lavandulæfolia.	Σ A feuilles de Lavande, des Pyrénées.
Capræa.	Marceau.
— Angustifolia.	— A feuilles étroites.
— Variegata.	— Panaché.
Babylonica.	Pleureur, du Grand-Seigneur.
Viminalis.	Osier commun.
Alba.	Saule commun.
Fusca.	
Helix.	Osier blanc.
Glauca.	Osier bleu.
Lanata.	A feuilles drapées.
Myrfinites.	A feuilles de Myrthe.
Hastata.	A grandes feuilles.

La nature a destiné les Saules à orner le bord des eaux & les terrains humides ; ils sont si diversifiés par leur taille, leur port & leur feuillage, qu'on peut en tirer bon parti dans les grands jardins.

SAMBUCUS.**SUREAU.**

SAMBUCUS Nigra.	Sureau commun.
— Aurea.	— Panaché de jaune.
— Argentea.	— Panaché de blanc.
— Laciniata.	— A feuilles de Perfil.
Racemosa.	A grappes.
Canadensis.	De Canada.

SOPHORA Japonica.**SORBUS.****SORBIER.**

SORBUS Domestica.	Le Cormier.
Aucuparia.	Cochène, Sorbier des oiseaux.
Hybrida.	De Laponie.
Americana.	D'Amérique.

Les deux dernières espèces sont très-agréables par leurs fleurs, leurs fruits & leur feuillage.

S P I R Æ A.

SPIRÆA Salicifolia.	A feuilles de Saule.
— Flore rubro.	— A fleur rouge.
Tomentosa.	Cotoneux, d'Amérique.
Crenata.	Crenelé.
Opulifolia.	A feuille d'Obier, d'Amérique.
Sibirica.	De Sibérie.
Lævigata.	A feuilles lisses.

Arbustes agréables par l'éclat de leurs fleurs; aiment l'humidité.

STAPHILEA Pinnata.	} Nez coupé, faux Pistachier-Patenôtrier.
Trifoliata.	

Jolis arbrisseaux; celui à trois feuilles est plus agréable si on le laisse venir en buisson.

STERCULIA Platanifolia.

STEWARTIA Malacodendron. De Virginie.

Cet arbrisseau très-difficile à élever, & très-rare, se plaît dans un terrain humide & ombragé.

STYRAX Officinale.	L'Alibouzier.
Americana.	D'Amérique.

S Y R I N G A.

L I L A S.

SYRINGA Vulgaris.	Lilas.
— Alba.	— A fleur blanche.
— Variegata.	— A feuilles panachées.
Violacea.	Lilas de Marly.
Perfica.	Lilas de Perse.
— Laciniata.	— A feuilles découpées.

TAMARIX Gallica.	Tamarisc de Narbonne.
Germanica.	D'Allemagne.

Arbres qui parent par leur feuillage toujours verts, le bord des eaux & les terrains humides.

TAXUS Baccata.	L'If.
----------------	-------

THUJA Orientalis.	Arbre de vie de la Chine.
Occidentalis.	De Canada.
— Odorata.	— Odorant.
— Variegata.	— Panaché.

Arbres toujours verts qu'on peut associer aux plantations de Pins, & qui ne sont pas délicats.

TILIA.

TILLEUL.

TILIA Europæa.	Tilleul des bois.
— Hortensis.	— D'Hollande.
Americana.	D'Amérique.
Caroliniana.	De la Caroline.
Argentea.	A feuilles blanches en-dessous.
Multiflora.	

Les Tilleuls ont un port & un feuillage qui leur a mérité, ainsi que le liant de leur bois, une place dans les grandes plantations; il faut leur donner un sol profond & frais, & de l'ombrage dans nos Provinces méridionales.

ULMUS.

ORME.

ULMUS Campestris.	Orme à petite feuille.
— Maxima.	— A très-grande feuille.
— Latifolia.	— A large feuille.
— Variegata.	— Panaché.
— Nodosa.	— Orme tortillard.
Americana.	D'Amérique.
Polygama.	Crenelé, de Sibérie.

L'Orme a depuis long-temps obtenu la préférence pour les promenades publiques & les grands alignemens. Dans les pays chauds, lorsqu'il survient plusieurs années consécutives de sécheresse, cet arbre est sujet à une maladie occasionnée par un petit insecte, appelé *Galeruque*, naturel à l'Orme. M. Picot-Lapeyrouse qui a suivi & étudié tous les progrès de cette maladie, a donné la manière de la prévenir & de la guérir. C'est en suivant sa méthode, que j'ai réussi à conserver les superbes plantations d'Orme de Toulouse qui m'avoient été con-

fiées, & que j'ai été assez heureux pour rétablir, quoiqu'elles fussent dans un état presque désespéré; une partie avoit déjà péri.

VACCINIUM.AIRELLE.

VACCINIUM Arboreum.	Airelle en arbre.
Corymbosum.	A fleurs en corymbe.
Myrtillus.	L'Airelle.
Oxycoccus.	La Caneberge.

Ces arbrisseaux ont besoin d'une culture soignée, d'une terre légère & d'une exposition fraîche & ombragée.

VIBURNUM.VIORNE.

VIBURNUM Tinus.	Laurier-Tin.
— Fol. variegatis.	— Panaché.
Nudum.	Nudiflore.
Prunifolium.	A feuilles de Prunier.
Dentatum.	A feuilles dentelées.
Lantana.	Viorne commun.
— Variegatum.	— Panaché.
Acerifolium.	A feuilles d'Erable.
Opulus.	Obier des bois.
— Sterilis.	§ — Boule de neige, rose de § Gueldres.
Canadense.	Pihymina.
Lentago.	A manchettes.
Cassinoides.	A feuille de Cassine.
Pyrifolium.	A feuille de Poirier.

Presque tous les Viornes viennent de l'Amérique septentrionale; ils font très-bien dans les massifs & sur le devant des plantations; ils se plaisent dans un terrain frais & léger.

VITE x Agnus-Castus.	Agnus-Castus.
— Latifolius.	— A larges feuilles.
Negundo.	De la Chine.

Ces arbrisseaux sont plus difficiles sur l'exposition que sur la qualité de terrain.

VITIS.

VIGNE.

VITIS Vinifera.

Vigne commune.

Labrusca.

Sauvage.

Vulpina.

De renard , d'Amérique.

Laciniosa.

A feuilles laciniées.

Arborea.

En arbre , d'Amérique.

Acerifolia.

A feuilles d'Érable , d'Amérique.

ULEX Europæus.

Ajonc , Genêt épineux.

ZANTOXYLUM Clava-Herculis.

Fagara , Frêne épineux.

Arbrisseau peu délicat ; on lui donne dans le Maryland
le nom d'*arbre au mal de dents*.



ARBRES FRUITIERS.

ABRICOTIER. *Prunus armeniaca.*

- A**BRICOT précoce ou hâtif musqué.
Abricot angoumois, petit, allongé, rouge, foncé.
Abricot blanc, petit, très-peu coloré.
Abricot d'Alexandrie, amende aveline.
Abricot commun, gros, fort coloré.
Abricot-Pêche de Nancy, très-gros, fondant, plein d'eau, agréable.
-

AMANDIER. *Amygdalus communis.*

- Amandier commun.
Amandier de dame, à coque tendre.
Amandier à gros fruit.
Amandier amer, à coque tendre.
Amande-Pêche.
-

AZEROLIER. d'Italie, *Crataegus azarolus*, fruit estimé pour la confiture.

CERISIER. *Cerasus fructus rotundo acido.*

- Cerisier précoce, nain.
Cerisier royal à fruit moyen, beau, rouge.
Cerisier-griotte, grosse guigne.
Cerisier de la Toussaint.
Cérisier-Albane.
Cerisier cœur de poule.
Cerisier-bigarreau.
Cerisier à ratafia un peu amer.

Cerisier noir.


Cerisier-Guigne , gros fruit.

Cerisier guin-doux.


Cerisier de Montmorency.

Cerisier commun & plusieurs autres variétés.

Cérifier-marasquin de Zara.




COIGNASSIER de Portugal , fruit très-bon pour les confitures.



ÉPINE-VINETTE. *Berberis vulgaris.*

Epine-Vinette sans pepin.



FIGUIER. *Ficus.*

Figuier commun.

Figuier de Versailles.


Figuier de Saint-Dominique , gros fruit , noir en-dehors , blanc au-dedans.

Figuier à fleur.

Figuier à fruit violet.

Figuier angélique.


Figuier à fruit noir & autres variétés.



FRAMBOISIER. *Rubus idaeus.*

Framboisier à fruit rouge.

Framboisier à fruit blanc.



GROSEILLER. *Ribes.*

Groseiller à grappes.

Groseiller à fruit rouge.

Groseiller à fruit blanc.

Groseiller à fruit noir. Cassis.

MURIER. *Morus.*

Mûrier à fruit noir.

Mûrier à fruit blanc.

NEFLIER à gros fruit. *Mespilus Germanica.*

PÊCHER. *Amygdalus persica.*

Pêche blanche (avant), très-petit fruit blanc. Mi-Juillet.

Pêche rouge (avant), fruit moins petit. Commencement d'Août.

Pêche jaune, fruit plus gros, sucré. Mi-Août.

Pêche double de Troies ou petite Mignonne, fruit plus gros que les précédentes. Fin d'Août.

Pêche-Cerise, variété de la précédente.

Magdelaine blanche, peau & chair blanche. Mi-Août.

Magdelaine rouge de Courçon, ou à petite fleur. Mi-Septembre.

Pêche-malte, variété de la Magdelaine blanche. Mi-Septembre.

Pourprée hâtive, gros fruit, rouge foncé. Commencement d'Août.

Mignonne veloutée, grosse Mignonne; jaune, & rouge très-foncé. Mi-Septembre.

Incomparable en beauté, même forme que la grosse Mignonne. Fin de Septembre.

Cardinale de Furstemberg, grosse ronde très-rouge. Mi-Septembre.

Vineuse, variété de la Mignonne, moins grosse, plus colorée. Mi-Septembre.

Bourdin, Narbonne, autre variété, même grosseur, forme & couleur, meilleur goût.

Chevreuse hâtive, gros fruit un peu allongé, jaune & rouge vif. Fin d'Août.

Chancelière à grandes fleurs, variété de la Chevreuse.

Chevreuse tardive, mal nommée pourprée, autre variété. Fin de Septembre.

- Admirable rouge, gros fruit. Mi-Septembre.
 Galande, Belle-garde, variété de l'Admirable, plus hâtive.
 Royale, autre variété, fruit moins arrondi.
 Admirable jaune, abricotée, autre variété très-féconde, même en plein vent. Octobre.
 Jaune d'Oléron, très-gros fruit, & très-sucré. Fin de Septembre.
 Teton de Vénus, fruit terminé par un gros mamelon. Fin de Septembre.
 Nivette veloutée, tardive, gros fruit. Fin de Septembre.
 Perfique, très-féconde même en plein vent. Octobre.
 La Belle de Vitry, beau fruit excellent. Mi-Septembre.
 Grosse violette tardive. Fruit lisse très-vineux. Octobre.
 Petite violette, moins tardive.
 Brugnon violet, musqué, fruit moyen.
 Rossane, gros fruit jaune.
 Pavie blanc, fruit semblable à la Magdelaine blanche. Commencement de Septembre.
 Pavie rouge de Pomponne, fruit le plus gros de sa famille. Fin de Septembre.
 Pavie jaune, gros fruit, supérieur en qualité.
 Sanguinolle ou Betterave. Chair du fruit rouge. Novembre.
 Pêche-nine d'Orléans.

 POIRIER. *Pirus.*

- Amiré Joannet. Fin de Juin.
 Aurate. Fin de Juin.
 Ambrette. Décembre, Janvier & Février.
 Angleterre; beurré d'Angleterre. Septembre.
 Angleterre d'hiver. Décembre, Janvier & Février.
 Angélique de Bordeaux. Janvier, Février.
 Arménie verte. }
 Arménie panachée. } Janvier.
 Blanquet (gros). Fin de Juillet.
 Blanquet à longue queue. Commencement d'Août.

- Blanquet (petit). Fin de Juillet.
 Bourdon musqué.
 Bergamotte d'été. Fin d'Août.
 Bergamotte d'Automne. Octobre, Novembre & Décembre.
 Bergamotte Suisse, panachée. Octobre.
 Bergamotte de Soulers. Février & Mars.
 Bergamotte de Pâques ou d'hiver. Janvier, Février & Mars.
 Bergamotte d'Hollande. Avril.
 Bezy de Cailfoÿ, rouffette d'Anjou. Novembre, Décembre & Janvier.
 Beurrée gris. Fin de Septembre.
 Beurrée blanc ou franc d'été. Août.
 Beurrée rouge d'été.
 Bezy de Chaumontel. Novembre, Décembre & Janvier.
 Bellissime d'été suprême. Juillet.
 Bezy de Montigni. Commencement d'Octobre.
 Billete.
 Bon Chrétien d'hiver. Tout l'hiver.
 Bon Chrétien d'Espagne. Novembre & Décembre.
 Bon Chrétien musqué. Fin d'Août.
 Bon Chrétien d'Auch. Tout l'hiver, & jusqu'en Mai.
 Bellissime d'hiver. Janvier & Février.
 Cuisse-madame. Fin de Juillet.
 Cassiolette, muscat vert, &c. Fin d'Août.
 Crasanne, Bergamotte crasanne. Octobre & Novembre.
 Colmart, Poire-Manne. Janvier, Février & Mars.
 Catillac. Depuis Novembre jusque'en Mai.
 Chat brûlé. Février & Mars.
 Double fleur, Février, Mars & Avril.
 Double fleur panachée.
 Doyenné blanc. Août & Septembre.
 Doyenné gris. Octobre & Novembre.
 Epargne, beau présent. Fin de Juillet.
 Epine-rose, Poire de rose. Août.
 Epine d'été fondante musquée. Septembre.
 Epine d'hiver. Novembre, Décembre & Janvier.

- Echaffery , Bezy d'Echaffery. Novembre , Décembre & Janvier.
 Fondante de Brest, inconnue Cheneau. Commencement de
 Septembre.
 Franc-réal. Octobre, Novembre & Décembre.
 Franchipanne. Fin d'Octobre.
 Grosse ambrette.
 Gracioli , Bon-Chrétien d'été. Commencement de Septembre.
 Impériale à feuille de Chêne. Mars & Avril.
 Jaloufie. Fin d'Octobre.
 Louise-bonne. Décembre & Janvier.
 Lansac. Octobre & Janvier.
 Lestergonnette.
 Muscat (petit) sept en gueule. Fin de Juin.
 Muscat-Robert , Poire à la Reine. Mi-Juillet.
 Muscat l'Allemand. Mars, Avril & Mai.
 Magdelaine , Citron des Carmes. Juillet.
 Martin-sire. Janvier.
 Martin-sec. Novembre , Décembre & Janvier.
 Messire-Jean. Octobre & Novembre.
 Manfuette , solitaire. Octobre & Novembre.
 Merveille d'hiver.
 Marquise. Novembre & Décembre.
 Naples , moyen ; forme de calebasse. Février & Mars.
 Ognonnet , Archiduc d'été. Commencement d'Août.
 Orange musquée. Août.
 Orange rouge. Août.
 Orange d'hiver. Février & Mars.
 Orange tulipée. Commencement de Septembre.
 Poire de jardin. Décembre.
 Poire sans peau, fleurs de Guignes. Commencement d'Août.
 Poire-figue. Commencement de Septembre.
 Pastorale , Musette d'automne. Octobre , Novembre & D
 cembre.
 Poire de livre.
 Poire sanguinolle. La chair du fruit est rouge.
 Poire-vigne ou Demoiselle.

- Poire-bondieu. Décembre, Novembre, & Octobre.
 Poire suprême. Décembre, Novembre, & Octobre.
 Rateau. Décembre.
 Rateau gris. Novembre & Décembre.
 Rousselet d'hiver. Février & Mars.
 Rousselet de Rheims, petit rousselet. Fin d'Août.
 Rousselet hâtif. Mi-Juillet.
 Rousselet (gros), Roi d'été. Septembre.
 Rouffeline. Novembre.
 Robine, Royale d'été. Août.
 Royale d'hiver. Décembre, Janvier & Février.
 Saint-Germain. Depuis Novembre jusqu'en Avril.
 Saint-Augustin. Fin de Juin.
 Salviati. Août.
 Sucré noir. Avril & Mai.
 Sucré vert. Fin d'Octobre.
 Trésor-amour. Depuis Décembre jusqu'en Mars.
 Tonneau. Février & Mars.
 Vallée ou Poire de Liquet. Octobre & Novembre.
 Vermillon, Bellissime d'automne. Fin d'Octobre.
 Verte-longue, Mouille-bouche. Octobre.
 Verte-longue panachée. Novembre & Décembre.
 Vilandry. Janvier & Mars.
 Virgouleuse. Janvier, Février & Mars.

POMMIER. *Malus.*

- Angélique.
 Api (gros).
 Api (petit).
 Blanc d'Espagne.
 Bardin.
 Calville blanc d'été.
 Calville blanc d'hiver.
 Calville rouge d'été.
 Calville rouge d'hiver.

- Courpendu (gros).
 Courpendu (petit).
 Fenouillet gris.
 Fenouillet rouge.
 Francatu.
 Grosfaro.
 Merveille.
 Museau de lievre.
 Pigeonnet d'été.
 Passe-Pomme rouge longue.
 Passe-rose.
 Pomme-châtaigne.
 Pomme drap d'or.
 Pomme anis.
 Pomme uzelle.
 Pomme glace.
 Pomme violette.
 Pomme-rose.
 Pomme-figue sans pepin.
 Pomme-Poire.
 Reinette franche.
 Reinette rouge.
 Reinette de Bretagne.
 Reinette de Canada.
 Reinette franche à côtes.
 Reinette grise franche.
 Reinette de Champagne.
 Reinette royale.
 Rambour d'été, Reinette (petite) hâtive.

PRUNIER. *Prunus.*

- La prune Saint-Jean, noire, hâtive.
 La jaune hâtive ou de Catalogne.
 Le gros Damas de Tours.
 La grosse Cerifette.

- La Prune de Monsieur.
- La petite Mirabelle.
- La Mirabelle double, drap doré.
- La Reine Claude.
- Le gros Damas de Mongeron.
- Le gros Damas rouge.
- Le petit Damas blanc sucré.
- Le Damas d'Italie.
- L'Impériale violette.
- La Chair de bœuf.
- Le Perdrigon blanc.
- Le Perdrigon rouge.
- Le Perdrigon violet.
- La Prune datte d'Agen.
- La Royale de Tours.
- La Robe de Sergent.
- La Sainte-Catherine.
- L'impériale blanche.
- La Diaprée violette.
- La Bricotée blanc.
- L'Isle verte.
- Le Damas de Septembre.
- La Prune de Saint-Martin.

Courpendu (gros)
 Courpendu (petit)
 Fenouillet gris
 Fenouillet rouge
 Francain
 Gros
 Merveille
 Mueun de l'ave
 Pigeonnet d'été
 Belle Pomme rouge longue
 Belle rose
 Pomme châtignac
 Pomme drap d'or
 Pomme anis
 Pomme azelle
 Pomme glace
 Pomme violenc
 Pomme rose
 Pomme rouge sans pépin
 Pomme rose
 Pomme fraîche
 Pomme rouge
 Pomme de Bretagne
 Pomme de Canada
 Pomme fraîche d'été
 Pomme de Champagne
 Pomme rose

VIGNE. *Vitis.*

Chasselas, Muscats & plants de toute espee de raisins, enraciné ou en boutures.

PRUNIER. Prune
 La prune Saint-Jean, point blanc
 La prune hâive ou de Catalogne
 Le gros Damas de Tours
 La grande Catherine

GRAINES ET PLANTES POTAGERES.

On ne fera pas ici l'énumération de toutes les especes & variétés des plantes potageres ; mais on se fera un devoir de ne fournir que de graines fraîches , & de l'espece demandée.

PLANTES A FLEUR ET D'ORNEMENT.

On fournira aussi toute sorte de plantes d'ornement , soit des bulbes, plants enracinés, rejettons & graines de plantes annuelles. Anemones, Renoncules, Œillets, Lys, Liliacées, Jacinthe, Aloës, Mesembryanthes, Cierges & autres plantes grasses.

FOURRAGES ET PLANTES

DE GRANDE CULTURE.

Nous nous sommes sur-tout appliqués à récolter les graines des plantes utiles , & nous pouvons fournir celles des especes suivantes.

Thymoty des Anglais.
 Ray-Grass ou Fromental.
 Ray-Grass de France.
 Grande Pimprenelle.
 Spergule.
 Ajonc.

