

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

1881

Etudier la photométrie analytique
des diverses radiations

Etant donnée une source étalon (lampe carcel. lampe électrique dans l'air confiné de potentiel fixe, pétrole connu, $\frac{4}{5}$ CH^4, de), on prismant par dans un spectroscope et isoler telle région de radiations que l'on désirant (entre E et F par ex.)



On juxtaposerait un spectre fourni par le même prisme et par la lumière à étudier ; et m'éloignerait de façon à égaliser les teintes pour chaque région spectrale

$$\frac{i}{i'} = \frac{d^2}{d'^2}$$

on aurait les intensités des divers éléments en fonction des hauteurs lumineuses relatives de l'étalon.
Ou bien (en faisant traverser 2 nicols croisés) on éteint au degré convenable l'étalon), on ayant soin de faire passer l'autre lumière dans une épaisseur semblable de platte.

de même pour photométrie calorifique
Etudier ainsi chaleurs absorbées et les différentes

~~Introduire Introduction~~
~~Etudier Pouvoir spectral~~

Pour les radiations ultraviolettes, on pourrait prolonger avec l'écaulure fluorène. Soret.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

1881 Il paraît que la lumière électrique s'éteint dans le brouillard plus rapidement que les autres sources lumineuses de même intensité.

Cela tiendrait sans doute à l'absorption puissante que l'eau liquide, et la vapeur qui remplit l'air exerce sur les radiations violettes et bleues de la lum. électrique.

Peut-être remédierait-on en incorporant aux charbons, des métalloïdes convenables, donnant radiations de vibration lente,.

. Sodium
Strontium. ?

La lumière verrait diminuée peut-être: mais sa portée s'accroîtrait.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

1881 Etudier les contractions

1° dans la dissolution

2° dans la combinaison.

Travail { mécanique { interne / externe
chimique

Pour un ~~kg~~ corps dissous déterminé

étudier à fond { chaleur de dissolution { physique / chimique
~~état~~
contraction { au dessus concentration
dans divers dissolvants
capillarité dans les divers cas (viscosité)
Influence de la température
Chaleur spécifique
Indice.

relation avec le cas où le sel est { anhydre / fondu.

(Sursaturation.)

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Etude des isomères :

les isomorphes cristallisent avec la même hauteur ; même absorption de chaleur.

propriété amorphes. carbonates magnésiens

Chaleurs de dissolution des isomorphes | alums
chlorures cubiques !

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Variation des forces électromotrices avec la température.

Arthur d'Arsonval

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Action de la lumière sur composés chlorures réduits.

radiations | violette
jaunes
obscures (échauffement)

Sels de Cu^2O, CuO, Fe^2Cl^3, ~~Cu~~ $MnCl$ — Argent

Permanganate.
Bichromate
Cyanures.

Effets de travail ..... | AzO^5 dehors
AgCl

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Gmelin. t 2. p. 326 | Sulfhydrate de Strontiane SrS^2H

— On sature par HS, de l'eau de Strontiane, ou du SrS dans l'eau. (Berzelius)

La dissolution obtenue évaporée dans le vide sur l'acide sulfurique donne de gros cristaux brillants à 4 pans, qui à l'air ne se transforment pas en plusieurs jours en cristaux ronds, qui chauffés fondent dans leur eau de cristallisation, puis laissent HS et SrS.

Gmelm. t. 2. p. 378 Sulfhydrate de chaux. CaS^2H.

On fait arriver à saturation du HS dans de l'eau tenant en suspension de la chaux, ou du CaS.

La dissolution incolore a une saveur amère et hépatique, une réaction alcaline et un peu caustique. Evaporée dans le vide ou dans l'hydrogène, elle dégage HS, dépose des aiguilles, et se gonfle quand elle est peu diluée, peu se dépose de HS, en laissant CaS.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Sulfhydrate de baryte. BaS^2H.

(Gmelin. t. 2. p. 179)

— On saturera de l'eau de baryte, ou une dissolution dans l'eau chaude de BaS, avec du HS, on maintiendra la liqueur à l'abri de l'air; on refroidit, on a cristaux de baryte, et des cristaux jaunes de $BaS.6HO$ (?); on évapore l'eau mère dans le vide, on a des cristaux blancs transparents de sulfhydrate (à 4 prom)

— Les cristaux † se transforment à l'air en un mélange de sulfate et d'hyposulfate. Chauffés dans une cornue, ils perdent leur eau de cristallisation sans fondre, deviennent blancs, au rouge naissant donnent HS et laissent BaS. Insoluble dans l'alcool.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Préparation du persulfure.

Il faut HCl refroidi.



Essais par autres acides :

CO^2 -

BOO^3 -

$C^4H^4O^4$. acide tartrique.

Préparations rapides par petites portions refroidies.

HCl. puis sulfure → id (dans glace et sel)

petits flacons → en onces

Essai de dissolution dans CS^2 saturé de S. à 0°. ou à temper. de l'eau publique.

Essai de distillation de la solution de CS^2 dans HS (et vide) desséché par CaCl (Hinc illæ par - Bunsen)

Etude méthodique -

Vitesse de décomposition -

0°

Essai d'action de AzH^3 sec.

HCl + 2 volumes d'eau — eau fontaine publique.

Essayer l'action de l'éther sulfuré (saturé de HS)

crème de tenebenthine

Seul : sec - en présence de SO^3,HO sous cloche

~~Sec~~ avec HCl

~~S~~ dans HS sec.

~~S~~ avec eau + HS.

avec NaS, HS saturé de HS.

avec $Na S^n$

avec Na S saturé de HS

Potasse concentrée

22 Avril 1885



HS^H - préparé par CaS^A normal sur HCl concentré refroidi -

↓ lavage

d'abord feu faible de Bunsen -

Ebullition régulière - il y a gouttelettes incolores en α de plus en plus grosses plus bas elles se transforment rapidement



C'est ? HS^- pur incolore

Odeur très prononcé dormant HS et S quand on les aspire avec tube -

Le lendemain il n'y a guère que du Soufre

Le dégagement paraît bien fait : mais la vapeur se détruit avec facilité, peut être aussi parce que plus abondante les plus froides -

HS^H se dissout très bien dans une solution de S dans CS^2 sans qu'il y ait dépôt de soufre

La liqueur obtenue se détruit peu à peu en dégageant HS, sans qu'il y ait dépôt de soufre.

Par ébullition il semble passer les mêlanges - CS^2 semble passer pur mais avec odeur éthérée - [Accident empêche ébullit. normale

S.C.D. TOULOUSE III B.U. de SCIENCES


KOH
KSH
CaCl
anhydre
A
A'
nacelle de charbon
B
B'
KOH
ou
HCl
Sol de KI
CaI
anhydre
nacelle de charbon

S.C.D.
TOULOUSE III
U.F.R. de
SCIENCES

Action de CO^2 sur bore. (importante pour choix d'atmosphère inerte, dans réactions chlorées).

~~Vapeur~~ $BoCl^3 + H^2O$ dans calorimètre
exc

$BoBr^3$ – dans thermogène

BoS^3 = a id – appareil ~~anal~~ + serpentin.



Séléniure de bore
Tellurure id

Phosphure ?
action PhH^3 sur $BBCl^3$
H_2S →

Dérivés amidés
$Bo(AzH^2)^3$.
ou $Bo(OH)^2 AzH^2$
ou $BoCl^2(AzH^2)$.
$BoCl.AzH$

Borures métalliques
(par réduction de borates par H en présence du métal.
ou par métal lui-même

Etude d'azoture. | préparation par Az ! par AzH^3
Etude thermique par Cl ?

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

$BoCl_3$ dans tube ~~en fer au rouge sombre~~ ;
enduit d'acide borique externe ; tube doré.



→ hampst de bore cent

dans courant de CO_2 ou H

Chauffer Bo cent dans HCl (tube borique)
cent

id dans tube ~~Fe~~ doré.

Chalem de form. de $BoCl_3$



$BoCl_3 + AlI_3$ = (mar de prépar. Diodure).
+ (iodure carbone)
(+ iodure de silicium.) ?

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES



Trompe à vide

à 180° 250 —— 500
au rouge sombre. rouge sombre.

$\frac{273 V H}{273 + t} = \frac{1}{} cm$

$V_0 \times 1 = \frac{273 \times V H}{273 + t}$

$H = \frac{273 + t}{273}$ double à 273°

quadruple à 556.

Enfermer dans tube
avec fil de fer :

$Bo Cl^3$



$Bo Cl^3$ +

Mg
Al
Zn

Na — dans nacelle fer (précaution de Si)

Th. As.

Ammoniaque — reprendre exper. à basse temper.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U.T. de
SCIENCES

appareil à CO^2 sec

ou à H.

Petit appareil Dervilla

laveur à Carbonate de soude
à SO^4H^2

colonne à SO^4H^2.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

19,4 — $\underset{\text{méta}}{S^2O^4}$ + KO

17,9 — S^2O^4 + KO

16,3 — HFl + NaO

16,[illegible] — $HKOS^2O^6$ + [illegible] NaO

15,6 — SO^3 + CaO

15,2 — SeO^3 + NaO

15 — PhO + NaO — AsO^5 + NaO

14,8 — PhO^3 + NaO
$C^4H^4NaO^8$ + NaO
oxalate $PhO^5,2HO$ + NaO

14,7 — $PhO^5,3HO$ + NaO

14,5 — PhO^5,HO + NaO
SO^3 + A2H
ferricyanhydrique $\left(\frac{1}{3}(Fe^2H^3Cy^6)\right)$ + KO

14,3 — [illegible] NaO

1'

14 — $C^{10}H^{10}O^4$ + NaO
HCl + CaO
CyH,HS + KO

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

13,9 — $KO.SO^4 + KO$; $CaO + As^2O^5$; Ba ; Sr

13,8 — $C^4H^2O^8 + NaO$; acétate ; $As^2O^3 + NaO$

13,7 — $SeO^2 + NaO$; $HCl + NaO$; $C^8H^8O^4 + NaO$; $As^2O^5 + NaO$; ac. picrique + NaO

13,6 — $PhO^3Na + NaO$; $PtCl^2HCl + NaO$

13,5 — $S^2O^2.HO + NaO$; $C^9H^2O^4 + CaO$; ac. ferrocyanhydrique $\left(\frac{1}{2}\ Cy^3FeH^2\right) + KO$; $C^6H^6O^6 + NaO$

13,4 — $C^7H^7O^4 + NaO$; $C^4H^4O^4 + CaO$; ~~$C^4H^4O^4$~~ +

13,3 — $C^4H^4O^4 + NaO$; $IO^7 + KO$; $KO.IO^7 + KO$; $HFl.SiFl^2 + NaO$

35.9.

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

12.9 — $C^8H^6O^{12} + KO$

tartrique

$C^8H^5KO^{12} + KO$

$C^{12}H^8O^{14} + KO$

arbique

$C^{12}H^7KO^{14} + KO$

$C^{12}H^6K^2O^{14} + KO$

12.8

12.7 — $C^8H^6O^{12} + As^2H^3$

12.6 — $AsO^5, NaO + NaO$

12.5

12.4 — $CrO^3 + NaO$

12.3

12.2 — $\frac{1}{2}(Cy^3H^2Fe) + As^2H^3$

12.1

12

11.9

11.8

11.7 — $PhO^5NaHO^2 + NaO$
$PhO^5NaH^2O^3 + NaO$

11.6 — $B^2O^6 + NaO$

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

8,2 ——— $NaO.B_2^2O^6$ + NaO·

8 ——— $Az_2H^4O.B_2^2O^6 + Az_2H^3$

7,8 ——— H^7S^2 + NaO·

7,5 ——— Resorcine $\xrightarrow{CaO}$ + NaO

7,4 Phénol $C^{12}H^6O^2$ + NaO

7,3 ——— $PhO^5Na^2HO^3$ + NaO·

5,3 ——— $\frac{1}{2} Az_2^2O^3$ + KO

4,8 ——— SnO^2hg^2 (jaune) + NaO

4,3 ? ——— Si^2O^4 + NaO

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

3,6 — $As_2H^4O, B_2O^6 + As_2H^3$

~~$C_2O^4, As_2H^4O + As_2H^3$~~

3,2 — $HCy + CaO$.

3,1 — $2KO, I_2O^7 + KO$
$3KO, I_2O^7 + KO$
$4KO, I_2O^7 + KO$

2,9 — $HCy + NaO$.

2,7 — $C_2O^4, As_2H^4O + As_2H^3$

0 — $NaS, HS + NaO$

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

14 ——— CaO + HCl
Sr
13,85 ——— BaO + HCl
13,8 ——— MgO + HCl
13,7 ——— NaO / KO + HCl

13,2 ——— Ethylamine + HCl

12,5 ——— LaO + HCl
12,45 ——— A_2H^3 + HCl
——— CoO + HCl
12,1 ——— DiO + HCl
12,0 ——— MnO + HCl
11,8

11,3 ——— NiO + HCl

10,7 ——— FeO + HCl
PbO + HCl

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. Sc
SCIENCES

10,6 — CdO + HCl

10,1 — CdO + HCl

~~10~~ — ~~methylaniline + HCl~~.

9,8 — ZnO + HCl

9,25 — HgO + HCl

$Al^{\frac{2}{3}}O$ + HCl

9,3

9,2 — $Ar_2H^3O^2$ + HCl

9 — trimethylamine + HCl

8,2 — 9 — paratoluid

7,5 — CuO + HCl → Cu^2O + HCl

7,4 — aniline + HCl

6,9 — $Cr^{\frac{2}{3}}O$ + HCl

6,8 — $Be^{\frac{2}{3}}O$ + HCl

$Fe^{\frac{2}{3}}O$ + HCl

5,9 — PdO + HCl.

5,4

2,8 — acide amidobenzoïque + HCl

1,5 — 1,4 — SnO + HCl — SnO^2 + HCl^2

1,1 — glycocolle + HCl

0,1 — urée + HCl

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U.I. de
SCIENCES

11,5

11,4

11,3

11,2 —— $C^{12}H^{8}O^{14}$ + AsH^{3}
ac. citrique
(et citrates).

11,1

11,0 —— CrO^{4} + NaO.

9,7 —— CrO^{4} + AsH^{3}.

9,6 —— ClO + KO

8,8 —— AsO^{3} + AsH^{3}

8,7 ——
- $NaFl, SiFl^{2}$ + NaO
- $NFl. SiNa^{2}$ + NaO

8,3 $AsO^{5}, 2NaO$ + NaO

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

— Faire un polysulfure de K et Na, en chauffant du carbonate dans HS, puis mélangeant le produit avec du soufre, et chauffant au rouge dans H.

— Engager la préparation de MgS, par S sur Mg en limaille - Tube de porcelaine sur la grille de cuve. ~~grande~~ Courant de H. Regaid en avant. Gros tube à la fin pour que S n'obture pas.

— id. avec aluminium —

— Se procurer et pulvériser
- Blende naturelle
- Blende hexagonale artif.
- Pyrite jaune
- pyrite blanche
- pyrite magnétique
- [abandonné MgS]
- galène pure non argent.
- stibine

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

— Essayer de faire le sulfure de bore, par HS. sur borure de fer, ou de manganèse (dans tube de charbon ?) - (Debray - Hautefeuille).

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Feldspaths | albite – $Na\,Al^2Si^6O^{16} = Na_2O, Al_2O_3, (SiO_2)^6$ ↑ orthose monoclin $(Na,K)_2O, Al_2O_3, (SiO_2)^6$

anorthite $CaO, Al_2O_3, (SiO_2)^2$

$Ca\,Al^2Si^2O^8$

ou: $Ca^2\,Al^2(Si^4Al^4)O^{16}$

$mm = 118°48'$

$ph' = 116°7'$

$2\,Al_2O_3$

$Al^4O^6 \longrightarrow 3\,SiO_2$

$Al^4 \longrightarrow Si^3$

$Si = 14$ / 3 / 42

13.7 Al / 4 / 548 / Al^2 —— 42 Si

$Na_2O, [Al^2Si^6].O^{15}$

$Na_2O \cdot Al_2O_3 \cdot Si^6O^{12}$

Amphigène $[K\,Na]O, Al_2O_3, 4\,SiO_2$ – cubique ??

$Na.[K\,Ca]O, Al_2O_3, 2SiO_2$ – hexagonal

Triphane – $3(Li, Na, K, Ca)O, 4\,Al_2O_3, 15SiO_2$

Pétalite $3(Li.Na)O, 4\,Al_2O_3, 30\,SiO_2$ monoclinique $m:m = 87°$ $p:h' = 140°20'$

monocl. $m:m = 86°20'$

$p:h' = 112°26'$

Milarite $HO, KO, 4\,CaO, 9\,Al_2O_3, 24\,SiO_2$ orthorhomb

2

micas

micas

$3(K,H)O, 3(Al,Fe)^2O^3, 6SiO^2$ (K, Na, Li, H) (Fe)

et mélange

$3(K, Na, Li, H)O, 2(Al,Fe)^2O^3, 6SiO^2$

$12MgO, 6SiO^2$ (Fe, Mn)

$4HO, 10SiO^2, 10Si$ Tchermak

des angles Fe

à revoir

$5HO, 7MgO, Al^2O^3, 4SiO^2$ — Pennine

rhomb = 65° 28

monoclinique !

$7HO, 8MgO, 2Al^2O^3, 5SiO^2$ — Clinochlore

monoclinique 125° — 37 mn

$3MgO, 2(Al,Fe)^2O^3, 8SiO^2$ — Cordierite — orthorh mm = 119° 10'

CaO, TiO^2, SiO^2 (Ca, Mn) sphène — clinorhomb — mm = 113 31 ph' = 119° 43

$HO, (Ca, Fe, Mn, Mg)^3O^3, (Al, Fe, Mn)^2O^3, 2B_2O^3, 2SiO^2$

axinite — triclinique

Topaz $Al^2O^3 SiO^2 = Al^2Si(O,F)^5$ mt = 135° 28'

orthorhomb — 124° 17'

Emeraude — $Al^2O^3, 6SiO^2, 3GlO$

S.C.D. TOULOUSE III B.U. de SCIENCES

Hauyne — cubique

$[(Na.Ca)O, Al^2O^3, 2SiO^2]^2 . (CaNa.K)SO^4$

en

Sodalite

$3[NaO.Al^2O^3, 2SiO^2] + NaCl$

cubique

Journaliers Rhombo 133°8'

$3MO, 3M^2O^3, SiO^2, BoO^3$

$3MO, 4M^2O^3, \frac{15}{2}SiO^2, BoO^3$

$MO, 2M^2O^3, 3SiO^2, \frac{2}{3}BoO^3$

$MO, 3M^2O^3, \frac{9}{2}SiO^2, \frac{2}{3}BoO^3$

$MO. 4M^2O^3, 6SiO^2, \frac{4}{3}BoO^3$

$M = (H, K, Na, Mg, Fe, Ca$
$Zn, Mn)$

$M = Al, Fe, Mn$

23
35,5
585

19
23
42

29
80
115

197
23
150

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Phénakite – $2GlO, SiO^2$ rhomb – 116° 36'

$HO, 2GlO, Al^2O^3, 2SiO^2$ (Be). clinorhom $mm = 144°40'$

Zircon – ZrO^2, SiO^2 – quadratique $i'i' = 95°40'$ sup

Pyroxene $(Ca, Mg, Fe)O, SiO^2$

- Diopside ou : $Ca.(Mg\,Fe)O, 2SiO^2$ – monoclin $87°5'$ (Al^2O^3)
- Augite – d'après Tschermak $m(Ca(Fe\,Mg), Si^2O^6) + n(MgO, Al^2O^3, SiO^2)$ même forme
- Amphiboles – Trémolite, actinote, Hornblende $CaO, [(Fe\,Mg)O]^3, 4SiO^2$ (+ Fe^2O^3 et Al^2O^3)
- Bronzite, Enstatite, Hypersthène $(Fe\,Mg)O\,SiO^2$ orthorh. isomorphe

~~MnO, SiO^2 – Rhodonite triclinique $mt = 73°48'$~~

VI.9

Na. | Cl | Br | Io | K | Cl | Br | Io |

cubes.
ch spéc.

		Br	Io
NaCl = 58,5	12,5	~~14,3~~	13,0
KCl	12,9	~~13,3~~	13,6

volume d'eau

ch sp

~~Ti~~ . alums .

aluns K	176,1
chrome K	176,8

vol.

$Ca^{10}\ Ph^{6}\ O^{24}\ Cl$.

$(3\ CaO.)^3$ $\quad 3\ Ph\ O^5$

3

S.C.D. TOULOUSE III B.U. de SCIENCES

$2MgO, SiO^2$ — Péridots orthorhombe → mm = 119° 13'

(Fe)

Chrysolite Mn. Ni

chrome (Fe) ?

Hyalosidonite - (Al^2O^3)

Leèvrite = Ilvaite — HO, 2 CaO, 4 FeO, Fe^2O^3, $4 SiO^2$

orthorhombe mm = 112° 38

Epidote HO . 4 CaO, $3[(Al.Fe)^2O^3]$, $6 SiO^2$

monoclinique mm = 69° 56

(Piemontite) Mn — Mn

Zoïsite — 6 CaO, $4 Al^2O^3$, $9 SiO^2$

orthorhombe = 116° 16'

Jadéite — NaO, Al^2O^3, $4 SiO^2$ amorphe

Wollastonite — CaO, SiO^2 — monoclinique mm = 95° 35'

Pectolite — $\left(\frac{Ca}{Na}\right)$ O, SiO^2 (?) — idem
H

Métaux volatils

K = 2 — K^2 = 4 volumes

Cd — Cd^2 = 4 vol

Hg ——— = 2

As = 1 (S6)

Te

Carbone

cube

hexagone

Silicium

Hexagone octaèdre

210 | 99

Cubiques

cadmium

O2

argent

platine

palladium

plomb

mercure

cuivre

fer

Br — 24°.5

Iode octaèdre rhombiq.

S. et S_2 rhombique

plusieurs états

Ph — dodécaèdre régulier de CS^2

rouge (rhomboédrique)

Arsenic — rhomb. 85°

Antimoine 87°3

Bismuth 87°30

Tellure — 87°6

Bore

atomicité

1 à 0,68

quadratique

Na

octaèdre angle sup. de 80°

rhombaédrique

étain

K (octaèdre 52°)

gallium

Arsenic

Tellure

Zinc

Magnes

S.C.D. TOULOUSE III S.U. de SCIENCES

$7HO - (Ca.Na\,K)O,\ Al^2O^3,\ 5SiO^2$ — rhomboèdre
Chabasie — pp = 94° 16'

$5HO, (Ca\,Na\,K)O,\ Al^2O^3, 6SiO^2$ — orthorhombique ?
Stilbite — mm = 94° 16'

$5HO\ (Ca\,Na\,K)O,\ Al^2O^3, 6SiO^2$ — clinorhomb
Heulandite — mm = 136° 4'

Epistilbite — id — mm = 135° 10'

$5HO.\ (Ca\,Na\,K)O,\ Al^2O^3, 3SiO^2$ — rhomboèdre
Lenyne — pp = 106° 3'

$3HO, CaO,\ Al^2O^3, 3SiO^2$ — clinorhom
Scolésite — mm = 91° 22'

$4HO, CaO,\ Al^2O^3, 4SiO^2$ — monoclinique
Laumonite — mm = 86° 16'

$HO, 2CaO,\ Al^2O^3, 3SiO^2$ — orthorh
Prehnite — mm = 99° 56'
pa' = 134

hydrata

$2HO, NaO, Al^2O^3, 3SiO^2$ — mésolyte
orthorh — mm = 91°

$2HO, (Na.Ca)O, Al^2O^3, 4SiO^2$ — cubique ? analcime

Gmelinite $6HO, (Na\ Ca)O, Al^2O^3, 4SiO^2$ — rhomboédrique
p : p = 112°26

Chomonite $5HO\ 2(Ca\ Na), 2Al^2O^3, 4SiO^2$ — 2 rhombique — 90°46'

$8HO, (Ca\ Na)O, Al^2O^3, 3SiO^2$ — mésolite
triclinique
mt = 88°15'

Christianite — $5HO.(K\ Ca)O, Al^2O^3, 5SiO^2$
orthorhom 111°15'

Gismondine $4HO, (Ca\ K)O, Al^2O^3, 2SiO^2$ — 6 : 6'
quadrat — 92°30'

Apophyllite $2[(H,K)O], CaO, 2SiO^2$ — quadrat — ?
a' : a' = 58°56'

S.C.D. ROUSSEAU 31 B.U. de SCIENCES

Datolite.
$HO, 2CaO, BoO^3, 2SiO^2$ — clinorhomb. mm = 76°38

Bengtonite
$12HO, 3BaO, 4Al^2O^3, 11SiO^2$ — quadratique mb' 133°3

? clinorh. mm = 120°1

Harmotome
$5HO, BaO, Al^2O^3, 5SiO^2$ — orthorh.
0,8 : 0,8 : 0,6.

Brewsterite
$5HO, (Sr.Ba)O, Al^2O^3, 6SiO^2$
clinorhomb. 136°

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

$Al^2O^3\ SiO^2$ — orthorhomt
andalousite $mm = 90°\ 44'$

(Fe)

$8\,Al^2O^3, 9\,SiO^2$ — orthorhomb.
(Fe) sillimanite $mm = 111°$

Al^2O^3, SiO^2 = Dathene.
tetragone

Staurotide $4(Al\,Fe)^2O^3, 5\,SiO^2$

ou $4\,FeO, 8\,Al^2O^3, 7\,SiO^2$
(Fe)

orthorh — $129°\ 26'$

~~Agalmatolite~~
Halloysite — $(4\,HO, Al^2O^3, 2\,SiO^2$ ou $2\,HO)$ amorphe

allophane $5\,HO, Al^2O^3, SiO^2$
amorphe

S.C.D.
TOULOUSE III
H.T. des
SCIENCES

$2HO, Al^2O^3, 2SiO^2$

kaolin — amorph

Argile plastique —

$4HO \cdot 2Al^2O^3, 5SiO^2$

à $3HO, Al^2O^3, 5SiO^2$

Pyrophyllite — et Jaquelite

$HO, Al^2O^3, 4SiO^2$

à bacillaire $3(H\,Mg)O, 2Al^2O^3, 9SiO^2$

Pholérite — $4HO, 2Al^2O^3, 3SiO^2$

nacrée

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Grenats - cubique (orthorhomb ?)

$3\begin{Bmatrix} Ca \\ Mg \\ Fe \\ Mn \\ Cr \end{Bmatrix} O , \begin{Bmatrix} Al \\ Fe \\ Cr \end{Bmatrix}_2 O_3 , 3 SiO_2$

Idocrase $19(H, Ca, Mg) O , \frac{1}{4}(Al\ Fe)_2 O_3$
$14 SiO_2$

quadratique $pa' = 151° 45'$

Partschine $3\begin{pmatrix} Mn \\ Fe \\ Ca \end{pmatrix} O , Al_2 O_3 , 3 SiO_2$.
orthorhomb $91° 52$

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Prisme quadratique
$a' : a' = 136° 11'$

Meionite $4CaO, 3Al^2O^3, 6SiO^2$

Wernerite $-3(Ca, K, Na, Mg)O, 2Al^2O^3, 6SiO^2$

Dipyre $3(Na, Ca)O, 2Al^2O^3, 9SiO^2$

Couseranite – ?

Humboldtilite ?

$8MgO, 8SiO^2$ – Humite
(=) orthorhomb – 130° 19

id. – Chondrodite
plus fluoré – clinorhomb
32° 1'

FACULTÉ

DES

SCIENCES

LABORATOIRE

DE

CHIMIE

Bordeaux, le

monocliniques

Clintonites

$m(2HO, 9CaO, 8MgO, 6SiO^2)$

$+ n(HO, CaO, MgO, 3Al^2O^3)$

Seybertite (diphorite) — $m = 4$, $n = 5$

Brandisite — $m = 3$, $n = 4$

Xanthophyllite — $m = 5$, $n = 8$

Chloritoïdes

$m(HO, 2FeO, 2SiO^2)$

$+ n(HO, 2Al^2O^3)$

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Talc - $HO, 3MgO, 4SiO^2$
orthorhomb ℓ de 120°

Magnésite — $2HO, 2MgO, 3SiO^2$

Picrosmine $HO, 2MgO, 2SiO^2$
orthoh 117° 48

Villarsite $HO, 4MgO, 2SiO^2$
orthoh 120° 8'

Serpentine - $(2)HO, 3MgO, 2SiO^2$
ou (3)

13 m

S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Rhodonite MnO, SiO^2 – triclinique $mt = 73°48'$

Willemite – $2ZnO, SiO^2$ – rhomboèdre $116°1'$

Calamine $HO, 2ZnO, SiO^2$ – orthorh. $104°13'$

Eulytine – $4Bi^2O^3, 3SiO^2$ – pseudo-cub. rhomboèd $120°$

Dioptase – HO, CuO, SiO^2 – rhomb. $95°55$

Chrysocolle – $2HO, CuO, SiO^2$ (amorphe)

BACCALAUREAT
ÈS-LETTRES.

COMPOSITION

NOM DU CANDIDAT,

( )

N. B. Le Candidat inscrit ses nom, prénoms, lieu et date de naissance en tête de la copie, et signe lisiblement son nom à la fin de la composition.

VISA
du Professeur surveillant :

FACULTÉ DES LETTRES
DE TOULOUSE

Le _____ 18 .

né le _____

Département de _____

S.C.D. TOULOUSE III B.U. des SCIENCES

Ordre chronologique

Ordre ~~analytique~~ Ordre analytique

Corps simples

S

Soufre

Fe S

H Cl

H_2O . SO_2

Mettre le compteur à gaz dans le manomètre à eau

Courant rapide

Eprouvette à Winneg, pour recueillir

eau ou liqueur

H_2O CO_2 CO

H_2S

tube mince Platine

ou argent

H CO

CH_4

$H + CS_2$

Synthèse calorifique

Divers modes de préparation des phosphures

1. Ph + métal ... à chaud
2. Phosphate ou phosphate acide (hydraté) et métal, avec ou sans charbon, au rouge (on a : CO^2 ou NO).
3. Ph et oxydes (on a en même temps phosphate), au rouge
4. Phosphate et charbon ; au rouge
5. PhH^3 avec chlorure, oxyde ou sels
6. Ébullition du sel métall. avec Ph rouge.
7. ~~Oxyde~~ PhH^3 sur oxyde au rouge
8. Phosphate acide avec sulfure et charbon.

Az libre avec métaux au rouge ... Bo, Si, Mg, Cr, Ti, Zr.

Zn, Si, Fe, et ~~Al~~ ferrug. prennent un peu d'azote au rouge

Cu. ~~Mo~~. ~~W~~. rien.

(Briegleb et Geuther (Ann. Pharm. 123 . 228

Si absorbe Az seulement au commencement de rouge

Si Ca au rouge vif dans Az donne azoture à surface

Mg Si ~~au rouge~~ donne Si et Mg Az. faible

AzH^3 sur métal. K. Na. Zr. Mg, Fe. au rouge =

d'abord hydrures.

AzH^3 sur oxydes de Ti, Ta, Nb, Cu, Fe, Hg donne azoture

à chaud ou au rouge (au dessous de 100°)

Th donne amide,

ou avec chlorures

S.C.D. TOULOUSE III B.U. des SCIENCES

Décomp. du $KoClO^5 \rightarrow O$

Solide – Donnant | solide / gaz + Q.

~~SO^2 hydrochlorate~~

(Décomp de l'azote) – gaz → gaz + Q

Décomp de HO^2 + Q

~~Chlo~~ SO^3HO + acide oxalique = liq + sol = gaz + liq / + Q

Disque de marbre + | HCl / HO^5 + Q sol + liq = liq + gaz.

Transformation de PhO^5 anhydre en meta

J^2 de PhO^5HO

verre

azotate d'ammon — liq = gaz + Q

mélam + HCl + → H — sol + liq = liq + gaz.

azotate d'amm = AzO + eau liq = gaz + Q

I.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES

Préparation du persulfure. par Na_2S^2

NaS - cristallisé

$NaS, HS + S$

(dilué - concentré

$NaS_4(HS)^{n'} + S^n$

Solution alcoolique de NaS^n

vérification.

Essai par HCl refroidi.

plus léger - sirop plus rapide

préparer CaS

Essai de préparation de CaS^2 / CaS^4

par $CaS + S^3$ à chaud

pur +.

On n'a pas encore réussi de cristaux

(Essayer alcool.



S.C.D.
TOULOUSE III
B.U. de
SCIENCES