





liquidation...
 Contait...
 Am. des. 60. nat.
 Octobre 1892
 Contait...
 Journal de l'hygiène...
 mai 1892
 Auguste...
 Vietnam...
 1892

T.1...
 28 mai 1892

T.2...

(mousses du bassin de...)
 fons de Vendôme...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

Testaceola...
 1892

199,029. - Carnet de 177 feuillets (y compris)
 desu et planches. - Boulogne le 8 avril 1902 -
 Epaves de Coquilles fossiles du gers -



- a été par M. l'abbé Dupuy -

ex qui a été rapportée aux coquilles vivantes.

Delix = *Variabilis* Drap. - falc. compacte a l'exterior, rochers sur
 laque de ville en batis et 99 carraies
 des environs (anci dot ?)

Pisana Muller. rochers, de l'ardes à l'ext aune

Memoralis et hortensis Drap. - Sansau (Ed. Hart.)
 Tourget (renau)
 murelle (d'après) 1892
 Idée (vendien)
 Drouard (l'ext ?)

Vermiculata Mull. - sur de l'ardes (l'ardes)
 sur l'ext aune

Carthaginiensis Mull. - sur d'arch. la Bouche (l'ardes)

Trispida Drap. - Sansau (Ed. Hart.)

Clivatorum Mull. - rochers de l'ardes à l'ext aune

Algira Ruo. - sur d'arch. - Drouard, la Bouche

Palchella Drap. - Sansau (Ed. Hart.)

Claudia - Sansau (Ed. Hart.)
 sur l'ardes (l'ardes)
 sur l'ext aune

Pipamuscorum Drap. - Sansau (Ed. Hart.)

Liganea Drap. - Sansau (Ed. Hart.)

Carjichium *sinuatum* Mull. - Sansau (Ed. Hart.)

Planalis - *contorta* Mull. - Sansau (Ed. Hart.)

Planalis - *sinuata* Drap. - Sansau (Ed. Hart.)
 sur d'arch
 sur l'ext aune

Planorbis & Leucostoma Müll. Sauss. Ed. L.

—— rotens Drap. — Sauss. Ed. —

—— nitidus Drap. — Sauss. Ed.

Pyræna — peregra Lam. — Sauss. Ed. —

—— stagnalis Lam. — cur. l'auch;

Leucostoma
Leucostoma

—— minuta Lamk. — Sauss.

Robur (alt. Dubon)

Cyclotoma elegans Drap. — Bouget (p. 111) (Lacaze)

cur. l'auch.

de 1^{er} lang.

Paludicola ingens Lamk. — Bouget.

Uria picturata Drap.

Uria — lucigera

St Georges pres Colque
sa ch. a été recueillie par M.
Lacaze par la population de M.
de Pyramet.

avant de venir à des grades

1^{re} terre obscure imprégnée
986. les moules intérieures.

en blanc tat.

ter. sur conserve

Double Cal. de Bouget et de Lectoria.

inflam. sur grand gale (conserve), plus aplati
sur conserve. qui a paru pas être le p. rotundatus Drap.

Double tuff. des cur. de passage de bonne vue

livre d'eau douce dans grande tuff. pour la

partie fortifiée cotée en rappelle la forme de certains

moules des ann. sept. L'alt. Dapny sont
cette espèce à M.
de Neogoniatel.

à St Georges — se trouve parmi les moules sur la
mélange cotée, tuff. qui l'a été recueillie
au carter des Coches. 1 moule. sur
le moule a des grades fort belles en moule.
haut et sur a été dans des grains con-
serves.

sur la cal. de Bouget recueillie par M.
Lacaze les parties de la

Journ. de Conchyli. (1850) t. I p. 301
Tab. XV

Helix Partiti —

manque dans l'agence, vu depuis par Carleton
campagne des ruis de l'incense et de l'encens de ce lieu.

Cyclonurus Sulpirianus — l'encens. Et comme à la mort de ce
Jusqu'à rien et rien (à la gare)

Helix ramosa —

Calcain a la porte inf. de la vallée de la gare (gare)
alors dans l'agence, dans la gare
dans la gare, puis de l'encens (à la gare)

Nautilus Sulpirianus —

Longue (valeur de la gare) dans le ruis. à l'encens
lequel
flamme
Calc. blanc et gris de la gare (gare)
formation de la gare de l'encens, l'encens (gare)
et l'encens (gare) ou d'encens de la gare

Salix repens L. - Salix repens (L.) Vahl
 La Plume (L.) Vahl

Helix varanensis. noul. Calc. - marais de Seguen
près l'établissement des Bains de la marne (gers) G.

Helix Deuperis noul. - Calc. - compacts de Lardouss (gers)
M. Dupuy. marais de Lardouss R.

X Helix pulchella fossilis. noul. - Nausau marais arg. à helix 277 G.

Helix pulchella Dup. Journ. de Conchy. 1850 t1 p. 905.

est tout uniforme à helix vivante à pulchella Muller

X Helix rotundata fossilis. noul. - Nausau.
mar. arg. à helix 277 G.

Helix costata Dup. Journ. de Conchy. (1850) Calc. compacts. R.
t. 1. 905 non Muller Lardouss (gers)
à En. Bidot. R.

allouettes; d'origine à helix à rotundata Muller

Helix Capgrandi. noul. Calc. - près sur detos (Lot et Gar.) R.

Helix kassiana. noul. - Nausau R.R.R.

très proche de l'autre espèce vivante

Clausilia

6

X Clausilia maritima Grav.
Conchy. foss. du bas des adans 1858
à l'est de la route commune de Bordeaux
tX p. 117. pl. 4 fig 17

Clausilia Larteti Dupuy.
Journ. de Conchy. 1850 t1 p. 906.

réaction (H. gravina)
dans le bas de la grotte, à la
fabric. des briques (M. Dupuy)
Nausau
Omeyan R.

à l'est de la route, à l'est de la route.
dans les falaises jaunes de la
Mandille, à l'est de la route (M. Dupuy)

Pupa

Pupa Larteti Dup. - Nausau arg. mar. à helix 277 G.
Journ. de Conchy. 1850
t1 p. 907. tab. XV

Pupa multistriata Dup. - Nausau. arg. mar. à helix 277 G.
Journ. de Conchy.

Pupa iustiana. Dup. - Nausau arg. mar. R.
Journ. de Conchy.

Pupa's. blanchiella Dup. - Nausau - arg. mar. à helix 277 G.
Journ. de Conchy. R.R.R.

Pupa triplata fossilis. noul. - Nausau arg. mar. R.R.R.
à l'est de la route - Lardouss - arg. mar. à helix 277 G.
à l'est de la route - Lardouss - arg. mar. à helix 277 G.

— *Vertigo* —

Vertigo pygmaea fossilis. noul. — Lussan. arg. mar. ital. 1841.

identica cu *Pupa pygmaea*. Duf.

cu *Vertigo pygmaea* Feruss.

Comun din la Pirenae.

Vertigo anti-vertigo fossilis. noul. — Lussan. arg. mar. 1841.

Pupa anti-vertigo Duf.

num. conchyl.

Laureat identica cu *Pupa anti-vertigo*. Duf.

cu *Vertigo anti-vertigo*. noul.

Qui est de la Pirenae etc. noul.

— *Carychium* —

Carychium minimum Stolic. noul. — Lussan. arg. mar. 1841.

Carychium minimum Duf.

num. conchyl. 1840 et 1.

Identica cu *C. minimum*. Müller & Sowerby.

Malacologie

Cogula *terrestris*

et

fluvialis

Int. de la région de la Seine - sur la rive droite (1897)
 de Boissy - Rev. Zool. par la Soc. Zool. 1839

76

Mages - ~~sur la rive gauche de la Seine~~ 1846

Dupuy - Journal de Pouchet. t. I - p. 304 - 1850

Bouvier - Bull. Soc. Zool. p. 16 - 1857

~~Bull. Soc. Zool. de France - t. I - p. 212 - 1857~~

Mathieu - fossiles des Roches de Rhône P. 210 - p. 212 - 1848

M^l de la Roche - Ann. des Sc. nat. Zool. p. 176 - 1848

~~Lenglet - Ann. des Sc. nat. t. XV - p. 404 - 1848~~

H. Brongniart - Ann. des Mus. t. XV

faunes de la doune herbacée de Crémise
quant. id. soc. L. - t. XIV.

revenir - faunes de la doune inf. en cretace, Bull. soc.

Vandœuvre SC. nat. t. V. 1857 - faunes de la doune

id. 1861 v. VII. - Description of faun. freschevater

Crémise - du continent de cop. d'au doune d'un fa. des cretace de la doune
1859. t. X. t. XI - h. 167.

Quant. jour. - faunes herbacées de la doune
1860 - XVI - 3 - 109. - des doune quant. jour.

Revue element of malacology - 1862
" conchology - 1862

Ville - salle de la doune ozo - géographique de malacology
trouvée nella Lambardie - h. 167, att. de la
société géologique resident in l'indus t. I. 1859

Gnaills - cat. de la doune molluscos in Egyptia
1866 1 pl.

Oliver - voyage de la doune German, l'Egypte et
la doune G. 1866 - atlas - 14 pl. de la doune

Paris - voyage en l'Arabie 1869
Cat. moll. de la doune de la doune 1869 - h. 167.

Magasin de Zoologie - 1844	Page	Rev. et Magas. de Zoologie 1857	Page
Helix Ramondi - Al. Brong.	1	Parichium en l'Egypte - Bourguignat	59
Moroguesi - Al. Brong.	3	Monodonta - Bourguignat	61
Cocquii - Al. Brong.	5	Aut. l'Egypte - Al. Brong.	61
Archiaci - de Bourguignat	7	Monodonta - Bourguignat	63
Vicalai - de Bourguignat	9	Annuaire des Sc. nat. 1858 TXV	
Bourguignat - de Bourguignat	11	Perceps	65
Caritii - de Bourguignat	13	Ferussina l'Egypte - Bourguignat	67
prolata - de Bourguignat	15	Helix rebaudii - Bourguignat	
rara - de Bourguignat	17	Bullet. géologie de France - T. II	

Annales du Muséum - 1810	Page	Bullet. géologie de France - T. II	Page
Cyclotoma elegans in l'Egypte - Al. Brong.	21	Butinus l'Egypte - Bourguignat	69
Munici - l'Arabie	21	Munici - Bourguignat	69
Palaeontologia l'Arabie - Al. Brong.	23	Cyclotoma formosa - Bourguignat	69
Planorbis rotundatus - Brong.	25	elephant l'Arabie - Bourguignat	71
Comus - Al. Brong.	27	Helix rebaudii - Bourguignat	71
Purpurinus - Al. Brong.	27	Capitulum - Bourguignat	71
Leus - Al. Brong.	29	Serpentinae - Bourguignat	71
Lymnaea longicauda - Brong.	31	Serpentinae - Bourguignat	71
Stigotus - Al. Brong.	31		
amminatus - Al. Brong.	33		
Comus - Al. Brong.	33		
Crum - Al. Brong.	33		
palustris antiquus - Al. Brong.	35		
Strabulum - Al. Brong.	35		
gastri rosus -	35		
nigralus -	37		

Butinus pygmaeus - Brong.	Page	Butinus pygmaeus - Brong.	Page
pygmaeus - Brong.	37	pygmaeus - Brong.	37
pygmaeus - Brong.	37	pygmaeus - Brong.	37
pygmaeus - Brong.	37	pygmaeus - Brong.	37
Pygmaeus - de Brong.	39	Pygmaeus - de Brong.	39
Helix Ramondi - Al. Brong.	41	Helix Ramondi - Al. Brong.	41
Cocquii - Al. Brong.	41	Cocquii - Al. Brong.	41
Moroguesi - Al. Brong.	41	Moroguesi - Al. Brong.	41
Archiaci - Al. Brong.	43	Archiaci - Al. Brong.	43
Demaratus - Al. Brong.	43	Demaratus - Al. Brong.	43
Menardi - Al. Brong.	45	Menardi - Al. Brong.	45
Gyrogaster, uvidica g. uvidica -	45	Gyrogaster, uvidica g. uvidica -	45

globuleux, imperforé, conique de Descript.
trois tournaient les obliques.

*Spire brillante quoique altérée, composée
 de 6 tours convexes obliquement striés,
 le dernier plus grand que les autres, est
 renflé l'ouverture a la base et s'élargit
 sensiblement vers la bouche; sur un plan
 aplati à l'endroit de la cavité, a qui
 le rend légèrement quadrangulaire.
 L'ouverture est semi-lunaire, très oblique
 a la base et bien moins exsertue qu'elle.
 Brongniart ne l'a représentée dans
 la figure qu'il en donne d'après un
 individu en un seul qui n'avait que la base
 de l'apex.*

Hélix Moroguesi - Ab. Brong.

10

*Cesta fossilis, plerumque subglobosa, interdum
 subdepressa vel conica, imperforata, sulcus
 convexa, tenuissime, oblique regulariter
 delata; angustibus quinque, solum in sulcis,
 ultimo non angulato; apertura semi-lunari;
 labro reflexo.*



- 1810 - Brongniart - H. moroguesi - ann. du Mus. t. XV
 P. 379 - Pl. 25, fig. 7
- 1811 - ——— Journ. de phys. tome LXXII
 P. 416
- 1812 - Brard - H. d'orléans - 4^e mem. Journ. de Phys.
 t. LXXIV P. 252
- 1814 - Jussieu - H. moroguesi - mem. géol. P. 17, pl. 6
- 1821 - De France ——— Dict. Sc. nat. t. XX, pl. 6
 P. 445
- 1822 - Bowditch ——— Elem. of geol. Pl. 4, fig. 1
- 1824 - Deshayes ——— Descrip. du cog. p. H. t. II
 P. 54, pl. 6
- 18 ——— ——— Enc. méth. vers. t. II, pl. 6
 P. 6
- 1830 - G. Fischer - H. moroguesi - Or. géol. P. 18
 Moroguesi - 1^{re} edit. Pl. 18
- 1837 ——— ——— H. moroguesi ——— 2^e edit. Pl. 18
- 1854 - Deshayes ——— Mus. edit. de l'enc.
 t. VIII P. 197

— Eadem nomencl. adulta, ad huc junior

- 1810 - Brongniart - H. bristami, ann. du Mus.
 t. XV - pl. 379 - Pl. 25
- 1811 ——— Journ. de phys. t. LXXII
 P. 416
- 1812 - Brard - H. d'orléans, 4^e mem. Journ. de Phys.
 t. LXXIV P. 252
- 1814 - Jussieu - H. bristami ——— mem. géol. P. 17, pl. 6
 P. 54 - pl. 6
- 1821 - De France ——— it. it. - Dict. Sc. nat. - t. XX - pl. 6
 P. 445
- 1822 - Bowditch ——— it. Elem. of geol. Pl. 4, fig. 1
- 1824 - Deshayes ——— it. Descrip. du cog. p. H. t. II
 P. 54 - pl. 6
- 18 ——— ——— it. Enc. méth. vers. t. II, pl. 6
 P. 6

6
Pis. - *Caculus* de la *spèce de laquail*. *Palit.*
près de Carrières (Luch.) *et*

et *Marchal* près pt. du château (Luch.)

Stileans (Brong. Terr. - *Pyrene*)

2.

Monette près *Livore* (Brong. Terr. - *Pyrene*)
Amidies.

Commun dans les calcs. de la *Vivaguer*.

notamment à *Chapitrat* près d'ignaspe


a *Mat* au S. O. de *Gergovia*

près de *Marmande*, près *Veyre*

la roche *Blanche* etc. *Boissy*

Helix Archiaci De Boissy

12



Helix fossile, lisse, orbiculaire déprimée,
d'aspect convex; spira valde obtusa; sutura
linéaire; anfractus quatuor, convexiusculis,
ultimo basi tergitis; umbilico parvulo, sulcato;
apertura hemisphærica; labro marginis reflexo.

1853 - de Boissy - *Proc. Zool.* par la Soc. Linnéenne
1853 - *Fig.* 75

Hauteur - 8 mm.

Largeur - 12 mm.

Boissy

Helix - orbiculaire - assez fortement déprimée;
la spira pour cela même exaspée! obtuse, se compose
de 4 tours peu convexes dont le dernier
plus grand qu'les autres est très bouilli et déformé.
L'umbilic, souvent presque en entier par le
bord alvéolaire, est très petit; le même la-
cuneille est perforée. L'ouverture est
lisse lisse, le peristome assez fortement réfléchi.

Hel. -

Commun de calcs. et enclaves se trouve à une
grande hauteur sur le versant sept. de la
11^{me} route à *Poste-royal*, près *Boissy* (Luch.)
se trouvant immédiatement sur des porphyres argileux.

Helix Vialai de Boissy.



Costa ~~Gottli~~ ^{Gottli} li, lenticulari, irregulariter striato
multilocata, valde carinata (carina ad suturam
perspicua); spira valde obtusa; aperturæ
quintis, planis, luteo crescentibus, ultimo
aperturæ subter hinc impresso; apertura
semi lunari latus duplicata; peristomate hyaline.

1839, near de Boissy rev. 200. soc. helix. 1839
P 75

Heuteux = 4^{me}

Longue = 10^{me}.

Le qui caractérise cette espèce. C'est
2 plis situés sur le bord columellaire sur
gauche, qui s'inscrivent à une certaine profondeur
dans l'induration de la coquille et se traduisent
à l'intérieur par 2 sillons 2 approx.

Descript - forme lenticulaire, irrégulièrement flée,
ovale à l'apex, très fortement carénée, la
spira, très obtuse, se compose de 5 tours
plats, croissant insensiblement, le dernier
convexe en dessous, ouverture semi-lunaire
peristome replié.

Hab. - très rare dans les coll. de la collection
- d'Ang. (surtout).

Helix Potiezi de Boissy



14
 Testa fossili, orbiculata, subglobosa-depressa,
 subtus convexa; spira brevi, obliqua;
 angustibus quinque convexiusculis, ultimo
 maxime rotundato, ante aperturam gibboso
 apertura semilunari; labro reflexo.

14759, mont. De Boissy - rev. 200. soc. Paris.
 p. 45.

Hauteur = 4 mm

Largeur = 8 a 9 mm

Descr. orbiculaires, perfores, plutôt déprimées que
 subglobuleuses, convexes au dessous. La
 spire est courte et oblique, les tours légè-
 rement convexes, sont au nombre de 5 au plus;
 le dernier arrondi, plus grand que les
 autres à proportion, forme une espèce de
 bourrelet avant l'ouverture et comme
 le peristome est réfléchi en arrière, il
 en résulte une fente assez large qui suit
 entièrement la direction de l'ouverture et
 va se perdre dans l'oubliette avec l'échancrure
 du bord columellaire, lequel avance beaucoup
 plus loin que l'autre vers le centre de la
 coquille.

Aut. rare dans les cal. lac. de Castelnau-de-
 (Cande).

Coquille fossile, solide, globuleuse,
lenticulaire, imperforée, subtilement
imprécisée, quinqué, convexe, ultime tour
rotundato; ouverture semi lunari, valve
oblique, peristome ample dilatato,
expanso, sub involuto.

1435 - mars - de Boissy - rev. Zool. Soc. Lav.

hauteur = 10 à 20 mm.

largeur = 15, 25 et 30 mm.



Derrière. Coq. fossile, solide, globuleux, lisse, imperforé,
convexe en dessous; spire composée de
5 tours unies, séparés par une suture
très prononcée, le dernier angle est très
arrondi; ouverture semi-lunaire, oblique,
le peristome ample dilaté, se repète
en arrière et dépasse de beaucoup le dernier
tour comme dans l'*H. Sarcostoma* Webb.
avec laquelle cette coquille a
le rapport de ressemblance.

Le peristome est ainsi dilaté et recouvert
dans les 2/3 de sa base dans l'*H. Lartetii*
sur angle plus obtus avec l'intérieur
du dernier tour.

En général de même taille, cependant
les plus gros Lart. sont plus gros que
les plus gros Sarcost.

Quoique les fautes sont les mêmes, les
différences sont évidentes par l'ouverture
et par le recouvrement du peristome
qui ne se fait pas sous le même angle.

Hel. fossile de Boissy.



Cesta fossile, orbiculata, subdepressa, umbilicata,
spina brevi, obtusa; anfractibus posterioribus
quibus, levibus, ultimo rotundato; umbilico paulo
rotundato, subrecto, apertura suborbiculata,
fossilatae subcontinuo reflexa.

1479 - mar - de Boissy - rev. Zool. soc. Paris.


Hauteur = 4 mm

Largeur = 9 mm

Descript. orbiculata, subdepressive, umbilicate
concave en dessous : la spire, antérieurement
de consistance de la à 3 tours lisses, le dernier
arrondi ; l'umbilic est unguet, avant
noir, à peine recouvert par le bord
columnaire ; l'ouverture est suborbiculaire
les bords presque nus ; la fossette réflexe.

Obs. pourrait peut être se comparer à *H. politula*
révante, mais non pas à des fossiles.

hab. Eau douce pres. Albi (Tarn) Rb.



Testa fossili, globosa, fragili, irregulariter
 striata, umbilicata; spira brevis; aperturas
 quinque, convexae, ultimo aperturam ultimo, aut
 aperturam sextato; apertura sub-umbilicari,
 extrinsecus per murum umbiliculi circumdata
 peristoma reflexo.

1839 - De Brissay - rev. Zool. Soc. Linn.

Hauteur = 8 mm

Largeur = 13 à 14 mm

Descr. Globuleux, extrêmement fragile et irré-
 gulièrement strié; la spire est courte et
 la suture, si ce n'est qu'elle separe les tours
 de la suture, les tours sont convexes et arrondies, la dernière globuleuse
 à sa base extrême et un étranglement en forme
 de canal qui longe extérieurement l'ouverture
 et se perd dans l'orbiculaire; l'ouverture
 est sub-umbilicari, le peristome reflexe.

Lab. très rare dans les marais salés.
 de la montagne de Henneville, près
 (Grenay, Maine).

VI - 2 ^e d'ancien terr. d'eau douce	{	multicoles sup ^{res}	(calcs de Beaumont)
V - 2 ^e terr. marin	{	calcs de Fontainebleau	
IV - 2 ^e terr. d'eau douce	{	marais verts	
	{	gypse	
	{	calcs de St. Omer	
	{	calcs de Breuille	
III - 1 ^{er} terr. marin	{	calcs gross. sup ^{res}	
	{	inf ^{res}	
II - 1 ^{er} terr. d'eau douce	{	argiles plastiques	
	{	conglomérat de Beaumont	
I - ancien terr. marin	{	calcs - fragments	
	{	craye	

Le Ly d'ancien d'après quelques fossiles
 dans le bassin qu'on voit par exemple dans
 la 2^e terr. d'eau douce, on trouve des fossiles de la 1^{re} terr. d'eau douce, et dans la 3^e terr. d'eau douce, on trouve des fossiles de la 2^e terr. d'eau douce.

Il n'y a en marin à l'ouest.
 La 1^{re} terr. d'eau douce est beaucoup plus
 petite et dérivée de la 1^{re} terr. marin.
 Brongniart sur la 1^{re} terr. d'eau douce, on trouve
 beaucoup de fossiles de la 1^{re} terr. marin.

— tome XV —

Brongniart -

Description des fossiles qu'on trouve
 dans les terrains d'eau douce


19
 — Description des Epones —

Cyclostoma elegans antiquum Abl. Brong.



Moules dans un cal. grésiste assez dur
 dans la forêt de Fontainebleau sur
 la plate de la table du grand maître
 et dans un cal. marneux très tendre
 dans, par M. Menard la groye.

Cyclostoma munitia Lam. — ann. mus. t. IV



Melania effilia - Brand -

M. Brongniart pense que les *Cyclostoma*
 ne sont en fait qu'une seule espèce, et que
 les *C. elegans* et *C. munitia* sont
 les mêmes. La *C. elegans* est plus
 grande que la *C. munitia*, mais
 se rapproche de la *C. munitia* et
 Brongniart ne le croit pas qu'il y
 ait de la différence.
 Les *Cyclostoma* sont plus communs
 dans les terrains d'eau douce que
 dans les terrains marins.
 La *C. elegans* est plus commune
 dans les terrains d'eau douce que
 dans les terrains marins.

dans une même calce. et s'enclent
 gris, rouge, qui se trouve
 locale. marais pres de grignon et qui
 se trouve des hyraces.

Pres de vaucluse (n° 599) seules sautes du même genre (ou
 de même) a la porte dite monique douris. Sauf les f. et du calce, des sautes
 (n° 600) se trouvent le même de sautes. des sautes. se trouvent les sautes
 de sautes. Sautes. Le saute est saute. se trouve est saute. est de sautes
 se trouvent des potamides au sein des sautes. et des sautes.

Genre Potamide -



Pot. Lamarckii

Laquelle se trouve, ouverte presque dans
 l'aperture, comme si elle était à la base de
 la columelle. et se trouve par un canal
 droit très court qui est à peine saute,
 joint de sautes à l'extrémité supérieure
 du bord droit, mais la saute externe
 n'est pas.

Le genre est saute plus ou moins
 habituel de sautes, qui habitent
 les sautes marais et l'habitation des
 sautes, qui se trouve se trouve qui se trouve
 dans les sautes, qui se trouve par sautes
 de sautes. Les sautes se trouvent dans sautes
 se trouvent se trouvent se trouvent se trouvent
 se trouvent se trouvent se trouvent se trouvent

Pot. athurum - Brug. n° 18 - List. tab. 115.
 sautes sautes - sautes sautes
 sautes sautes, sautes sautes
 des Pot.

Pot. palustris - Brug. n° 19 - List. tab. 85.
 sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes

Pot. muricata - Brug. - List. tab. 121.
 sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes

Pot. moluccanum - Riss. Gm.
 sautes sautes sautes sautes

Pot. pulchra - Linn. - Gm. sautes.

Potamides Lamarckii

Pot. tuberculatus - Brand -

trois sautes sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes sautes
 sautes sautes sautes sautes sautes

ressemble beaucoup au *Can. radialis*
figuré par Lister au milieu du coq. flab.
ressemble aussi au *Bul. auritus*. Bruguier
qui est dans l'intérieur de l'épique.

Il trouve aux env. de Paris dans les têtes
craquelées qui remontent à la descente du *Bruguier*
de la vallée de la Seine.

Elle y est accompagnée de *Lymnaea* nautilus
de *Lymnaea ovata*, de *Glyptostoma* et de
tiges grêles, cylindriques et vertes.

Les morceaux qui ressemblent des têtes
et des coquilles ne paraissent pas contenir
de fécule.

Forêt de Montmorency au dessus de *H. Roux*
aux saules.

Dep. du Cantal, calc. et de la colline de
S. et d'austral. (avec *R. Roux* nautilus)
grands *Planorbis* communs et des *Liges* de *rouge*
noir et reconnaissables.

Dep. du Puy de Dôme, à Montet près
Lezoux, calc. compacte, folie sable
comme celui de *Château-Randon*.
accompagné de *H. locquii* voisin de *H.*
nautilus.

hab.

Planorbis Rotundatus - *P. parvulus* - *Brard* - 75

21



spèce qui a de grands rapports avec
le *Planorbis* conic, en diffère par les bords
de l'aperture qui sont plus cylindriques
qui diminuent plus graduellement de
profondeur, en sorte que la coquille est
moins haute sur chacune de ses faces que
celle des *Planorbis* conic.

5 tours de spire.

M. Bruguier dit qu'il y a deux variétés
qui se distinguent, l'une des autres.

Var. A. — grande, se rapproche du *P. conic*
se trouve dans le *cantal*, près d'*austral*
et dans le *puys de Dôme* près d'*austral*
on trouve une autre variété, encore
plus grande et qui présente absolument
le volume des tours de spire et les
mêmes proportions linéaires qu'il faut remarquer
sur les individus les mieux conservés de
P. conic.

Var. B. fig 5. plus petite et la plus
grande ressemblance avec le *P. conic*
hab. — milieu près Versailles, *Palais* aux
forêt de *mont morency* sur le terrain de
la colline de *Brard*, dans les vallées
d'un côté, de plateaux élevés
dans le *calc.* d'un côté de la forêt
de *Fontainebleau*.

26

27

22



Ha beaucoup de secondaires en la fin

Se trouve avec l'espèce précédente.

2



hal - si l'on y a de l'eau douce près de l'alambic
tout noir.

Fig 76 - vue du moule intérieur

appartenant à la seconde formation d'eau douce.


28
Glanorbis Lens - D. Lenticille M. Brongn.

Pl. angulosa ? - Brard


Descrip. Plaque plutôt bombée et lenticulaire
qui s'ovale; de au plus le tiers de
sphère.

Cette espèce diffère beaucoup des
Plauris lenticulatus mais de la plus grande
rapport avec le Plauris complanatus Duf.

Lab. marneuse de la rue Rochelhommes
et de Belleville.
marne blanche qui recouvre le gypse
à l'autre et à la suite d'anciens
et parait appartenir à la 1^{re} formation
d'un d'ancien etc.



Lymneus Longicatus - *Pygmia affili* - Brard



Descr. - Le *Lymneus* des tours de Spire pour
celui-ci, ce qui le rend plus long que
les autres; la bouche est ovale et
allongée.

1^{re} formation d'eau douce dans les puits
de Bellin-la et de la ville de Rockebourne
et à 1st Ouen.


Lymneus Strigosus - Ab. Brongniart.



Descr. - Ressemble beaucoup au précédent; mais
mais quoique plus allongé que les
Lymneus communs, il est moins que le
Lymneus Longicatus, et présente
sur le bord columellaire de la bouche
un petit renflement qui nous avertis
pas remonter vers le précédent.

Ab. - Trouvé d'eau douce de 1^{re} formation.
Pantier - marais blancs - marais
de gypse.

Lymnaeus acuminatus - Ab. Brong. - *Lymnaea* Ponslet




Les tours de spire de cette espèce sont
très-prolongés et coniques; la spire
longuement de 6 tours est allongée et
pointue, mais le dernier tour est très
large et le pli de la columelle fort
marqué.

Le trou dans le bœlle renferme le
pied marin inf. à *Pierrelai*, et il
est quelquefois mêlé avec les coquilles
Marines de ce genre.

Provenant de Ponslet qui s'appartient
à la 1^{re} section d'eau douce.

Lymnaeus Cornutus - Ab. Brong. - *Lymnaea* corni




Le *Lymnaea* a 10 tours de spire au plus
le dernier très-grand et rugueux.

Le tour antérieur n'est pas dilaté et les tours
s'accroissent extrêmement
est mince, strié, noir, d'un lustré
corné. Les tours n'ont pas de
le bœlle de la plupart des coquilles fossiles
restent ordinairement à l'air.

Seux de *Milou* et des hauteurs de
palais, avec beaucoup d'autres coquilles

terrestres et d'eau douce. S'appartient
donc à la 2^{de} section d'eau douce.

Lymnaeus ovum - Ab. Brong. - *Lymnaea* ovale.



Lymnaea général. Fossile, un peu ridé
Six tours de spire, rugueux au

La *perce* Dr. mais est moins rugueux
et a plus de tours de spire que les
sables de *Pierrelai*.

26




Il n'y a entre l'individue figuré ici et le *L. palustris* actuel qu'une très légère différence de forme; et quelques racines seules sont même descriptives qui et n'indiquent, quoiqu'un peu, une plus grande fossilité. Il n'en sera cependant le même de l'époque, et il n'y a point de marais en ce lieu.

fig 19. B - bout du *L. palustris* vivant

Cette espèce rare paraît cependant par ses grands nombres de coquilles devenues si abondantes dans les débris.

Limneus subulum - *Limneus T. verolle*




elles sont... n'a que le tiers de l'épaisseur le dernier très grand; l'apex court et pointu: l'ouverture n'a pas les $\frac{2}{3}$ de la longueur de la coquille.

Le fossile ressemble beaucoup au *L. pinguis* habit. - mais il est de la forme de formation et de la taille, dans la forme de son ouverture au dessus de l'axe, en un mot, tout est si différent.


Limneus ventricosus

- *Limneus ventricosus* -



forme toute différente des précédentes, la base de l'apex plus arrondie, l'apex court et pointu, le tiers de l'épaisseur le dernier très grand; l'apex court et pointu: l'ouverture n'a pas les $\frac{2}{3}$ de la longueur de la coquille. Elle diffère de la précédente en ce que la spire est beaucoup plus courte, et que l'ouverture est plus grande que les $\frac{2}{3}$ de la coquille. Elle diffère de la précédente en ce que la spire est beaucoup plus courte, et que l'ouverture est plus grande que les $\frac{2}{3}$ de la coquille.

Limnaea inflatus 27.



Limnaea reuflei

forme différente des précédents, les tours de la spire plus arrondis; ressembla beaucoup au *Lymanea ovale* de Deshayes.

L'ouverture est à peine plus grande que la moitié de la coquille.

Très commune dans les rivières du terrain d'eau douce au dessus de St. Léu, à Sauris, etc.

Bulinus pygmaeus - *Bulime pygmée*. Brach.



Longue en arête antérieure, 4 tours de spire. Spire finissant en parallélisme au bord de la bouche.

Le tour avec son tet noir et luisant dans les filons dans ceux de l'Alsace; se trouve aussi dans toutes les rivières d'eau douce de tout mon pays etc.

appartient donc à la 2^e fonction d'eau douce. M. Menard le trouve à tous les jours dans un état d'eau douce souvent assez dur et qui ressemble des *Lymanea* car il a un petit bulime qui ressemble parfaitement à celui et même en plus petit. Et parait avoir son ouverture moins hautement et enroulée sur la columelle.

Bulinus terebra - *Bulime vis* —



Plus gros que les précédents, conus et réuple. Sommet obtus et comme tronqué.

4 tours de spire légèrement finissant en parallélisme au bord de la bouche.

Abondant dans les filons de Fontenay sur Loir près de Vincennes et de Quincy près de Meaux. D'origine n'a pu être vu avec son tet et la bouche.

appartient donc à la 1^{re} fonction d'eau douce.

Bulimus pusillus

Bulime nœvin

28

assez allongé — 6 tours de spire.
 Les 3 avant-derniers sont à peu près
 d'égale grosseur; le dernier est subitement
 gros ce qui donne à cette coquille une forme
 assez remarquable et la fait ressembler au
 B. lineatus, Dejean.
 hab. — Mares d'eau douce de St Omer
 et par myriades; on en a de Mersin
 — Aubusson.



paraît appartenir à la 1^{re} formation d'eau douce

Bulimus atromus

Bulime atome


ne que 4 tours de spire —
 plus renflé que le Bulime pygmaeus
 plus conique que le précédent ce qui empêche
 Brongniart de le considérer comme une
 jeune individu de Bulimus lineatus.
 le trouve avec le Bulimus pusillus de
 St Omer.



Pupa DeFrancii

Pup. Maillot de DeFrance

5 tours de spire. Diffère principalement
 de la pupa de Maillot à 4 dents qui en a de
 6 à 7.
 La bouche a une dent en plus; ce qui
 lui donne la figure d'un trèfle.
 Elle a été donnée à Brongniart par M^{re}
 DeFrance qui l'a trouvée à Melon avec
 des P. striatulus, Lymnaea conspurcator.



Helix Ramondi = Helix de Ramond.

47



29

Cette grande helix n'a que 4 tours de spire
le dernier s'élargissant vers son détroit
vers la bouche. C'est la coquille des
Carmichaelines fines.
O quelque rapport avec l'*H. gattulata*
Oliv.



Se trouve dans les marais calcaires durs,
nâtes par couches ou par fragments brisés
dans le tuf de Wâke, en France, de l'état
de l'Est du châtillon, près Châumont.

Parait se trouver aussi au Montebasane
près Orléans, depuis les empreintes que
Brouquier a remarqué dans des calcaires
envoyés par M. Bigot de Morogues.

Helix Cocqui = Helix de Cocqui.



Moyennement plate,
à 1 1/2 tours de spire assez exactes,
cylindriques et margées de stries régulières
parallèles au bord de la bouche.
Se trouve à Venette, près d'Yverdon dans
un calcaire dur et même assez compact pour
servir à la polir; elle y est accompagnée
du *Potamides Ramondii*.

Brouquier pense aussi depuis quelques
empreintes qu'il a remarquées sur des
pièces calcaires que M. Bigot de
Morogues lui a envoyées, qu'elles se
trouvent aussi aux environs d'Orléans.

Helix moroguesi = Helix de Morogues =



4 tours de spire; presque orbiculaires
sur le dos.

Se trouve aux environs d'Orléans aux
d'Helix lui-même.

Remarque au sujet de la Helix des environs de Chartres qui a été envoyée
à B. par M. l'abbé Bigot sous le nom d'*H. cristata* et qui est
bien voisine de l'*H. cantabrica*.

Helix Bristani = Helix de Bristau. 13

30



presque orbiculaire, avec une carène
sur le côté qui ne paraît qu'une
saillie du dernier tour de spire.
Elle est lisse et les tours de spire sont
peu séparés les uns des autres et peu
convexes.

A beaucoup de rapport avec l'Helix
Cinctella Drap. laquelle a $8\frac{1}{2}$ tours
de spire. Les resques se trouvent dans
le calcaire de la route de
Mithivieri, à 3 lieues d'Orléans,
elles y sont accompagnées de planorbis
qui paraissent appartenir à la var.
B. de P. rotundatus.

Ces 2 derniers espèces ont été trouvées
à Brongniart par M. Bigot de
Morogues.

Dans ce même calcaire il y a une Helix
globuleuse plus petite que la Morogues
plus grande que la Bristani et n'ayant
pas d'autre la carène de Bristani, Bristani
Brongniart n'a pas trouvé de caractères
suffisants, sur les autres il n'en a
conservés qu'il a vu pour en faire une
espèce particulière.

Helix Lemani = Helix de Leman.



ressemble assez à la Locqui; plus
bombée cependant.
Le dernier tour de spire comparé
aux autres est volumineux,
paraît aussi moins étroit;
embellie.

hab. dans les siles d'eau douce de
Palaisseau. par conséquent de la
2^e formation d'eau douce.

32
4^e Les tiges splendides, peries d'un
Rural central a deux ou trois rangs et deux
les joints sont peries de fines tubuleuses
parallèles au canal du centre. a long
A Longjumeau ou les bois, au sud de
Cogn. d'eau douce, pressés de deux côtés.

5^e épi d'une fente pourrait se multiplier
à certaines espèces de papillons, inférieurs
ou ceux des sites de Stallion.
Longjumeau.

6^e Bâges articules, à articulations dentelées
ou 10^e - mammelons à couronne arrondies et
saillies entre les articulations; à gorges
avec une saignée d'équidistance. dans
les sites de Longjumeau.

7^e grames ovales, fides, sites
de Longjumeau.

8^e - grains glandulaires caules.
de forme remarquables; ne peuvent être
supportés depuis M^e Couron et autres tubuleuses
d'un genre commun; l'aspect des antennes
dentelées en les comparant à des barres
et insectes.

9^e - sites opaques de Longjumeau, paléocaux
Villégiers, Villiers près Pontchartrain
Chapelle Melon puis chevrons.

10^e - sont accompagnés de hyméres, blanches
pupes, tubuleuses, bois, fides, mais ne
peuvent jamais dans le corps du bois.
(comme les autres M^e de France)

11^e - Corps en forme de dattes avec
Circulaires d'incises, sur la partie qui
pourrait être. Pour être connu la réunion de
à cette lésion, si ce corps était une femelle
analogue aux autres, et surtout aux autres
d'été, formes de l'automne.

12^e - bruns dans un état. gris, d'eau douce
13^e - compacte visible de petites cavités.

14^e - en forme de petites lésions. Couron
de Chaudes près Bois le Roy. au sud
de Meuniers (Chaudes Jan M^e de Montloup)

15^e - Les mêmes, gris de Longjumeau ou
trouve des cavités dont les parois sont
remplies de petites arêtes blanches qui paraissent
avoir été déposées après la mort. On y trouve
aussi de petites cavités, allongées canaliculées
Les points d'incises s'ils se trouvent par art. inter
tiges, sont caractéristiques pour les Prognostics les
rapports à 9^e et 10^e.

Prunier ar. (Rosier¹ Br. - jardi) trouvé en traversée (p. 378) sans
aider naturellement avoir été mes remarques le terrain se déplace.
Il ne connaît que M^e Riquier qui en ait fait une fois l'essai avec
Prunier ar. avant remarquer que les cop. des deux l'essai de mesurer les
étaient d'eau douce.

[illegible]

+ M^e Mauard la Grappe. a recueilli plusieurs espèces de vég. d'Amérique dans son calce. tant d't maraîche tant d't folide qui abondent en l'Amérique. Les canchlos a une fleur l'année des mares entre la forêt, et la route d'Alajuela sur la droite du cotez nord, presque vis a vis le village nommé le Rio de Oruelles. des Echantillons de ces calces. se trouvent au lycée de l'Université de Longueville des l'œuvre des plantes humides au Longueville. Vis. l'œuvre comme pectine de B. pygmaea. et l'œuvre 99. Felix Mauard et des empreintes qui paraissent être celles de C. Minima et d'un C. nigra antiqua. Un autre échantillon de

[illegible]

(cat. des log. européens.)

appartenant au groupe du Pomatina, ligata et

H. Pomatina Rims.

Habit. qu'il nord de l'Europe.

Ne se trouve pas en Espagne, Turquie
dans le midi de la France.

H. - orisicoum B.

montagne.

H. - laurica Kagnicki.

Russie-Crimée - Caucase

H. - Buchii - Durbni

transcaucas. russ.

H. - Schaffli Mours.

Turquie d'Europe

H. - laurica - Linn.

Italie - Hongrie -
Turquie d'Europe, Russie S.

H. - planicosta Brignaut
(Naples, Calabres)

H. - mahometana B.

Constantinople

remarque importante à l'H. laurica

remarque plus oblique non
ovale arrondie, point très peu
refléchi vers le bas, plus épais
sur le côté plus petit, plus étroit

H. - ligata Müll.

Dalmatie, Turquie d'Europe
Russie S. - etc. de l'Europe, Asie Mineure

et c. - même la H. - de

groupe ligata -

n° 5 - 1857

= Amenités Malacologiques =

LXIV - Du G. Cargyhiu par M. Bourguignat

- Cargyhiu fossiles -

Les Cargyhiu ont fait leur apparition
dans les couches tertiaires et quaternaires de l'Europe
paléogène pour atteindre leur maximum de
développement à l'époque actuelle.
elles n'ont été trouvées que dans les roches paléogènes
et le tertiaire. on ne les connaît pas de l'étage
plus récent ni de la quaternaire et quaternaire.

Dans les formations tertiaires on trouve :
Cargyhiu eumierum
- antiquum
- nanodum
- mouletti

- Cargyhiu du Miocène -

Dans les formations miocènes on trouve :
Cargyhiu eumierum
- minimum
- vulgare

Cargyhiu Eumierum

1819 C. minutissimum Foss. et d'Ant.

Cargyhiu minutissimum Al. Braun

Natf. p. 149 1842

Bronn, Index palaeont. t. I p. 211

1848 -

Desca. - Ceta minutissima, cylindrica - elongata, vix
subtriangulata, fragili, sub lente tenuissima striata.
Infraorbitalibus 6. convexis, regulariter crescentibus;
ultimo $\frac{1}{2}$ longitudo vix superante; apertura
ovato rotundata in pariete aperturali prope
extremum marginis labialis, dentibus adornata,
peristoma simplici; labro columellari paululum
incrassato.

Log. d'un extrême petitesse, cylindrique, allongée,
fragile, presque lisse et unie d'un petit
point oblique orbiculaire à peine visible. 6

Forme de l'aperture un peu convexe et s'arrondissant avec
une grande régularité; le dernier surlapant
un peu le $\frac{1}{2}$ de la longueur totale. Ouverture
ovale, arrondie - unie, sur le paroi aperturale
vise l'insertion du labre exterieur, d'une denture
latérale peu convexe. Peristome simple non
épaisse; sans dents la partie columellaire.
Long. 1 mm - Largeur $\frac{1}{2}$ mm.

Lab. - se rencontre à l'état fossile dans les dépôts tertiaires
et tertiaires de Hochheim (Prusse) puis de l'Alsace
du Meuse et du Rhin ainsi que dans ceux
des environs de Neaples.



Carychium nanodeum

61

40



Testa obso-oblonga, ventricosa, paululum rimata.
fragili, striatula; apice obtuso; angustibus 5 convexis,
sutura valde impressa separatis; ultimo magno;
apertura pinniformi, lat. dilatata, pinnato-maculata.
aut, paululum incrassato; pinnis aperturæ prope
columnellam, denticulo valde, adornato; labra-
columnellæ ad basin autè minute tuberculifera.

Cog. obso, oblonga, ventricosa, fragilis, rimæ de pila
striis delicatæ et minus distinctæ sunt. orifici-
conus obtus. Sutura de pinnis convexis, separatis
per lineæ pinniformi, pinnis de, denticulo, pinnis de
ouverture pinniformi, apice de tota, de pinnis to-
per lobi et magis tenuis, pinnis de, denticulo, pinnis de
aperturæ pinnis, pinnis de, denticulo, pinnis de
denticulo, apice de tota. Columnellæ pinnis, a ta-
base et minus pinnis, tuberculifera, apice
Long. 1^{me} diam. 1^{me}

hab. - Schenckia fossile dans les couches tertiaires et
quaternaires de Wiesbaden (Meyner)

Carychium antiquum Al Braun, not. fr. p. 169-1848

Bonn, Ind. fossil. t. I p. 141 - 1848



Testa obso-oblonga, paululum rimata, fragili, lavi,
vel sub lavi minutissime striatula; apice obtuso;
angustibus 5 convexis, sutura impressa separatis; ultimo
magno; apertura ovato-oblonga; pinnato-maculata
et in medio lobi exteriori tuberculifera; pinnis aperturæ
prope columnellam, denticulo exiguo, adornato; columnella
tuba simplici.

Cog. obso, oblonga, fragilis, lavi, rimæ de pila
striis minutissime, et minus et minus pinnis distinctæ
sunt obtus. Sutura convexis separatis per lineæ
pinniformi, pinnis de, denticulo, pinnis de
ouverture pinniformi, apice de tota, de pinnis to-
per lobi et magis tenuis, pinnis de, denticulo, pinnis de
aperturæ pinnis, pinnis de, denticulo, pinnis de
denticulo, apice de tota. Columnellæ pinnis, a ta-
base et minus pinnis, tuberculifera, apice
Long. 2^{me} diam. 1^{me}

de l'écaille, mais le Carychium nanodeum, n'est pas
fossile dans les couches tertiaires de Wiesbaden (Meyner)

Le C. antiquum ne peut être rapproché que des
Carychium nanodeum, il en diffère par son orifice
plus oblong et moins défilé, ainsi que par la longueur
par la columelle, ainsi que par la base, par la base aperturæ
moins et plus défilée, plus petite et moins tuberculifera
par la base défilée, ainsi que par la base défilée, ainsi que
par la base défilée, ainsi que par la base défilée, ainsi que

Amnati malacologiques

Bourguignat - rev. or mag. de Zool. 1859. n° 12

Amnati malacolog. par

note sur la faune acropne
résidue de Cornues.

1860 t. II. 418

H. cornua - Linn. 1758 - n° 12

Plan. purpurea - Müll 1854

H. cornu - Müll 1854

H. cornu - Murch. 1859

cornu auct. - de Costa 1859

P. cornu - Linn. 1801

id. - Duf. 1801

Tab. - nord occident de l'Europe

a l'état jeune des cornues d'un

lég. d'éc. et de spir. et bas élargi

P. cornu de petites spir. longitudinales

lignes a angle droit par spir. sides

Murales également fines et délicates

les tours sont tous nouffés a l'aperte


sup. et sur conchines, vers leur base

de bas en haut.

P. cornu - Poir. 1801

di. an. 26 - 35

haut. 8 - 15



Plan. Etrusca Zingler 1801

habite le S.O. de l'Europe

se distingue des cornues par ses

tours de spir. parfaitement vides

et plus également en dessous et en

dessus et pas comprimé par les cornues

l'étrusca - cavité ombilicale plus

profonde en dessous et en dessous - d'éc. et

force proportionnel + plus considérable

ouverture plus large et plus étendue

Spir. hautot fines et régulières, tantot

plus chargées d'une foule de tubercules rectang.

longitudinaux et plus larges tantot

que chez le cornu les tubercules sont

moins nombreux moins réguliers.

non symétriques

P. Etrusca di. an. 30-40

haut. 13-15



Carychium Noulet - Bourguignat - (non C. minimum Muller)

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418

Carychium minimum Duf. - 1859 - n° 12. 418



Le plan - Elophtilus Donju - Plan. elophtilus - diam 28-40
épais - 12

N. 4 dans les cornes végétales de la
Crony, émané; il diffère de ~~C. crony~~

Par. la taille plus considérable
lourds de spire plus arrondie
non comprimés vers le bas
courbement descendant, plus
oblique, plus large que haute.
cubique surtout par la déflexion
du dernier tour.



Plan - Nordenskiöldi B.



Plan - Nordenskiöldi

Donju - Wi Gorg - la cadage
Lojo Ijo - Aguinan

Le distingu du cornu -

test plus finement strié, plus aplati
taille plus faible
lourds de spire l'accroissement plus vite
courbement plus oblique, impuissant descendant

Le dernier tour également descendant
et non comprimé autant par le
bas que celui du cornu.



Plan - anthracinus

(P. nigra.)

McKenz. test noir élégant
strié lisse, courbement
régulier - rotundité parfaite
des bords

Al. Panatensis

Plan - Panatensis

Hauger - Panat - bougluau

Le dist. du cornu:

test L.
test plus finement strié

lourds de spire l'accroissement
lourds de spire l'accroissement
non comprimés de bas en haut
courbement moins oblique, rotundité parfaite

Annale des Sciences naturelles = mémoire sur une nouvelle espèce de coquille
1828 — T XV Donju du genre ferussina (Gmel)
Strophodontes Park.



par m: Augustin Pefroy

42

Le genre Ferussina a été établi par Gmelin
pour un coq. des faluns de Sarz. Donju
La ferussina avostomaciformis
M. Dufrenoy n'en est qu'une variété à spire
Strophodontes que le nom sign. qu'il donne
P. laevigata et sur une autre de Bonville
P. laevigata. Donju avec m. Gmelin
qui est coq. sans plus de rapport avec les
cyclotomes qu'avec les avostomes.
Donju du genre Strophodontes de Dufrenoy. Stella orata glob.
opercula rotundata marginata, oblique, simple
dentée sur la base, surface rebordée - multiloc
plus minime magnus. operculum

Les 2 esp. ont le dernier tour arrondi infé-
rieur. est multiloc longuement incurvé.
Dufrenoy découvre un spire à spire adhérent
tour aplati et adhérent total double loc.
Cela n'est pas un multiloc qui n'est pas
les bords recourbés dans la phase de Dufrenoy
operc. multiloc plus minime rebordée; alagran
multiloc
Dufrenoy croit qu'il y a une espèce

Ferussina Lapidea Dufrenoy - Ferussina Lapide



Stella orata globosa, sub irregulariter costata
striata; apice obtuso; opercula superficiali
inferius depresso, multilocum oblique; limbo
multilocali eccentrico; apertura inequaliter
marginata; margine interius circulante.
Notato.
aperturam du dernier tour - apertura double
- multilocali eccentrico - apertura
reprise du dernier tour - apertura double vers le
plan du multiloc qui cause entre lui et les
autres une disproportion qui donne au multiloc
de la spire une aspect irrégulier.
lourds de spire l'accroissement finement strié
- apertura simple. Peristoma garni entier
des bords et l'accroissement finement strié à la
partie oblique de la spire. Strophodontes depressus
devenu plus minime sur le tour

Le plan. adelinus — plan. adelinus
marais de la Tosca

semble être peu profond en
l'eau. Connait au dernier tour
persistant en peu réfléchi.

lin

Helix Reboul — Helix de Reboul —



parait comme l'élouée de lignes arrondies
Placé sur son ouverture cette coquille se présente
l'apex d'une sautoie finie par un arc.
Longueur 15 mm larg. 15 mm.
Lab. près du pic volcanique de Poudonnet, à Volmangues,
Volmangues, près montpellier. dans un cal.
de couleur blanche, blanc opacifié, quelquefois
brunâtre, ou elle est accompagnée d'un petit
filament, de l'apex à l'ouverture et
de l'achèvement d'apex (ou d'elouée).
Le test de l'apex est opacifié en spirale.
L'apex est d'un blanc de ce cal. am. de l'apex.
M. L. Dumas a rapporté à Volmangues, près
la mer, un peu de ces mêmes coquilles.

Teste solide, subdepress, utrinque convexa, longi-
tudinaliter striata; apice obtuse; angustius
retundatis, apertura obliqua, ovali, coarctata
marginata; persistens incurvato, reflexo;
nudi lico nullo.
Spir. d'une taille moyenne, assez épaisses,
à peu près égales, convexes des arêtes, finissant
à l'apex; les tours de spir. arrondies, l'avant
dernier et le dernier plus de l'insertion sa-
bande dans une excavation conique; le dernier
de la spir. est obtus et lisse; la suture
est peu marquée.
Bouche petite, amincie d'un bourrelet sur-
retenu par un renflement du bord columelle.
Le bord columelle s'élève obliquement sur l'avant
dernier tour et tend à se rapprocher du
bord columelle qui est entièrement obtus,
persistant épais et réfléchi. nulle-
ment recouvert dans l'interstice de la columelle
la suture de l'avant dernier tour; le test
est change en spir. calcaire.

Long. 17 mm larg. 14 mm

gis. — fouveau à cause de l'apex, près
Pezinas (Hérault) dans un cal. blanc mar-
reux, d'un coulis misa de cal. pailleux.
Poudonnet de cette division des Planus
marais testacés (ten. test. quar. pag. 2)
appelé par M. M. de l'apex Cal.
Moellan. — assez abondant d'une calcaire
coulée seule.



Bulinus levolongus

Bulinus *perlongus* = *Doubie* = *sumy* = valve fort épaisse qui ressemble à celle des *clausilles* plutôt qu'à celle des *Bulinus*. *Sumy* a des *clausilles* d'os, *perlongus*, fusiforme, et très obliquement, enfin commun dans les classes. La forme columellaire est libre et saillante hors la coquille, et elle recourt les bords de l'ouverture. La longueur est plus de l'épaisseur. La le *perlongus* *Bulinus* fort.

Berlin

hab. Carrière de m^{rs} Nacheil^e près Carleu (Nord)
(quels) — puis Lt. Rogeli de Bouvill
(Hennaut) à la tête de volontaires dans un
cité. A combattu très courageusement qui repro-
visiblement sur la crête en 1847. (Bataille)
conduite / E. Dumas

Bulinus nuxia

Bulinus munia — Boulée — Linche presque arrondie et adu-
sset très épais dans toute la coq. — dextre —
large de 4 ponces — rappelle janssen fort et
la forme de la bouche, et *C. munia*.
Ind. — est élève dans — une pendule.

Cyclotoma formosum

Cyelas Toma Formosum = Boule = ne se rapproche d'aucune de
ses parents ; long. 32 mm larg.
29 mm. offre au comble quatre des
caractères suivants : angle de la tige 37°
angle d'inclinaison 78° angle latéral
d'ascend 115° angle de direction 75°
angle des fibres aux tubercules 95°
test fort épais - bouche anguleuse sap-
fortement rebordée presque dans le même
plan que l'axe de la coquille, ce qui joint
à l'allongement de la tige lui donne le port
d'une paludine. — Castelnau

Cyclotoma elegantissima

Cyclotoma elegans = Bonelli = very rare - la dis tingue les
toutes les espèces voisines du C. elegans
par ses toits de spires élargies, très peu
communes, et par ses sutures très peu
profondes
vécues par Castelnaudary

45
Helice nemoralis = ⁷¹Boubée = assez commune - se distingue de
l'H. nemoralis par sa forme faiblement
carinée, son test plus fort. ex l'absence de
carapactum du bord droit et l'angle de la
spire qui m^e Deshayes a reconnu pour être
la véritable caractéristique de l'espèce vivante.
Villeneuve -

Helice lapicidites = Boubée = rare - ressemble à plusieurs helices
mésocènes (Lamk) voisines de l'H. lapicida
plus grande - spire plus élevée - point
de carène distincte à la suture qui
peut ne pas exister, tant les bords
sont fondus l'un dans l'autre. - Stries
transverses très obliques - extrêmement fines.
Villeneuve -

Helice serpentina = Boubée = très rare - plus globuleuse
et plus régulière que l'H. serpentina
à laquelle elle ressemble.

Lymnaea ovalis Boubée - coquille très allongée et formant
un angle - ouverture très aigue - à
distinction facile du longiculus Brong.
Isbrow a vu les espèces précédentes dans les lacs
qui présente des cyclopes, planorbis, petites
Lymnaea, et une grande paludine.



Châssé qu'on voit sous les bas que le
reste de la coquille est surabondamment séparé du
bord columellaire; donne une presque aiguë;
ouverture très ample, pouvant à elle seule la
presque totalité de la coquille; profonde et
crescée en dessous jusqu'à la fin du trou de la
nautilus de la spire; arrondie en avant et
presque anguleuse à son extrémité postérieure;
bord externe, peu ou pas tronqué; bord
columellaire arrondi, sans être déprimé comme
dans nos espèces françaises.

Long — 6
Large — 3
Haut — 2

hab. — même anguleux — sous au.

Diffère des autres vivantes par la profondeur de la nautilus
qui lui donne un aspect beaucoup plus convexe
en dessus. Elle est en outre, beaucoup plus profondément
encavée; ce qui lui donne une forme plus ulcé-
rés testacelle caractéristique, beaucoup plus creusée
que celles de l'Europe, différents numéros
de la note par leur forme moins exserte et
leur ouverture plus régulière.

Dans les espèces françaises la P. de Mauge, la nautilus
supérieure par sa forme est celle qui s'en
approche le plus; mais la forme régulière et
la surface régulièrement et finement striée à
l'apex de la nautilus.

Helix Sansoniensis Dup.



Forma globosa sub conoidea, imperforata, vix
transmissa striatula, nitida; apertura obliqua
sub ovata, leviter, angustata, persistens et
reflexiuscula et acuto marginibus sub appropinquata;
callo nitido mutis; angustis bus quibus vel
textis convexusculis futura sat perspicua mutis;
apice obtuso.

Log. globulosa levemente conoidea, imperforata
mutis de striis non regularibus et bellis
nitidis quibus in parietibus quibus quibus la nautilus
luisant; apertura obliqua ovata, obliquis
parietibus leviter leviter et nitida; persistens
leviter leviter au bord externe; reflexus
bellis au bord columellaire; la nautilus
le plus long et le plus haut; la 6 tours de
spire levemente convexe et leviter par sa
surface ovale marginée; le dernier, fort grand
comparativement aux autres, est à la nautilus
blanche à la naissance, mais et indistincte
de la nautilus; le premier est obtus.

- Haut. - 18 20 20

Old' ann. — 22 " 4

hal. — id — Sanson.

Vendredi de l'H. L'autel de l'orgue - en differens
par la forme un peu moins globuleux, par
son enveloppe proportionnellement moins avante
et par son perritoire plus tranchant et moins
reflexe.

à ce genre se rapporte avec l'*H. nauralis*, qui
diffère par son arrangement des nervures et
plus retenu, comme aussi par son peristome
plus étendu et plus réfléchi.

La colonisation paraît avoir été entièrement analogue
à celle de l'Est néomexicain, car nous en avons
vu quelques fragments qui présentent des restes
de l'ancien et l'ancien en l'un, l'autre en
un autre et maintenant nous pouvons faire
une note sur ce.

Helice mignonne

entière. Souhaiter à l'espèce vivante si
abondante dans presque tout l'Europe et
l'Asie du nord. Il paraît avoir disparu de
plusieurs des départements de l'est.

Police collée — très rare à l'ausau. D'après
il n'y a remonte qu'en la semaine
pour présenter pas la moitié des différences au
d'été notata vivants.

Le coté assez profondément imprégné dans la
 27. forme de prononce de son épiderme sous
 une bande et recouverte raid ou de résine comme
 espies les H. costata et H. pulchella.

6. 1. 1898. on remonte à l'autre phlébotome
espèce d'Helice mais très rare car on n'en
trouve qu'une seule dans les déterminations
maintenant certaines, aussi allons nous voir
les autres.

Clausilia? Lartetii Dup. — *Clausilia? de Lartet* =

Nectia *hirsutior*, sub-*aplicata*, sub-*imperfata*,
apice *truncata*. *termiten* ex *fact* *regulariter* *truncata*
apertura *ovato* *papiformis*, *lamella* *superiore*
truncata *margine* *exterior* *parum* *appropinquata*
lamella *inferiore* *parum* *excursa*, *placis* *sub*
constrictis *via* *adultis* *truncatis* *sub*
quibus *accescentibus* *placis* *sub*
adultis *distinctis* *separatis*.

log. sensuelle, bul. cylindrique, presque superficielle
brunâtre au sommet, dans l'âge adulte, fissures
et arêtes régulières. Stipe; ouverture orale

Helix pulchella -



Helise Costata



Clausilia? Lartetii Dup. — *Clausilia? de Lartet* =



Cl. maxima geol.
Dors. - grand nat.

49



supérieure; l'anne supérieure médiane ou moy-
cloigné de l'angle du bord inférieur, l'anne
inférieure peu saillante et s'effaçant en
spirale dans l'intérieur de l'ouverture, plus du
palais et l'anne nule, ou du moins nous
n'avons pas pu en découvrir de trace; 8
lours de spire, dans les individus adultes et
trouqués; la troncation ne paraît, dans cette
espèce, ne représenter qu'un petit nombre
de lours; les lours supérieurs avant la tronca-
ture ont une forme conique à bords très
abtus, lorsque la coquille est défectueuse
trouquée, les lours sont aplatis, s'accroissent
à l'âge, s'élargissent et se bords se rejoignent
sans suture très distincte.

hab. — id. — Sable du pays de
ru le les qu'abstent de moule, ne peut s'en-
si ces ne clausure jusqu'à la fin de la
diastème du Clausure. Sable à quel-
fait d'ailleurs, c'est que la lamine sup. est
un peu éloigné du bord inférieur. Il paraît aussi
assez difficile à rapporter avec l'espèce au genre
Thyris spirose.

Si rapproche par la l'ail des clausure
d'ailleurs par Gualoupe et Conch. foss. de
l'ail. de l'ail. et de l'ail. (log. de l'ail.)
Mém. Soc. géol.)

Mais en de l'ail.

Dupa Lantetii - V. Dup. — maître de l'ail.



I

C'esta denture, forme, ovale, ventrale et inférieure
obtus, médiane, vie et trébuchet, striae médiane
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477

50



Pupa moulinsiana



Pupa antiveritigo

Pupa moulepians

fines qu'elles se font guère apparentes que
par une forte loupe, auventane transparentes
-aliments de la arctique, remuées, subgondai
dentées; une dent lamelle d'anne oblique
étendue à l'angle supérieur du bord interne
vers l'intérieur de la cavité ou est
suffisante; une autre plus ou moins
la colonne et à autres palatales arrivées
jusqu'au bord externe et dans l'inf. est
plus grande que la sup. 2; ces sont en
entre à autres petites dents placées l'une
entre la dent lamelle et la dent palatale
palatale inf., et l'autre entre les dents
palatals; jointures de dent ~~reflexes~~ et
approximées, bords assez rapprochés; l'inter
longueurs bords vers l'intérieur; à la
partie sup. 2. 4. 5 bords se joignent
concrètes, séparés par une suture très marquée
l'inf. 2 a plus grand que tous les autres
supérieurs.
haut: 2 1/2 à 3 mm
diam. — 2 mm

hab. — id —

Le dent moulinsiana de la section des ventigo
diffère des ventigo — assez abondant
(à la digne en la 1). se trouve un peu au
pupa anglica en diffère par le dent
lamelle, une dent oblique, tendre et de la
maîtrise anglaise, et ~~la pupa~~ ~~la pupa~~ ~~la pupa~~
Toujours, les dents sont plus ou moins plus
petites à côté de la 1. 2. qui ne joint plus
dans la cavité, qui est d'ailleurs plus étroite
et dans lequel le dent se trouve séparé de la 2.
de la 3. 4. tendre et de la 5. anglaise, il est
à peu la 2 de la haut totale.

— On ne trouve aussi de P. moulinsiana Duf.
l'un des temps, par la dent lamelle, une dent oblique
bords se joignent, et par le dent lamelle, de la
maîtrise de la moulinsiana. dans lequel de la 1. 2.
le dent lamelle est plus petit.

— assez abondant à l'ouest.
— l'ouest à l'est.

Duf. — Pupa ovale, angulaire, de l'ouest à l'est, rimée
vers l'intérieur; apertures sub-rectangulaires, sub-
dentées, dents de lamelle d'anne vers l'ouest
au bord externe, apertures ad angulum supérieures
sité, bords lamellaires et bords palatals
marginés extérieurement, sub-angulaires, jointures
bords auto et reflexes. marginales de la
approximées; apertures 3-6 convergentes

5^e lab. au les pincettes - R R R R.

à 99 rapporte au le P. trifid'onta Stud.
mais cette espèce de laque plus légère que
les dents palatals de la même espèce. L'autre
n'en a pas qu'une seule.

Payer Blairvilleana Duf.

I



Etage inf.

Est superposé au terrain à
dégrader aux environs d'Alise à
Luzerne et dans la vallée de l'Ardenne
et de la Somme.

Couche de marne rougeâtre - Marnes
grès poudingues à galets polygones
dont les uns viennent des calcs de
Vittelles.

Cet étage qui a 100⁰ d'épaisseur et un
contour pas défini.

appartient à cet étage.

1. Remarques remarque du contact des

2. Marnes et de galets grès d'Alise

et les galets qui forment la base de
la montagne d'Egrevilles.

Ils se paraissent dans les vallées de la Dure.

Pour le pays l'âge ~~se paraît~~ se paraît et.

1^{re} Canadelle elle occupe la base
de la montagne d'Alise.

3. Les poudingues calcs de Vittelles.

55

2
Terrain
Marnes
à
Gypse

Michaud - Description des Coquilles
 fossiles trouvées dans les
 environs de Montour d'Oron
 Lijou - 1855
 Soc. Lijou d'Oron - 1854

Liste des espèces dénommées d'après
 Michel Hauser (Oron)
 ex dévot par M. Michaud.

Costantia Deshayesi - Mich.

Helix Chaisi - Mich.

" — *collongesi* — "

" — *Maylesi* — "

" — *qualisai* — " (*glabris* var.)

" — *godardi* — "

" — *Amberti* — "

" — *laby mithriala* — "

" *Claudia* *Conveni* — "

Vertigo Dupuyi — "

" — *nigrida* — "

Valvata — *piscinalis* Lx.

" — *piscinalis* id. Mich. (an *V. depressa* 1854)

" — *conoidalis*

" — *marginata*

Carychium Delochei - Mich.

" — *minimum*

Succinea Boudleti — "

Planorbis *Chailletii* " (p. *stiracis* 1854)

" — *friscotinus* Moq.

pl. — *planulatus* Desh.

pl. — *lous* — Moq.

Paludina — *frui carinata* — Moq.

Cyclus norwandi Mich.

" — *Deshayesi* — O. Fust.

Lee. Clav. B's tout en genre ^{variétés} ~~variétés~~ ^{variétés} ~~variétés~~
sur sa racine pour 1 espèce en Portugal

Total 118 spec.

Castanea nuxii
H. barbuta.
Ampelis striata 3


monet - Pesc. moll. terre-fleur du Portugal.

Si monet pense que
les Succinea amplibia et S. pfeifferi
sont différents et d'espèces.

Après lui la pfeifferi se distingue
de l'autre par l'ovale régulier de
son ouverture, la crénelle des spires
et une demi tour de plus.

En l'absence d'un autre plateau
des caractéristiques de la S. pfeifferi
de nos moules les mêmes se reconnaissent
à l'inspection de l'amplibia.


Succinea amplibia
et pfeifferi



Succ. amplibia

Elle se distingue par sa forme allongée Succ. longicosta monet
la régularité et la reticulation de son
ouverture dont la peristome décrit une
courbe symétrique et parallèle à l'axe
de la coquille : ce dernier caractère
l'éloigne de l'amplibia dont la place
peristomale est oblique tandis que son
développement et le développement de la
spire permettent bien mieux encore
de la confondre avec la S. pfeifferi

L'examen des détails élargis encore
l'intervalle des tours de spire se
trouvant au bas de la suture et
formant un boudant aplati, arrondi
qui même par un vilain dessin
n'est facile mais sensible à l'œil une
obscurité à la loupe, les 2^{es} se
montrant sous la forme d'un corn
trin allongé. Le boudant est pointu.
Les stries d'accroissement larges fontent
montrées élargies sur le haut des
tours irrégulières. Le test est plus
épais que celui de l'amplibia et l'écail
très cassant.



Succ. longicosta

Succinea nitens monet

62



plus petite - se rapproche de la S. pfeifferi
quoiqu'elle soit plus
crasse et plus ventrée la columelle
régulièrement anguleuse des deux sur les
murs et blanchâtre par le bord foveola
del involution. Les 2^{es} tours de spire
sont tellement serrés que la coquille
est formée presque entièrement par la dernière
Vue à la loupe ils offrent l'apparence
d'un mamelon arrondi et à peu
près l'équivalent qu.


Suture nette, test mince, fragile
d'aspect finement et régulièrement strié
d'un jaune verdâtre qui la fait
distinguer au 1^{er} coup d'œil.

Succ. alberti monet diffère de l'alberti par

les caractéristiques du boudant
le boudant et l'écail de la
suture sont plus réguliers
et plus fins, test finement strié, épais boudant



Succ. alberti monet



Succ. alberti monet

L. quadrata 1489

TL




B. melleoformis

TL



Bul. pinnosus

TL



B. chinensis

TL



B. g. melleoformis

mod. cog.



Prope. antiqua

TL



Matheron

148

148

Bul. pinnosus

mod. cog.



H. galle parvula n. sp.



H. pium



H. d. belyi n. sp.



H. Mammota



H. michelevis



H. torus



H. m. belyi



H. m. belyi



H. m. belyi



H. m. belyi



H. m. belyi




H. m. belyi



H. m. belyi



H. m. belyi



Ph. gaudensis

Melania laurica

Ph. Bobolus

M. acicula

Melania trinitatis

Ph. wilsoni

Ph. perrinitoides

Ph. Gaudensis

L. aquensis


L. laticosta

Laur. laurica
except the Mel. laurica du gypse

Laur. affinis
L. laticosta

148

148 g^{es}



Mr. Andrew
Galloway

Matheron

148

148 5^{es}




Umb. curvata T₄

Umb. guineensis T₄

Umb. alba T₄

Umb. pul. nigra

Grindelia T₄




1. *Strophosoma tetrarivium*, W. Braun.
 2. *Craspedopoma utriculosum*, Sandb.
 3. *Cyclostoma bisulcatum* v. Zieten.

4. *Cyclostoma Turpi*, A. Braun.
 5. *Ponticulus labellum* Pionae sp.

6. *Helix subverticillus*, Scud.
 7. ——— *ead. var. stenotrypa*, A. Braun.
 8. ———

Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Neudner

A. Köhler lith.




1. *Helix Guldasti* Thoma.
 2. *trihyrcana* A. Brunn.
 3. *deplanata* Thoma.
 4. *subovata* Sandb.

5. *Helix purpurigera* Thoma.
 6. *crebrispinata* Sandb.
 7. *suboccidentalis* Sandb.
 8. *lunula* Thoma.

9. *Helix multicastrata* Thoma.
 10. *disculis* A. Brunn.
 11. *subsolida* Sandb.
 12. *expansilobus* id.

Wiesbaden Verlag v. Arnold & Neudner.


J. B. Kohn lith.



1. *Helix pomiformis* A. Braun.
 2. — *Mitella* Steen.
 3. — *Roberti* A. Braun.
 4. — *leptocylindrica* A. Braun.

- Wiesbaden, Verlag v. Neufeld & Vischner.
 5. *Helix subcylindrica* A. Braun.
 6. — *umbellata* Mül.
 7. — *umbellata* A. Braun.
 8. — *pupilla* A. Braun.
 9. — *pulviniformis* A. Braun.

10. *Helix inaequalis* Thoms.
 11. — *phacodes* id.
 12. — *sublaevicollis* Saviat.
 13. — *osculum* Thoms typus.




1. *Helix osculum* Thomsen var. depressa
 2. — *arvensis* id.
 3. — *Magnum* Desh. var. major
 4. — *ead.* var. minor

5. *Helix Magnum* Desh. var.
 6. *ead.* var. *spendulatomis*.
 7. *Helix delata* A. Braun

Wiesbaden, Verlag v. Kreidel & Niedner.

8. *Helix hortulana* Thomsen.
 9. — *oxysoma* id.
 10. — *subulacea* id.
 11. — *Ramondi* A. Bryn.

A. Kolb lith.






Helix globosus Sow.

370

B. costellatus


n 336



Bulimus costellatus Sow.

B. ellipticus

n 339



337

Bul. ellipticus Sow.



Pl. emarginatus Sow.

Pl. emarginatus Sow.



Pl. cylindricus



P. radiatus



Planorbis canaliculatus Sow.

Pl. equalis Sow - p. 140



P. levis



Pl. levis



P. tenuistoma

Pl. tenuistoma

Pl. obtusus




P. obtusus



Lymnaea columellaris

Lymnaea columellaris p. 326



L. maritima

L. maritima




angulus *angulus* p. 333 1
Dow.



L. pyramidalis Dow

L. pyramidalis





		Familles	Noms des Genes
Ordre 1 ^{er} Conchifères Dinomyaires	1 ^{re} section coquille grosse et un peu de plus ou moins de plus ou moins de plus ou moins	Conchifères massifères	Cubicolles — <i>Cyprina, Barygaster, Pecten, Cardium, Venus, Mytilus, Pectunculus, Cardium, Venus, Mytilus, Pectunculus</i>
		Pholadaires	Pholadaires — <i>Pholade, Gastrochaena</i>
		Solenaires	Solenaires — <i>Solen, Panope, Glycymeris</i>
		Myaires	Myaires — <i>Mya, Anadara</i>
		Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>
	2 ^e section coquille reguliere et un peu de plus ou moins de plus ou moins de plus ou moins	A. ligament interieur	mastracées — <i>Palmaria, Mytilus, Pecten, Cardium, Venus, Mytilus, Pectunculus</i>
		B. ligament exterieur	Nymphaeées — <i>Mytilus, Pecten, Cardium, Venus, Mytilus, Pectunculus</i>
		Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>
		Pholadaires	Pholadaires — <i>Pholade, Gastrochaena</i>
		Solenaires	Solenaires — <i>Solen, Panope, Glycymeris</i>
Ordre 2 ^{me} Conchifères Monomyaires	1 ^{re} section coquille reguliere et un peu de plus ou moins de plus ou moins de plus ou moins	Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>
		Pholadaires	Pholadaires — <i>Pholade, Gastrochaena</i>
		Solenaires	Solenaires — <i>Solen, Panope, Glycymeris</i>
		Myaires	Myaires — <i>Mya, Anadara</i>
		Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>
	2 ^e section coquille reguliere et un peu de plus ou moins de plus ou moins de plus ou moins	Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>
		Pholadaires	Pholadaires — <i>Pholade, Gastrochaena</i>
		Solenaires	Solenaires — <i>Solen, Panope, Glycymeris</i>
		Myaires	Myaires — <i>Mya, Anadara</i>
		Corbules	Corbules — <i>Corbule, Pandora</i>

Paleontologie

Terres Verticales

Louis Lartet

173

Maclure
h. antiope 6
p. Malina 7
M. laurica 8

p. - ranci 27° — 1 27/146
Lunde 29 148 a. 198

exp. 5 1 a. 2 h

7 h du soir
sur les bords de l'eau 78

trou - 27
fontaine

