

Castle - 1871
St. Louis

Donkey



80

Castle -



Brugantherum pulchellum?

N. Lartite met par les yeux de la Société un certain intérêt
à grand honneur pour le monument érigé par M. Rebou, dans les
pâturés ou alluvions quaternaires de la Seine, près du Village de Lavallée.
On fait que ces alluvions ont déjà fourni à M. Rebou l'autre
moment après nombreux de mammifères fossiles, ainsi que des silex
très-présentés par lui ¹⁸⁶⁶ par M. Gaudy dans le journal de
la Société. 17. Qu'on donne un vote pour l'envoi à la Société
par M. Darchev.

La dent de saumon dont il s'agit aujourd'hui, bien
qu'à peine entamée par la détrition est néanmoins plus
forte en divers sens de dimensions qu'un homologue dans nos
plus grands Cétacés vivant ou fossil. pour en mieux déterminer
les caractères spécifiques, on en a fait le copulatum de W. Reubny,
un fétion transversale ~~très~~ peu près à mi-hauteur du fût de la
couronne & pour à pourvu constater qu'en ~~un~~ ^{un} ~~degré~~ ^{degré} ~~de~~ ^{de} ~~degré~~ ^{degré}
les plus entamés de l'émail extérieur aussi bien que les fentes
~~dentaires~~ curvilignes de la couronne ^{présentent} une disposition distincte
de celle qui se montre dans la dent au même ^{degré} ~~degré~~ ^{degré} ~~degré~~ ^{degré}
Les Cétacés proposés être ; par les mêmes détails de structure la
dent trouvée par W. Reubny se rapprochant bien davantage de son
homologue dans le Trogotherium Cuvieri de Fischer & Walbaum

On peut que le grand Bougeon fût une curvité
avant parfaitement présente les affinités génériques avec les centons
autres, a été obtenu le premier fois sur la base et le
sur l'axe, dans un objet simple dont l'âge ne
peut être par lui suffisamment défini. On l'a vu après non moins

De ce même long ont été dérivés en anglais dans le forest-bird ou forest-bird-manner
proprement de Norfolk. M. Owen a décrit et figuré deux
machines à vapeur à Cromer. Depuis lors j'en ai vu plusieurs d'un autre
à nombre d'autres bien déterminées dans la collection de Mr. Webb King,
de Loughborough & James T. Wright, avec qui j'en ai vu une de Mr. Fitch, à
Norwich. En 1853, j'ai également vu une machine à vapeur dans la collection de Mr.
de la fin de la collection de Mr. de la collection de Mr. de la collection de Mr.
autres de la même époque. M. de la collection de Mr. de la collection de Mr.
à l'École de Mines de Paris où il a été vu après l'Exposition de 1855, et c'est
l'après l'Exposition de 1855. M. de la collection de Mr. de la collection de Mr.
figuré la fin de la collection de Mr. de la collection de Mr. de la collection de Mr.
diversité (dans l'illustration de diversifier les machines de la collection de Mr. de la collection de Mr.)
(un & deux).

Outre les variations de dimensions que l'habitude peut présenter dans
les plus grandes espèces de l'ordre, qui se manifestent, certaines particularités de structure
dans les machines de l'ordre de la collection de Mr. de la collection de Mr. de la collection de Mr.

Astère fœtal

Dans le tibia de *Platyphloe Vincens*, le
 tibia d'abord peut-être un peu moins
 que dans le tibia vivant. ~~Le~~ ^{Le} premier
 apparaît après un peu moins infléchi. Dans
 le tibia d'abord interne par la partie supérieure
 et externe par la partie inférieure.
 J'ai pu enlever tuer le germe en
 le faisant passer sur tibia dans la partie
 inférieure, par le St. Vierge. Non dans le tibia
 l'adulte de la collection de M. J. J. J. J.
 Seul le tibia par le germe de la tibia supérieure
 de premier état d'être par le tibia supérieur
 et le tibia inférieur de tibia tertiaire dans
 la partie inférieure après d'un tibia, on
 distingue seulement en tibia tertiaire
 de tertiaire, le tibia d'abord le premier le
 tibia de tibia d'abord. Non, mais le tibia
 inférieure de tibia d'abord le tibia d'abord le tibia
 tertiaire peut-être le tibia d'abord le tibia
 que le tibia d'abord infléchi, sur le tibia
 d'abord le tibia d'abord le tibia d'abord le tibia
 d'abord le tibia d'abord le tibia d'abord le tibia
 d'abord le tibia d'abord le tibia d'abord le tibia
 d'abord le tibia d'abord le tibia d'abord le tibia

L'adulte à gaudin.				Stomph. Vient. Stomph. Vient.	
- longueur de pince de pince de grand crochets	0,111	0,068			petit entre 2 pince j'ai plusieurs fois
une bar de crochets de pince					trouv le pince intérieurement pince de tête
- longueur de pince de pince de grand crochets	0,038	0,020			de la pince inférieure. il l'a apt et
- longueur de tibia de pince de pince de grand crochets	0,132	0,075			de la pince de pince de pince de pince
- diamètre de tibia de pince de pince de grand crochets	0,029	0,009	0,030		de tibia de tibia de tibia de tibia
- plus grande largeur inférieure de crochets de pince	0,039	0,018	0,040		de tibia de pince de pince de pince

Stomph. Vient.

On voit par ces mesures que chez le Stomph. Vient.
la proportion de la pince et tibia est
à peu près la même. - N'importe mais dans
la communication de pince inférieure et pince supérieure
de tibia (hypothèse?) que j'ai vu de pince
pince et rapporte au tibia de pince de pince
j'ai vu de pince que la largeur de crochets
de pince est à peu près la même
de la pince de pince et que
quelque chose de la largeur inférieure de tibia
de tibia de pince de pince de pince.

- longueur de tibia	0,031	0,014	0,031
- longueur de tibia	0,028	0,007	0,028
longueur de tibia	0,024	0,0075	
la largeur	0,025	0,0075	
diamètre de tibia de tibia de tibia de tibia	0,030	0,008	
de tibia de tibia de tibia de tibia	0,030	0,010	
longueur de la pince articulaire	0,020	0,0068	0,010

quant au Calceum et l'attention de
Rev. Gen, seule de la pince de tibia
de pince. il est de la même largeur
de tibia de pince de pince de pince
de tibia de pince de pince de pince.

Wergarai (Chât. et pub. franc. 2. 8. p. 2. à côté
 et fait figurer un dent fonde ^{à l'acte} rendue par W. Amelin
 Dames. à St. Genies de Colomes (gard) dans un terrain
 qui a été acheté par le regard comme appartenant
 et qui constitue les limites actuellement en exploitation de
 la culture dite de Stade. Les deux figures par
 W. Jovais pag 24 (Chât. et pub. franc.) ne peuvent pas
 différer de son homologues dans le carton plein.

W. W. de Lamy (Simultanité des terrains défrichés
 et défrichés. Lamy pag. 38. 1840) a également
 mis le carton au nombre des annexes de l'acte
 d'achat de perçage. plus grand que le
 carton actuel.

sous l'écriture romaine de Juvénal, (4^{es} et
 5^{es} siècles. 2^e éd. pag. 91.) le thymon, qui
 est qu'on le coupe, le même à l'époque romaine, on
 le divise en deux et les deux se joignent par
 une suture qui se rompt à la suture d'après la
 tra. la suture est très visible. — par — voy
 et l'apt. — St-germain l'ancien — suture d'après
 2^e thymon, 2^e suture, par — suture de l'ap. — voy
 suture, par. l'ap. — suture par. Cat. m. h. p. 96

{ C'est un pore qui
 C'est de la suture d'après

La suture diffère notablement de celle de C. Eng.
 par la plus grande hauteur en avant, hauteur qui
 diminue rapidement en arrière, et elle se joint à la
 hauteur de la suture, mais les deux suture se joignent
 de la suture suture par rapport à la suture
 suture par la suture, suture la suture
 suture suture suture suture suture suture

trogontherium

91



à la machine supérieure de Trogoutheria
de ficher, le dernier moulin supérieur est
en proportion moins forte que les deux d^{ts}
précédents. et est aussi moins régulière en action.
après M^r. Boulton dit-il, qu'il est quatre
moulins le premier est le plus grand et le
dernier le plus petit. nous verrons par la suite
ensuite des trois d^{ts} qu'il y a une différence
le dernier moulin est beaucoup plus large en avant que
le précédent et il est par conséquent plus long.
la variation de proportion peut tenir à deux causes
distinctes; la 1^{re}. C'est que dans beaucoup d'ouvrages
mécaniques, la forme et la proportion de la dernière
machine sont sujettes à de fréquentes variations individuelles
particulièrement dans les grandes usines et les grandes usines.
ainsi la variation de forme et de volume est variable
dans la dernière machine de l'usine de
de l'usine, des machines d^{ts}. En plus, il arrive
que les moulins intermédiaires des divers ouvrages et
particulièrement dans les usines, ayant à supporter les
pressions exercées par l'élévation de la
dernière machine, les verrons à la longue se contracter
d'avant en arrière, au point qu'il en résulte la

la détermination en profondeur atomique, et
aussi prouve que les diamètres antéro-postérieurs
et postérieurs sont moins qu'ils ne sont
les latéraux. Ceci se observe dans
un jeune cadavre dont le fémur n'est
à l'état parvenu à son état de développement,
que les deux parties nées avant
un diamètre postérieur antéro-postérieur plus
considérable que dans le cadavre adulte
dont les deux parties latérales sont
longues. C'est le fémur n'est le fémur
mûr. un autre résultat de cette comparaison
qui favorise la mesure de la densité
de l'articulation fait que la plus grande
de l'articulation, dirigée vers la direction qui
l'oblique qu'elle soit au moment de
l'articulation de la dent dentant vers
à peine traversée à angle droit.

Dans les cadavres, le nombre de dents est
permanente. Dans le développement de la dentition
probablement on fait disparaître les dents ou
avant et le cas, c'est à dire, la plus antérieure
et la postérieure. Cependant dans les machines
supérieures les deux antérieures peuvent se confondre
et former une dent unique et comme on
assure.

à la machine inférieure, le plus péniblement
 joint le 2. et le 3. qui par conséquent
 nous tendra traversant et joignant comme
 sont. Le 3. machine qui est en grande en
 fait d'ensemble comme plus longtemps, la
 la plus normale, comme après la dernière en
 fait de passage. Est la dernière et plus
 retardée. — Dans la trigonothèse, c'est le 3. interne
 ou l'humus interne pour le 3. externe et le 3. externe
 pour le 3. interne qui sont le plus péniblement
 et le plus important, ce qui est l'ordre des
 les cartes. ou les plus ^{étendues} s'efforçant par. — Dans
 la trigonothèse, la plus de notre inférieure ^{est} ^{en} ^{avant}
 en avant, comme après dans le C. jargon. Dans la
 cartes et les, ils doivent traverser en des relations
 naïves. Dans le 3. interne il y a plus de ^{avant}
 mais la composition qui donne le contour, la 2. ^{est}
 à une fraction plus traversale. — en ^{avant} ^{est}
 la carte jargon qui s'approchent les 3. de
 trigonothèse.)

le 3. avant de l'humus externe et
 la machine inférieure se dirigent le 2. et le 3. plus
 internes. Il est toujours plus péniblement plus oblique
 en avant dans la trigonothèse et en ^{avant} ^{est}

Gubileum semiseculare

Doctoris medicament philosophiae Gotthelf Fischer de Waldheim

celebrantis patris pietatis laudes naturae pietatem Argentorati

1847.

- Etude paléontologique par la Commission de l'Université
Charles Bonillier -

- note supplémentaire à l'histoire de l'argenterie l'Université
annuel joint de l'Université de l'Université M. le C. J. de l'Université
par. 134.

1. « Un caractère très frappant, qu'on peut appeler générique, est présenté par la forme des incisives. Elles sont longues, légèrement arquées, mais très arrondies et présentent à la pointe un vrai bisellément, c'est-à-dire deux faces qui forment la pointe, l'une intérieure un peu plus longue, l'autre extérieure très courte. Dans tous les autres rangs les incisives sont plus ou moins comprimées, anguleuses, le pointement est très aigu, mais il ne s'y trouve qu'une seule face acuminante du côté interne ».

Nous ajouterons que ce caractère frappant est d'autant plus décisif qu'il indique un arrangement des substances de la dent, tout à fait différent de celui qu'on remarque dans les incisives de tous les rangs, qui ont la couche émail bien plus épaisse à la face antérieure qu'à la face postérieure de la dent. La grandeur et la force respective des incisives par

rapport aux molaires, est un caractère non moins saillant, de genre de vie et la nourriture devaient nécessairement fortement y contribuer.

2. « Quatre molaires, dont celle de devant est la plus grande et la dernière la plus petite. Elles sont posées obliquement de devant en arrière et la couronne présente une figure presque triangulaire dont la base est par devant et la pointe de côté est par derrière. Il y a une très petite échancrure derrière la première lamelle. Les lamelles sont en général légèrement courbées et parallèles et comme soudées ensemble, sans que l'extrémité soit visible sur la couronne. Ce n'est que la première et la plus grande qui est interrompue au milieu et confluent avec la seconde. »

3. « L'os occipital montre peu d'inégalités produites par les muscles, mais celles qui existent sont extrêmement brusques, comme des épines, (*) Le trou occipital est triangulaire, très grand, et peu oblique, ce qui porte à croire que le crâne appartenait à un rongeur, qui vivait plutôt dans l'eau que sur la terre. Des condyles forment un tubercule cohérent très peu arqué, laissant en arrière et en dessous un long sillon. Derrière celui-ci et entre les caps de l'Temporal se trouve une fossette très profonde, qu'on ne voit dans aucun autre crâne. La capsule de l'os est très peu élevée et n'est point munie de ces arêtes que l'on trouve dans les Sacas, les lièvres et autres. »

4. « L'os pyramidal ou occipito-pariétal occupe la même place

(*) Les épines sont fortement endommagées.

que dans les autres rongeurs et a une vraie forme triangulaire, qui s'aplatit d'autant plus, qu'il y a des enfoncements des deux côtés, qui sont, dans ce crâne, remplis de quartz, comme les sutures qui séparent ces os des pariétaux et de l'occipital. (*).

5. « La caisse du temporal, qui a une grandeur considérable dans les rats, les souris, les écureuils, est très peu élevée au dessus du crâne, comme dans les procaras. »
6. « Les autres parties du crâne ont quelques ressemblances avec celui du Castor, mais la forme totale est plus allongée et plus comprimée. »
7. « La mâchoire supérieure compose avec l'os intermaxillaire la plus grande partie de toute la tête. Leur forme ne s'écarte point de l'ordinaire, si ce n'est par les apophyses maxillaires, sous-orbitaires ou antézygomatiques, qui sont très larges, distantes de l'os et surtout très larges par le bas. »
8. « Les os intermaxillaires forment en bas, où ils sont réunis, une arête très aiguë, qui s'élève d'avantage à l'endroit des trois palatins ou incisifs. Les derniers sont très courts et placés très près des dents molaires, et non au milieu de l'espace qui sépare les incisives des molaires, comme dans les autres rongeurs. Cette saillie se continue jusque vers le palais, qui est beaucoup plus élevé que dans les animaux conjugués. »
9. « L'arc zygomatique, qui n'existe qu'en fragments, apporte beaucoup à nos connaissances sur la forme du crâne. Dans le Castor il avance ~~vers~~ à son origine et descend au dessous

Du bord alvéolaire. Dans le *Crogontherium* cet arc se courbe légèrement en arrière, en descendant très peu ou beaucoup moins, de sorte qu'il reste encore une large espace entre le bord inférieur de l'arc zygomatique et les bords alvéolaires de la mâchoire supérieure. »

10. « Les os palatins ne peuvent être distingués, étant couverts de sable quartzéux, mais leur union avec le sphénoïde par une arête très élevée et très visible. On voit quelque chose de semblable dans les *Carriers*. On la considérerait comme une continuation du vomer, si elle ne prenait pas son origine dans des ailes palatines, qui se réunissent et forment une espèce de bassin ou de vestibule du trou palatin postérieur. »

Nous ne reproduisons pas les dimensions données par notre très-respectable Maître, nos figures représentant le crâne exactement dans sa grandeur naturelle,

Ce crâne a été trouvé « sur les bords de la mer d'Azow près de Cazanrog ». Il est enduit d'un sable blanc grisâtre qui empêche de distinguer nettement la forme des os.

Diatroctes khmelingi, *novum*, *NK. ann. 1848 IX, 167. a. b. c.*

Stenoplia Minuta et St. Viminensis

Dans la Stenoplia Min. les deux angles de milieu inférieur sont moins convergents à l'avant et presque parallèles, le côté postérieur est plus long et proportionné et les deux postérieurs plus distants latéralement; les parties latérales de postérieurs sont convergents à l'avant et leur échancrure postérieure plus prononcée, son plus de milieu au milieu et l'apophyse médiane. Le vain de milieu géométrique est rectiligne plus à l'avant que le vain antérieur et la germe médiane. Les angles plus rectilignes, leur échancrure antérieure moins profonde. L'étranglement de frontiers se compare dans la Stenoplia et qui donne à cette partie de la crâne un aspect distaliforme et de l'axe moins prononcé, à l'apophyse par la suite de l'occipital qui est moins convergente latéralement et moins déprimée. Le fin de l'occipital n'est pas plus avancé, dans la même ligne droite, mais les ossements et plus courts que St. Vis. et leur ligne interne postérieure moins oblique et moins pointue (mais peut-être l'os est effilé d'âge et d'excitation plus avancée dans la St. Vis. — Dans la St. Vis. le vain son oblique est plus pointue à celui de l'antérieur. Il n'y a point un plus d'apophyse postérieure au frontale; les os maxillaires plus réunis au frontale dans lequel les pointes par deux apophyses plus pointues que dans la lèvre maxillaire par les bords, qui se rapprochent d'avantage de l'antérieur de l'antérieur. L'étranglement de frontiers est plus prononcé et son échancrure proportionnée le postérieur est moins étalé au milieu que dans la lèvre; le vain incisif les angles plus à l'avant qu'ils ne l'étaient d'avantage de la maxillaire qui se prolonge plus antérieurement dans la St. Vis. que dans la lèvre.

Epaisseur de la chape inférieure du plus grand Stenoplia et St. Viminensis, à la mesure de l'apophyse maxillaire 0,11

D. dans la Stenoplia minuta

0,07

D. dans la St. Viminensis

Longueur de la St. maxillaire inférieure

plus grande largeur de la

longueur de la fin de l'apophyse inférieure

grand Stenoplia	Stenoplia vis.	Stenoplia min.
0,097	0,005	0,004
0,006	0,0045	0,0035
0,006	0,0185	0,0165

Le développement de graminées ou moleses & longuement ont pénétré les
sujets des la Strophile. Dans deux machines inférieures & de. alph. de la Graine, j'ai
donné la dent & pignon de la place maintenant avec le moulin à bois & son alliage
avec train de la graminée. Dans une autre machine on lui donne & pignon ^{en pignon} et de la Graine,
la graminée est déjà formée en graine et elle est prête à chaper la machine à bois qui
diffère peu de la dent & pignon, mais pour le peu & hauteur comparée à la
Graine et le grand diamètre de la saignée entre la quelle vient se développer la graminée; ce
qui a lieu habituellement dans le carton. Dans la deuxieme j'ai habitué dans la dent
de pignon prête à paraître la graminée, tandis que pour la Strophile à bois, il n'y a pas
pas train de graine de la graminée.

Dans la Strophile, le Brevet inférieure de la machine et inférieure le Brevet
comme les les détails et les autres plus que dans la Graine.

Dans les deux stérilisations & l'absence des os du nez ont à peu près
la même forme que dans les Costes d'Europe. ~~Sont-ils plus ou moins~~
pointus? Non. Dans la figure 2 (juvénile) ils sont beaucoup moins saillants vers la
région frontale et la ligne transverse qui touche à leur base tend à se joindre avec
les frontaux pour en avant des bords postérieurs du frontal. (Le nez par conséquent
d'origine postérieure de frontal) Dans l'un de ces os de M. j'ai vu les incisives
remontées aussi haut que le nez. Dans l'autre un peu moins. Dans celle-ci
les crêtes en sautoir bordent le trou pour obtenir postérieurement les incisives et les
saillantes par rapport à ce qui a lieu dans le Coste d'Europe. La forme
antérieure de l'incisive est celle dans les deux espèces? mais la position est différente
chacune en sautoir et plus près l'autre plus divergente en sautoir dans
l'Europe? et dans les os obtiennent très saillant.

Dans le Coste de Danemark trouvé par M. Lynger & Vénus,
les incisives lèvent en avant. os maxillaire dilaté en avant, non adhérent à la base de l'antérieur.
remontées jusqu'à la ligne transverse des apophyses postérieures qui font sautoir à l'extrémité
de la crête basale (0,005 en avant) - une incisive aussi haut que large et non
sautoir - une maxillaire inférieure plus avancée que l'apophyse de la première
molaires - incisives inférieures sautoir l'Europe avant -

Coste Coste n° 2452 - ~~incisive de~~ Maxillaire dilaté au milieu des deux
côtés de l'apophyse et au milieu en avant des maxillaires. os maxillaire sautoir
qui va à la base de l'apophyse antérieure de frontal. une incisive sautoir et
plus large que haute une maxillaire plus sautoir dans le Coste de Danemark
sans antérieur des incisives lèvent.

Coste & une seule sautoir sautoir joint os maxillaire joint en avant et

Remarque jusqu'à la ligne traversée de cyprès par arborescence de forêt. Trois
montagnes de la montagne inférieure plus ou moins que dans le C. de Domb. Trois
origines. Une queue plus large que l'autre (choucroute) plus petite que la Domb.
inférieure supérieure et inférieure cannelées en avant.


Les autres de la collection sont n° 2458, à la fin de l'année de l'année
supérieure, plus ou moins cannelées.

~~Capitulum~~

Capitulum oblongum - inférieure supérieure et inférieure longitudinalement marquée
de trois ou cannelures profondes. Trois origines, beaucoup plus large que
haut - la tête deux fois aussi large que le corps de l'animal. Les cannelures
10. 5 pour l'inférieure de largeur deux 9. 2 de largeur. - dentelée compliquée.

97





UNIVERSITY OF
TOULOUSE
LIBRARY



66

